

中医外科学

(试用教材)

北京中医学院革委会教育革命组

目 录

第一章 祖国医学外科基本知识

一、外科辨证概要	1
二、外科治疗概要	3
(一)内治法	3
(二)外治法	5
三、外治法附方	7

第二章 外科感染

一、疔	15
二、痈	16
三、急性蜂窝织炎	18
四、手部感染	19
甲沟炎	19
脓性指头炎	19
化脓性腱鞘炎	19
掌间隙感染	19
五、急性乳腺炎	20
六、急性淋巴结炎	21
七、急性全身性感染	22
八、颈淋巴腺结核	24
九、骨与关节结核	26
十、化脓性骨髓炎	28
十一、丹毒	30

69554

十二、血栓性静脉炎·····	31
十三、破伤风·····	31
十四、气性坏疽·····	34

第三章 皮肤病

一、湿疹·····	37
二、荨麻疹·····	39
三、药物性皮炎·····	40
四、接触性皮炎·····	41
五、牛皮癣·····	42
六、神经性皮炎·····	43
七、手足癣·····	44
八、脓疱疮·····	45
九、脂溢性皮炎·····	46
十、皮肤搔痒症·····	47
十一、白癜风·····	47
十二、结节性红斑·····	48
十三、多型红斑·····	49
十四、带状疱疹·····	50
十五、寻常疣与扁平疣·····	50
十六、胼胝与鸡眼·····	51
十七、红斑性狼疮·····	51
十八、痤疮·····	52
十九、斑秃·····	53
二十、鱼鳞癣·····	54
二十一、过敏性紫癜·····	54
二十二、头癣·····	54

第四章 肛门疾病

一、内痔	57
二、血栓外痔	60
三、肛裂	60
四、肛门周围脓肿	61
五、肛漏	62

第五章 其他外科疾病

一、血栓闭塞性脉管炎	64
二、疝疮	66
三、甲状腺疾病	67
(一)单纯性甲状腺肿	67
(二)甲状腺腺瘤	67
(三)甲状腺机能亢进	68
四、烧伤	68
五、冻伤	70
六、毒蛇咬伤	71
七、尿路结石	72
八、副睾炎	74
九、副睾结核	74

第六章 急腹症

一、急性阑尾炎	78
二、胆道蛔虫症	80
三、急性胆囊炎、胆结石	82
四、胃、十二指肠溃疡病穿孔	84

五、急性肠梗阻	86
---------	----

第七章 肿瘤

一、食道癌	92
二、胃癌	93
三、肝癌	94
四、直肠癌	96
五、乳腺癌	96
附: 乳腺纤维腺瘤、慢性囊性乳腺病	98

第一章 祖国医学外科基本知识

一、外科辨证概要

“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”。祖国医学外科原称疡科，将外科疾病(主要是外科感染、皮肤病)统称疮疡。辨证虽同样以四诊、八纲为理论基础，但它有它独特的体系。既重视局部辨证，又把它和整体反应结合起来。现分述如下：

(一)辨阳证、阴证

祖国医学外科临床，首先辨别阴阳，此为辨证的总纲。一般来说，在外科上分痈、疽两大类。痈为阳证(表、实、热证)，疽为阴证(里、虚、寒证)。

阳证：相当于急性化脓性感染。

特点：起病急速，生于皮肉之间。初期疮形高肿，灼热疼痛，皮色红赤。溃后脓稠，容易痊愈。

阴证：相当于慢性化脓性感染。

特点：起病缓慢，发于筋骨之间。初期疮形平坦，漫肿木硬，不痛或微痛，皮色不变。溃后脓水清稀，或有败絮样物，难于痊愈。

阳证、阴证不是固定不变的，而是在一定条件下可以向相反的方面转化。同时由于病变的复杂性，常表现为阳中有阴，阴中有阳的证候。

(二)病因辨证

风：多侵犯于人体上部。肿势较甚，痛无定处，忽此忽彼，

走窜甚速。

寒:多侵犯于筋骨之间。疮形漫肿,不红不热,常有酸痛,痛有定处,得热则舒。

暑:多侵犯于头面肌肤。肿痛焮热,皮色潮红。

湿:多侵犯于下部,皮损为水疱、渗液,肿则光亮,按之凹陷。

燥:多侵犯于手足及皮肤。皮损为干燥、发裂、脱屑。

火:多侵犯于全身各处。病变急速,红肿焮热,疼痛得凉则减。

郁:多因肝气郁结。其肿坚硬如石,状如岩突,皮色不变,推之不移。

痰:多因脾失健运。结块质硬或软,皮色不变,推之活动。

气:多因肝气不舒,气机不畅。其肿或硬或软,随喜怒消长,痛则游走不定。

血:疮疡发生,总因气血凝滞。其表现为肿块、皮色青紫、或经脉索状硬物。

以上致病因素,不是彼此孤立而是互相影响的。同时它有一定的发病规律。如风热易侵犯上部,气火易侵犯中部,湿邪易侵犯下部。

总之,由于外感六淫发病的,在外科见证上大多属于阳证,预后一般良好;由于气、郁等因素而发病的,在外科见证上大多属于阴证,预后一般较差。

(三)经络、脏腑辨证

经络、脏腑是标本从属的关系,疮疡的发生是与二者分不开的。因此,经络、脏腑辨证有着十分重要的指导意义。如使用引经药物及根据经络学说,采用割治、挑治疗法,都取得了良好的效果。脏腑失调,可反应于体表而发生疮疡;反之体表

的病变，在一定条件下，也可影响内脏而发生全身反应。因此，经络、脏腑辨证，是通过发病部位，进行归经，寻其所属，并结合全身情况，辨别虚实，认清疾病的本质，从而达到治病求本的目的。脏腑具体辨证同内科，此以从略。

附：病所归经

头顶：正中属督脉经，两旁属膀胱经。

面部、乳部：属胃经，乳头属肝经。

耳前后：属胆及三焦经。

颈胸肋：属肝经，胁肋属胆经。

背部：总属阳经。中属督脉经，两旁属膀胱经。

腹部：总属阴经。中属任脉经。

臂部：外侧属手三阳经，内侧属手三阴经。

腿胫部：外侧属足三阳经，内侧属足三阴经。

手心：属心包经。

足心：属肾经。

二、外科治疗概要

“对于具体的事物作具体的分析”。“不同质的矛盾，只有用不同质的方法才能解决”。因此，临床上必须根据患者的体质和致病因素等，进行全面的分析，依照辨证的原则，确定治疗方法。祖国医学外科，除部分疮疡采取外治法外，比较重的以内治为主，不但初起时以内服药来消散，而且溃后也用内服药来托毒排脓，这是中医外科治疗的特点。

（一）内治法

“如果人们不去注意事物发展过程中的阶段性，人们就不能适当地处理事物的矛盾”。一般疮疡发展规律是经过肿疡、

溃瘍两个不同阶段。但根据邪正的消长情况，又可分三个不同时期。即初期(毒邪结聚)、成脓期(热盛化脓)、破溃期(毒出收口)。而治疗方法，也必须根据不同质的矛盾，用不同质的方法消、托、补去解决。

一、消法:是用消散的药物，使初期尚未化脓的一切肿疡得以消散。这是治疗外科疾病的总纲。方法如解表、清热、疏肝、祛痰、和营、行气、温通等都属消法范围。在实际应用时，根据临床证状，选择治疗方法。如：

1. 清热解毒法:是用清热解毒的药物，使热毒得以消散。常用药如地丁、蒲公英、菊花、连翘、黄芩、黄连、银花等。

方剂:五味消毒饮:菊花、蒲公英、银花、天葵子、地丁。

应用于急性感染，局部肿痛、焮热、色红等证。

2. 活血祛瘀法:是用活血祛瘀的药物，使经络疏通，血脉流畅，而达到消散的目的。常用药物如归尾、赤芍、川芎、桃仁、红花等。

方剂:桃红四物汤:桃仁、红花、当归、赤芍、熟地、川芎。

应用于经络瘀血阻滞，或肿疡及溃后肿块不消。

3. 疏肝解郁法:是用疏肝理气的药物，使气机条达，气血调和，而使结块消散。常用药如柴胡、橘叶、玉金、青皮、川楝子等。

方剂:开郁散:柴胡，当归、白芍、白朮、茯苓、甘草、玉金、白芥子、全蝎、天葵子。

应用于肝气不舒所致的疮疡。证如结块坚硬，皮色不变，推之活动。

4. 温通法:是用温热、散寒的药物，使阴寒凝滞之邪，得以消散。药如麻黄、桂枝、干姜、细辛、鹿角等。

方剂:阳和汤:麻黄、熟地、白芥子、甘草、炮姜、肉桂、鹿角

胶。

应用于寒痰侵入筋骨，阳气失和，疮形平坦漫肿，不红不热等证。

二、托法：包括透脓和补托两种。是用透脓和补托的药物，使疮疡脓出毒泄，肿痛消退。透脓药如山甲、皂刺，补托药如党参、黄芪、白朮、甘草等。

1. 透脓法：用于肿疡脓成未溃，邪盛正气未衰，使之早日破溃（但亦能消散）。但现在多以手术代替。

方剂：透脓散：当归、黄芪、川芎、山甲、皂刺。

2. 补托法：用于溃瘍毒盛正虚，不能托毒外出，证如身体虚弱，脓水清稀等。

方剂：托里消毒散：党参、黄芪、白朮、甘草、当归、白芍、川芎、茯苓、白芷、银花、桔梗、皂刺。

三、补法：有补益气血、补阴、补阳等，现仅举补气血的方法，使恢复其正气，帮助其新生，促使疮口早日愈合。

方药：气血双补汤：党参、白朮、茯苓、甘草、当归、熟地、白芍、川芎。

应用于疮瘍毒邪已尽，而气血不足者。

以上消、托、补三大法，是治疗疮瘍的一般规律。但病情的变化是错综复杂的。或经治而好转，或正不胜邪，毒邪内攻脏腑而出现高热烦躁，神昏谵语，舌赤脉数等证，必须用清热、解毒、凉血的方法。如清营汤（犀角（可用广角替代）、生地、玄参、竹叶心、银花、连翘、黄连、丹参、麦冬）。因此治疗应根据全身和局部情况，按病情的发展和变化，抓住主要矛盾，对证用药。

（二）外 治 法

外治法在外科治疗中，占有很重要的位置。在临床使用

时同样必须根据病情的发展，在不同时期采用不同的方法和药物。举例如下：

一、箍围法：是使扩散的炎症局限化，以达到早日消散、成脓或破溃。一般应用于疮疡初起、肿疡未溃时期。具体用法分以下三种情况。

1. 阳证：红肿热痛，宜清热消肿、散瘀止痛。如金黄散(11)，或解毒膏(21)掺活血丹(12)盖贴。

2. 阴证：疮形平坦漫肿，不红不热，宜温经散寒、活血消肿，如阳和解凝膏(22)掺阴消散(14)盖贴。

3. 微红微热，肿痛轻微，宜活血消肿，如冲和膏(24)。

二、提毒祛腐法：能使疮疡内蓄之脓毒得到排出，腐肉早日脱落。使用于肿疡溃破后，腐肉未脱，脓液未尽时。主要药物如红升丹(6)、五五丹(3)、消炎粉(2)等。

三、腐蚀法：使疮疡坏死组织腐蚀脱落。使用于漏管、淋巴腺结核初溃时，如白降丹(7)。

四、生肌收口法：促使肉芽生长的一种方法。使用于溃疡脓腐已尽，新肉已生。如生肌散(8)、生肌玉红膏(29)。

五、赤医针疗法：是一种新针疗法。对一般外科感染及皮肤病等，均有较好的疗效。符合多、快、好、省的原则，应大力推广使用。

主穴：在督脉经上，第六胸椎棘突处。

针法：病人端坐，抱肘低头，在穴位处沿皮下进针，深度1.5至2寸，留针20至40分钟。

针具：较粗而长。

配穴：后合谷穴：在第1、2掌骨连线之缘。

针法：快速进针，得气后将针退至皮下，然后针斜刺呈15度，沿第二掌骨前缘，针尖约达掌指关节处，得气留针10至15

分钟(用毫针)。

六、其他疗法:

1. 灸法:能解毒止痛,使气血流通。因此肿疡未成者易于消散,既成者易于溃脓,既溃者易于生肌收口。适用于疮毒难以起发,不能托毒外出者;或溃疡久不愈合,脓水稀薄等证。如隔姜灸或用艾柱灸。

2. 药捻:一般用桑皮纸,搓成线状,外粘药物,或将药物预先放在纸条内裹好,捻成线状,插入疮口中。使用于溃疡疮口小而深,引流不畅。如五五丹药捻。溃疡已成漏管者,可用白降丹药捻。

3. 洗法:能使疮口洁净,祛除毒邪等,从而达到治疗的目的。如朴硝冲洗治疗痔疮,皮肤病洗药治疗皮肤病等。

三、外治法附方

1. 九一丹:煅石膏九钱 红升丹一钱 冰片五分。

2. 消炎粉:煅石膏一两 红升丹一钱 轻粉六分 黄连一钱 冰片一钱二分。

3. 五五丹:煅石膏五钱 红升丹五钱 冰片五分。

4. 甲字提毒粉:血竭二钱 红升丹五钱 轻粉五钱 冰片一钱 射香二分 朱砂五钱 琥珀一钱。

功用:以上几种的作用,主要是提毒祛腐,其功能大同小异,红升丹的成分多,其提毒祛腐的力量强,反之则小。用于疮疡溃后,脓腐未尽时。

5. 全蝎散:灵磁石钱半(醋煨) 公母丁香 炙蜈蚣各二钱 炒姜蚕 炒全蝎 炒蜘蛛各七只 炙甲片三钱 射香五分 牛黄二分 冰片一钱。

功用:提毒、祛腐、生肌。适用于瘰疬、流痰溃后。

6. 红升丹(小升丹):水银一两 白矾八钱 火硝七钱 经过提炼而成。

功用:提毒祛腐。使用于溃疡脓栓、腐肉未脱时。纯粹升丹因药力较猛,在临床使用时必须加赋形药。对升丹过敏者禁用。

7. 白降丹:朱砂 雄黄各二钱 水银一两 硼砂五钱 火硝 食盐 白矾 皂矾各一两五钱。经提炼而成。

功用:有强烈的腐蚀作用。适用溃疡脓腐难去、漏管、瘰疬等症。

8. 生肌散:制甘石一钱 象皮二钱 花龙骨二钱 海螵蛸二钱 珍珠母三钱 煅石膏二钱 冰片三分。

功用:生肌收口。使用于溃疡脓水将尽。

9. 珍珠散:珍珠一钱 牛黄五分 象皮 琥珀 龙骨 轻粉 制甘石各钱半 冰片三分。

功用:同上。

10. 除疔散:墙钉(墙壁上的螺丝)四钱 川贝四钱 银珠钱半 冰片五分。先将墙钉晒干后和它药共研。

功用:提脓拔毒。适用疔疮初起脓塞未脱。

11. 金黄散:大黄 黄柏 姜黄 白芷各一斤 南星 陈皮 苍朮 厚朴 甘草各六两 天花粉二斤。

功用:清热解毒、消肿止痛。使用于阳证初起,或溃后红肿未退。

12. 活血丹:雄黄 火硝 没药 乳香各六钱 煅月石一两 青蒙石三钱 朱砂二两 冰片三钱 射香一钱(原名红灵丹)

功用:活血、止痛、消肿。使用于阳证肿疡。如蜂窝织炎、

淋巴结炎等。掺于膏药内贴敷。

13. 阳消散:射香 冰片各二钱 白芨 南星 姜黄 炒甲片 樟冰各四钱 轻粉 胆矾 铜绿 青黛各二钱。

功用及使用法同上。

14. 阴消散:射香一钱 轻粉三钱 丁香二钱 牙皂二钱 樟冰四钱 腰黄三钱 良姜二钱 肉桂一钱 川乌三钱 炒甲片三钱 胡椒一钱 制乳没各二钱 阿魏(炒去油)三钱。

功用:温经散寒、消肿化痰。适用于阴证肿疡,掺入膏药内贴敷。

15. 桂射散:麻黄 细辛各五钱 南星 生半夏各八钱 肉桂一两 丁香一两 射香六分 冰片四分 牙皂二钱。

功用及使用法同上。

16. 冲和散:紫荆皮五两 独活三两 白芷三两 赤芍二两 石菖蒲一两五钱。

功用:行气消肿、活血止痛。使用于微红、微热的肿疡。

17. 青黛散:青黛三钱 黄柏三钱 滑石六钱 煅石膏六钱。

功用:清热、燥湿、止痒。使用于急性湿疹、过敏性皮炎、带状疱疹等。

18. 止痒粉:松香 枯矾 铅粉 轻粉等量。

功用:收湿、止痒。使用于手足癣。

19. 雄黄解毒散:雄黄一两 寒水石一两 生白矾四两。

功用:解毒、燥湿、止痒。使用于慢性湿疹、皮肤抓痒症等。

20. 赛霉脱:煅石膏二两 朱砂二钱。 冰片一钱。

功用:消炎止痛,止血生肌。使用于痔疮、肛漏术后。

21. 解毒膏(原名太乙膏):玄参 白芷 归身 肉桂

大黄 赤芍 生地 土木鳖各二两 阿魏三钱 轻粉四钱
柳槐枝各一百段(每段约一寸) 血余一两 樟丹四十两 乳
香五钱 没药三钱。

制法：除樟丹外，将药入香油煎至枯，去滓，再入樟丹熬至滴水成珠(一般每斤油加樟丹七两，夏天可用十两)。

功用：清热解毒、消肿生肌。使用于阳证疮疡已溃或未溃时，摊于布或油纸上贴敷。

22. 阳和解凝膏：鲜牛蒡子根、叶、梗三斤 鲜白凤仙花梗四两 川芎四两 附子 桂枝 大黄 当归 肉桂 草乌 地龙 姜蚕 赤芍 白芷 白芨 白薇 乳没各一两 续断 防风 荆芥 五灵脂 木香 香元 陈皮各一两 苏合油四两 射香一两 菜油十斤。

制法：除乳没、射香、苏合油外，余药入油煎枯去渣，每斤油加樟丹七两，熬至滴水成珠，不粘指为度。取出加射香等搅匀。

功用：散寒通络、活血止痛。使用于一切阴证。摊于布上敷贴。

23. 金黄膏：金黄散 40 克 凡士林 60 克。

24. 冲和膏：冲和散 40 克 凡士林 60 克。

25. 青黛膏：青黛散 50 克 凡士林 50 克。

以上三种功用及适应证同散剂。

26. 藤黄膏：藤黄粉四两 白腊四两 香油一斤。

制法：香油煎沸，入白腊溶化，取出入藤黄调匀。

功用：提毒生肌。使用于各种溃疡。

27. 铅粉软膏：铅粉一斤 松香五钱 冰片三钱 冰糖两半 黄腊四两 香油一斤八两。

制法：先将香油煮沸，入黄腊、松香、冰糖溶化，再入铅粉

熬一刻钟，待温加冰片。

功用：生肌、燥湿。使用于肛漏术后及瘰疬。

28. 甘乳膏：制甘石 乳香各五钱 龙骨 赤石脂各二钱。共研细末。凡士林一两五钱调成糊状。

功用：生肌、燥湿、止痒。适用于慢性溃疡。

29. 生肌玉红膏：当归 甘草各二两 白芷五钱 紫草二钱 血竭粉四钱 煅石膏粉二两五倍子粉五钱。

制法：先将前四味用香油一斤，浸三日，后用文火熬微枯去渣，然后再入他药煎沸。

功用：生肌长肉。使用于溃疡肉芽新鲜。

30. 密陀僧膏：密陀僧 制甘石各五钱 铜绿二钱 冰片五分 白腊一两。

制法：香油四两煎沸，入上药调匀。

功用：祛腐生肌、收湿止痒。使用于脓疮。

31. 三黄一椒膏：大黄 雄黄 硫黄各三钱 胡椒四钱共研细末。凡士林三两调匀。

功用：燥湿、杀虫、止痒。使用于癣、慢性湿疹、神经性皮炎、白癜风等。局部有炎症禁用。

32. 樟脑膏：樟脑粉四两 猪油一斤 白腊八两。先将猪油、腊煎溶，再入樟脑搅匀。

功用：防腐、杀虫、润肤。使用于冻疮、鹅掌风、皲裂疮等。

33. 天麻膏：草乌 勾藤 天麻 藜芦 川芎 狼毒各钱半 木别仁三钱五分 轻粉 粉霜各二钱 黄腊四两 猪油三两 香油一斤半。将药切细，于油内煎枯去渣，入黄腊、猪油溶化，再入轻粉、粉霜调匀。

功用：杀虫、止痒。使用于各种癣疮。

34. 黄连膏：黄连四钱 苍朮 黄柏各二钱 共研细末，凡士林三两调匀。

功用：清热，燥湿，止痒。使用于疖、湿疹感染、烫伤等。

35. 红粉软膏：朱砂三钱 红升丹一钱 研细，凡士林一两调匀。

功用：提毒祛腐。使用于溃疡腐肉未脱、陈旧性肛裂、牛皮癣等。

36. 烫伤膏：银花五钱 当归 大黄 冰片 地榆各六钱 川芎二钱 紫草七钱 白芷六钱 共研细末，香油一斤调匀。

功用：清热解毒、止痛生肌，适用于烫伤。

37. 痔消炎膏：制甘石 滑石 乳香各五钱 樟丹二钱 血竭 冰片 朱砂 儿茶各一钱 共研细末。用凡士林调成20—30%油膏。

功用：消炎止痛、防腐生肌。使用于痔疮。

38. 猪苦胆膏：生南星 生半夏各四两 白芥子 猫爪草各二两 共研细末。猪苦胆100个(取汁)醋二斤煎沸，然后将药面均匀的撒下，再以文火煎约四小时左右，成膏状，取出加苯甲酸90克以防腐。

功用：化痰、散结、解毒。使用于瘰疬已溃或未溃。

39. 土槿皮酊：土槿皮半斤 羊蹄根半斤 樟脑四两 75%酒精2000cc 浸泡一周。

功用：止痒、杀虫。使用于各种癣。

40. 神经性皮炎酊：羊蹄根四两 斑毛五钱(去头足) 白藓皮一两 土槿皮一两 枯矾一两。75%酒精1000cc 浸一周后外用。

功用：止痒、杀虫。使用于神经性皮炎、癣等。