

寒疫合編

劉興國

寒疫合編歌括目錄

卷二

論熱及歌

論腹脹滿及歌

蜜導法歌

誤治成脹歌

結胸證論及歌

論斑疹及治法歌

論黃疸及治黃疸歌

論發狂及治狂諸法歌

論自汗盜汗及治證歌

論蓄血衄血便血及治證歌

論厥逆及治證歌

論動氣藏結自利及治證歌

論小便自利小便短難及治證歌

論發渴吐病及治證歌

論呃逆噦噫及治證歌

論喘急短氣頭眩及治證歌

論煩躁鬱冒及治證歌

論瘕瘕鄭聲譫語及證治歌

論剛柔瘕及治證歌

論吐衄狐惑不眠多寐及治證歌

論戰振慄循衣摸牀及治證歌

漱水不欲嚥歌

論筋惕肉瞤百合勞復食復及治證歌

辨生死證歌

製藥分兩諸說

寒疫合編歌括卷二

什邡王光甸春田編輯

論熱

按傷寒發熱形證不一前賢論說亦夥今拾其要
更爲歌括以便記誦庶無是此非彼之惑

表實發熱渾身燒無休歇也。宜裏實潮熱日晡蒸

蒸而熱移時又止。又或手足有微汗出。宜欲裏不

裏則時熱似潮。熱無定時。時熱重。時熱輕。次數多。

而兼自汗也。有表證無裏證者以桂枝等類與之

半表半裏者小柴胡湯之類與之

裏未深而實者，邪在表裏之間，則往來寒熱似瘧。
大柴胡湯與之。邪在表裏之間，則往來寒熱似瘧。
小柴胡湯作汗煩熱，則悶惱，忽增煩渴，移時則汗
之類與之。作汗煩熱，則悶惱，忽增煩渴，移時則汗
出，不須藥，俟汗解。陽虛勞熱，則熱從筋骨間出，微
而愈，以調之。微汗出，渴不甚飲，當以補中益氣。
微汗出，渴不甚飲，當以補中益氣。陰虛火動而熱，
心多熱，或盜汗，脉浮洪無力，宜以當歸六黃湯一
類與之。陽將脫而越出，軀殼忽大燒熱，兩顴赤目直
之。視汗出身振振不自主，名曰陽越，夕發旦死。

歌曰

傷寒燒熱有多般，說與君家子細參。渾身燒熱無休

歇此是表實邪固盤

當以汗解

邪一入裏日深固

陽明便

之裏

閉神昏舌上乾

胎必黃黑而燥

每逢申未

日補也

便潮熱蒸蒸

熱騰

煩亂一時

潮熱時

陽經潮熱病堪下

輕者大柴胡湯

之象

煩亂一時

則煩甚

陽經潮熱病堪下

輕者大柴胡湯

涼膈散重者承

輕重參詳合脉觀時熱似潮數次發

氣等湯與之

輕重參詳合脉觀時熱似潮數次發

一日數

有汗不狂煩但有表病無裏證惟見頭

次見熱

熱時有汗不狂煩但有表病無裏證惟見頭

煩渴

桂枝柴胡皆可餐往來寒熱形似瘧邪與正氣

腹滿桂枝柴胡皆可餐往來寒熱形似瘧邪與正氣

相爭搏半表半裏小柴胡只須和解病自却煩熱心

煩卧不安脉洪而數渴思泉

初八陽明之府

人參白虎爲要

藥甚者竹葉石膏餐倘若足冷脉沉細此爲假熱是

藥甚者竹葉石膏餐倘若足冷脉沉細此爲假熱是

藥甚者竹葉石膏餐倘若足冷脉沉細此爲假熱是

寒之合偏

二發熱證治

虛煩。

熱輕煩重形慘白脉沉細

四逆理中皆可服。斯時在醫子細。

參內傷勞役陰虛病。火動而煩熱亦微。其人倦卧多。

無力。自汗少飲。

渴不欲飲

添衣。

外熱內寒欲加衣被

尺脉浮虛補。

中氣。

補中益氣湯人參養營湯

火旺補陰生麥歸。

以四物小柴胡或

汗煩熱病將已。六七日中表病止。

邪在六七日手足而未傳經者

三部脉皆旺。

六脉浮數旺於往日

蒸蒸煩熱汗作矣。口噤不言。

甚則身抖如瘧而汗隨出病亦解

或身戰。儼如瘧作振擊齒。

甚則身抖如瘧而汗隨出病亦解

譬如酷。

暑煩悶生。再熱須臾雨至矣。此爲欲汗莫張惶汗後。

藥餌好調理。

八珍湯人參養營湯

倘若乾戰煩不汗。脉必浮虛。

按卽散。又非佳兆。乃死形。陽虛陰絕。目上竄。急用大劑獨參湯。頻頻與服。莫怠玩此。亦十中活二三。仍須汗出一笑。榮正氣托邪出更有一般陽越熱。外無表證。惟裏寒。或因汗下非時誤。傳入陰經。用藥難。忽然徧體皆燒熱。兩顴紅赤。汗漫漫。身搖欲倒。目直視。縱施薑桂。命難全。

竹葉石膏湯

人參 竹葉

石膏 粳米

甘草

補中益氣湯

人參 柴胡

黃芪 陳皮

白朮 升麻

當歸 薑棗

炙草

獨參湯

以洋參三兩 濃煎或加薑二片 時時與服 以代人參數錢

人參養營湯

人參 白芍

麥冬 知母

五味 陳皮

當歸 熟地黃 炙甘草

腹滿痛

陳

素中辨證曰、腹滿不減者爲實、時滿時減者爲虛、按之堅鞭而痛不可近者爲實、可按而軟爲虛、中脘疼屬太陰、脉沉遲內寒者、附子理中湯、寸瀉尺弦小建中湯、臍腹疼屬少陰、眞武湯、小腹疼屬厥陰、吳萸四逆湯、凡腹滿時減時痛、此虛從下上也、理中加厚樸、木香主之、腹滿吐食不下、屬太陰、理中加霍香、厚朴、陳皮、半夏之類、病人自言滿、他人按之

不滿此陰證也。切不可攻之。必死。宜四逆湯溫之。
汗後腹脹滿痛者。下之宜承氣湯。潮熱腹滿氣促而
喘。內實者。下之宜大柴胡加厚朴。胸中有熱而欲
嘔。胃中有邪而作痛。宜黃連湯。大抵陽熱爲邪。則
腹滿而咽乾。陰寒爲邪。則腹滿而吐利食不下。

凡痞滿不拘寒熱虛實遲早。可用熨法以治其急。法
用橘皮生薑葱白共搗爛。加麩皮半升炒熱布帕包
熨冷再易如此一日。卽止疼散痞。

又曰太陽病下之早。因而腹疼者。桂枝加芍藥主之。

本無可下誤也下之早未入陽明也桂枝湯倍加芍藥以養陰解表下之應脉弦口苦發熱腹疼者小柴胡湯去人參加白芍寒熱交作腹疼者小柴胡加肉桂白芍去黃芩若大實腹痛不大便繞臍刺痛脉沉實煩渴皆屬燥糞宜大承氣等法下之

黃連湯

仲景

黃連

人參

乾薑

炙甘草

半夏

大棗

歌曰

腹疼腹滿實證形。痛而不減怕手捫。小腹堅鞭不可近。身燒發渴苦呻吟。脉洪脉弦或沉數。皆宜推蕩莫

因循人弱先施蜜導法大柴胡湯厚樸增大量承氣湯可使蜜調入藥好教吞下後病去宜養血四物八珍倍加參庸醫但見小腹痛不論虛實理中溫更進附桂蘆巴等火煎腸裂便殺人

腹痛腹滿虛證情時疼時減喜手捫小腹縱疼按却

軟自言脹滿無實形

無鞭硬堅實

飲湯稍下飲水吐

內有寒也

受熱吐冷

身無壯熱目常瞑脈浮必虛沉必弱是爲虛痛

辨分明須知虛脹忌消導亟宜溫補可回生砂半理

中加桂附小茴枸杞

相親外有散痞止疼法不令

虛實一般行陳皮薑蔥麥麩炒或加鹽醋共同烹乘
熱布包熨患處止疼此法妙如神

蜜導法歌

蜜導法用豬牙皂

火炮爲末

煎蜜爲丸蔥汁加按入糞門

須臾下代却承氣功獨誇

誤治成脹滿腹疼歌

太陽病下之早因而腹痛桂枝

湯

好倍加白芍藥止

可

疼仲景立法須探討

下證後口乾苦發熱

腹疼邪熱侮小柴胡湯去人饑

重加芍藥滋陰補

寒熱交作腹疼者小柴胡湯芍藥加肉桂用之寒痛止黃芩除去乃無差

大實腹疼大便鞭繞臍刺痛渴加煩脈必沉實按有力承氣下之病可痊

結胸證

醫宗金鑑云大結胸從心下至少腹鞭滿而痛不可近者宜大陷胸湯攻之小結胸微結心下按之方痛不按不痛宜小陷胸湯開之身有微熱頭汗自出者

是證者水結胸也宜大陷胸丸攻之漱水不欲咽
有是證者血結胸也血瘀不成當衄解或衄未盡或
婦人經來適斷皆能成之宜抵當丸或桃仁承氣湯
攻之證實脈沉大有力乃可用此等攻法若內不實
脈浮滑浮大浮虛乃小陷胸證不可攻也攻之必凶
陳素中曰心下妨悶無大熱者寒實結胸也或有停食
枳實理中丸主之

崔行功云傷寒結胸欲絕心膈高起手不得近宜大陷
胸湯不瘥者此皆下後二逆氣也不理而毒復上攻

氣毒相搏結於胸者用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神

朱丹溪曰病在表而誤裏可謂虛矣已下者不可再下

故陷中湯不可輕行而理中在所宜用也且誤下之初卽頻服理中湯自能得解更不得作結胸也若飲水不散但頭汗出心下滿揉之汨汨有聲爲水結胸

小半夏茯苓湯王

小半夏茯苓湯

法半夏
入薑汁

赤茯苓
同服

大都證實脉實可

攻脉微四肢冷難治以四逆湯與之