

醫學從衆錄

卷肆  
伍陸  
捌柒



醫學從眾卷四

閩吳航陳念祖修園甫著

譚炳炎醫

次男元犀靈石叅訂

孫男

心典微菴

全校字

心蘭芝亭

瘧 厥 癰 狂 癰 癰 瘕

厥者從下逆上之病也

傷寒論厥以手足厥冷而言陽厥用四逆散陰厥用四逆湯此主內經暴厥者不知與人

言及血之與氣并走於上則爲大厥之旨與傷寒不同

瘕者強直反張之象也癰者猝然昏撲

筋脈痠癢口角流涎或作牛馬猪羊雞之聲後人分爲五癰是也

有病

聞斷故名爲癰

癰者或歌或笑如醉如癡其候多靜而常昏狂者語言狂妄

少臥不饑其候多躁而常醒癰瘰者病在筋骨左癰右瘰將成廢人  
六症醫書分治其實一厥陰盡之治得其要只取數方捷如影響蓋  
厥陰屬風木與少陽相火同居厥陰之氣一逆則諸氣皆逆氣逆則  
火發火發則風生風生則必挾木勢而害土土病則聚液而成痰其  
歸并於心也心氣大虛而不能禦之或從陽化而爲狂或從陰化而  
爲癲心氣尙未全虛受其所凌則昏倒正氣一復而遂瘥其症有作  
有止則爲癰其逆行於內也或乘腎氣之虛則瘡疔而爲腎厥或因  
煩勞以擾其陽陽亢陰虧而爲熱厥或怒火載血上行氣血亂於胸  
中相搏而厥逆則爲薄厥或因拂鬱不解陽氣不能四達手足與身  
俱冷

中風身溫  
中氣身冷

則爲氣厥或陽騰絡沸則爲血厥或因穢濁蒙神亂



於陰陽之氣則爲尸厥或於飽食之後適有感觸胃氣不行陽并於上則爲食厥時見吐衄則爲衄厥濕痰上逆則爲痰厥以及陽衰而陰湊之令人五指至膝上皆寒則爲陰厥陰衰而陽湊之令人足下熱熱甚則循三陰上逆則爲熱厥其發見於外也風火迅發病起於驟然手足抽掣角弓反張或從實化爲無汗之剛瘓或從虛化爲有汗之柔瘓內經云諸暴強直肢痛繚戾裹急筋縮皆屬於風醫者可於此而驗風邪之體段焉土爲木尅則聚液而成痰痰挾風而流注則左癱而又右瘓左傳云風淫末疾醫者可於此而知風邪之流極焉凡此六者症各不同其源則一余只以烏梅丸益厥陰之體以宣厥陰之用又以風引湯治厥陰風火痰涎幻變錯雜之病舉凡治剛

瘧用葛根湯柔瘧用桂枝加括婁根湯瘧之表症急者用小續命湯  
以攻表瘧之裏症急者用承氣湯以攻裏之類而不效治寒厥用六  
物附子湯熱厥用六味湯薄厥用蒲黃湯癰厥用玉女煎龍薈丸氣  
厥用八味順氣湯血厥用白薇湯尸厥用蘇合香丸食厥用加味平  
胃散虵厥用掃虫煎腎厥用地黃飲子痰厥用瓜蒂散之類而不效  
治狂用白虎湯生鐵落飲涼膈散滾痰丸治癲用定志丸天王補心  
丹導痰湯及獨參湯加竹瀝薑汁之類而不效治癰用龍薈丸丹礬  
丸五癰丸及紫河車丸之類而不效治癰瘰用一妙散及舒筋保肝  
散之類而不效者種種方藥無不對症對症而猶不效其故何也蓋  
緣未嘗求於厥陰一經而信服烏梅丸風引湯二方之神發也二方

本於仲景而喻嘉言獨得其旨但引而不發淺學人捫索不來至葉

天士則引伸觸類妙義無窮若風火犯於上者

此風火二字即上厥風木與少陽相火

之義勿誤解爲外來風火

不免銷金燦液用麥門冬湯及瓊玉膏爲補金柔制法

若風火犯於中而爲嘔爲脹者用六君子湯去朮加木瓜薑芍之類

又附子粳米湯加人參爲補脾凝肝法若風火震動心脾而爲悸爲

消者用甘麥大棗湯合龍牡之屬爲緩其急鎮其逆法若少陽相火

挾厥陰風木之威而乘巔搖絡者用羚羊鈎藤元參連翹之劑爲熄

風清絡法若肝膽厥陰化風旋逆者用龍膽蘆薈木通青黛之類爲

苦降直折法若本藏自病而體用失和者以椒梅桂芍之類爲寒暄

各得法若因母藏之虛而擾及子藏之位者用三才配合龜甲磁硃

及復脈湯去薑桂入雞子黃之屬爲安攝其子母法至於痿厥之治  
厥陰病風旋陽冒神迷則爲厥陽尤覺神奇取血肉介類改湯爲膏  
明病絡空四未不用而爲痿厥謂其力厚重實填隙止厥最速凡此之類雖不明用烏梅丸風引湯  
成方而細味其旨無一不從此二方神悟出來甲寅歲余在吳航書  
院掌教常與學徒講論以讀於無字處文到有神時二句爲舉業妙  
諦而學醫者亦必到此境地方許出而論證也

### 脉息

宜實大 忌沉細 漸緩則漸愈 漸數則漸甚 右數而弦緊及  
見牢革促代諸脈難治

葛根湯

方見傷寒



小續命湯 方見時方

風引湯 方見金匱

桂枝加括蕒根湯 方見金匱

原方加括蕒分兩倍於桂芍

六物附子湯

治寒厥

附子 肉桂

防己 各二錢

炙草 一錢

梔

茯苓 各一錢五分

水煎服

六味丸 方見時方

白虎湯 方見傷寒



麥門冬湯

方見金匱

白薇湯

本

人平居無疾若忽如死人氣過血還陰陽復通移時方醒名曰血

厥婦人多有之

白薇

當歸

各二錢

人參

甘草

炙各五分

水二杯煎一杯溫服

蒲黃湯

治薄厥

蒲黃

一兩

清酒

十六盞熱沃之

溫服

八物順氣湯

治氣厥

白芷

白朮藥

青皮

陳皮各一錢

人參七分

茯苓

白朮各一錢五分

炙草七分

水煎服

地黃飲子方見時方

平胃散方見時方

玉女煎見頭痛

瓜蒂散

大小承氣湯

調胃承氣湯俱見傷寒

附子粳米湯 方見金匱

三才湯 見咳嗽

涼膈散 方見時方

或加膽南星石菖蒲見中風

舒筋保肝散

治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂脚腿少力乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宜導諸氣

木瓜 五兩

萆薢

五靈脂

牛膝 酒浸

續斷

松節

芍藥

白殭蚕 炒

烏藥

天麻

威靈仙

黃芪

當歸

防風

虎骨 酒炒各一兩

右用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封扎曰足取藥焙乾搗爲細末每服二錢用浸藥酒調下酒盡用米湯調下

喻嘉言曰此治風濕搏結於筋脈之間凝滯不散阻遏正氣不得

通行之方

痰丸

方見時方

治一切實痰異症孕婦忌服

生鐵落飲

方見三字經

治狂妄不避親疎

定志丸

千金

治言語失倫常常喜笑發狂



人參

茯苓

各三兩

石菖蒲

遠志

甘草湯泡去骨一兩

右四味爲末蜜丸梧子大飲服七十九丸亦可作湯服

血虛加當歸有痰加半夏橘皮甘草生薑

五癰丸

治五癰

硃砂

真硃

各一錢

水銀

雄黃

各五錢

黑鉛

一兩五錢用水

銀煨結成砂

研末煉蜜丸如麻子大小兒每服三四丸大人加倍煎金銀花薄

荷湯送下

紫河車丸

癰痼多由母腹中受驚積久失調一觸而發遂成此症此先天受病故用河車丸以人乳送下取同氣相求之義

時賢加當歸人參各二兩硃砂五錢

此方如龍骨龜版石菖蒲皆可加入

紫河車

一具用米湯洗去血生搗

禾米

蒸熟晒乾研末爲丸梧子大空心每服五十丸人乳送下

當歸龍薈丸

方見時方

治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸膈疼痛陰囊腫脹凡屬肝

經實火皆宜用之

葉天土云動怒驚觸致五志陽越莫制狂亂不避親疏非若降之藥未能清爽其神識也

丹礬丸

張石頑

治五癰甚效

黃丹

一兩

白礬

二兩

銀礬中煨通紅爲末入臘茶一兩不落水猪心血爲丸菜豆大硃砂爲衣每服三十丸茶清送下久服其涎自便出服一月後更以安神藥調之

甘麥大棗湯

葉天士加減方

治厥發

丑寅

陽明少陽之陽震動

生地

天冬

阿膠

雞子黃

生龍骨

小麥

水煎服

本方只小麥大棗甘草三味治婦人臟躁悲哀欲哭

葉天士方

治驚恐陽升風動宿痼遂發吐痰嘔逆不言絡脈失利也

羚羊角

石菖蒲

膽星

遠志

連翹

鉤藤

天麻

橘紅

水煎服

小半夏湯加白糯米

葉天士云衝脈乃陽明所屬陽明虛則失闔厥氣上犯莫遏內經  
治肝不應當取陽明制其侮也暫用通補入府取乎府以通爲補  
之義

葉天士藥膏方



案云嘗治顧某陰絡空隙內風掀然鼓動而爲厥余用鹹味入陰和陽介類有情之潛伏頗見小效但病根在下深遠湯劑輕浮焉能填隙改湯爲膏取藥力味重以填實之亦止厥一法

鮮鱉甲

龜板

猪脊髓

羊骨髓

生地

天冬

淡菜

黃柏

阿膠

熬膏早服七錢午服四錢

烏梅丸

方見傷寒

統治厥陰諸症厥熱相間及虵厥久利

柯韻伯曰六經唯厥陰難治其本陰而標熱其體風木其用相火內經云必伏其所主而先其所因或收或散或逆或從隨所利而