

春のさくら

瘍醫大全卷二十四

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

搭錢之柏東陽
楊與用和同校

前陰部

自外腎起至前陰腎囊止一切癰疽疔瘡等證皆彙於此部中以便檢閱參治

龜頭腫痛門主論

澄曰龜頭腫痛有因肝經濕熱下注其腫紅脹宜龍胆瀉肝湯主之外搽介靈丹有因塗搽春藥交接違理其腫滲痛用宜松夢茶洗外搽玉紅膏有因婢妓變童沾染穢毒其腫紫黯一有黃衣溺管必痛小便淋瀝否則莖皮收緊包住龜頭即成袖口疳瘡亦有龜頭之下紅胞如瘤堅硬亦有所患之胞如水光亮即為雞瘻疳瘡治之大法以大黃下之撒毒為主亦有新婚損傷龜頭腫者以濃甘草湯洗之搽玉紅膏

龜頭腫痛門主方

龜頭腫大硬痛

沈員

用雞蛋三個去黃留蛋清將龜頭插入一炷禪香時拔出再以捫青布燒灰存性碾末一錢

加冰片一分搽上過夜即消

龜頭腫痛

蝦蟆二隻炭火炙去皮肉將骨炙酥為極細末每二分加冰片一分碾勻細細搽上

又方 鬼饅頭嫩枝

連根

三四個煎湯薰洗止痛消腫

又方

蝸牛

焙乾

枯礬

各等

碾細濕則乾搽乾則香

油調搽

陰頭癰門主論

王肯堂曰陰頭癰生於陰頭

準純

陰頭癰門主方

驗方

驚甲為末雞蛋清調敷

魚口便毒橫痃門主論

陳寶功曰左為魚口右為便毒兩腿合縫之上名曰橫痃

正宗

魚口 便毒 橫痃



鬼遺方云腿腔兩處起為便毒
王肯堂曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發
寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏
者精與智耳男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留
聚經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所

出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成結也腫初起
切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣準繩
孫曰商賈中野合不潔淫妓便搆此證或疳瘡或楊梅者皆由慾火淫熾一旦交合不潔為淫火沖動膚腠開道是
以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣與毒邪下臨治之非彌年累月不愈
也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主大便使毒邪從
小便中出所治皆順也故治之不拘日便可奏功若曾發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣
之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後著也

陳實功曰左為魚口右為便毒總以精血交錯生於兩胯合縫之間結腫是也魚口生於左腿兩胯合縫之間生於
便毒生於右腿兩胯合縫之間
小腹之下近之陰毛之傍結腫名曰橫痃又名外疳是也此三症得之於奔走勞役濕熱下注者少得之於入房忍
精強固不泄或慾念已萌停而不遂以致精血交錯凝滯結而為腫淫毒內攻者多然其毒從便而入亦當從便而
出治當散滯行瘀通利大小二便初起宜通水丹遂之不應用九龍丹山甲內消散七日以後根本堅固恐其作膿
宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別症難愈謹戒房事正又曰因奔走勞
役而得者即用四妙湯補而消之甚驗

馮魯瞻曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間小兒是肝火肝疳總屬肝經熱毒治宜瀉肝再視血分毒氣為之斟酌
若大人犯此者多因慾火不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結為毒治宜散鬱散氣清利熱毒使精血宣暢
則自然愈矣間有因交合不潔為淫火衝動是以受毒所致者治宜先為發汗次利小便可也錦囊

又曰婦人橫痃或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾其候兩腿小腹腫痛或玉門焮腫作痛憎寒壯熱小便澀滯腹內急痛或小腹痞悶上攻兩脇者肝經濕熱鬱滯也龍膽瀉肝湯玉門腫脹者肝火血虛也加味逍遙散若概投散血攻毒之劑則誤矣

周文采曰便毒初發寒熱交作兩腿合縫之間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與智耳男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人腳腿與小腹合縫之間乃精血所出之道路或觸景而生情或夢寐而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起慎不可用寒涼之藥恐氣血愈結不得宣通反成大患惟當發散寒氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣集驗

申斗垣曰勇疽即俗名魚口生衝門穴啟玄

薛立齋曰魚口者言其形如魚口張而不合也潰後慎勿行動伸縮恐難斂口此症有公有母之分公者小而形長易治母者大而形圓公則只一箇母則三四個若母魚口只用艾炷灸初起者餘者自消

心法曰橫痃疽在左腿夾縫摺紋中形長如蛤陰疽在右腿夾縫摺紋中形長如蛤屬三陰經由七情鬱滯凝結而成漫腫堅硬時痛甚則痛牽罩丸上及少腹形長如蛤一兩月後方能潰破其膿深可知破後膿稠可愈敗瘡最難斂口久必成漏 又曰若膿水淋漓日久生有蟲形類蛇蟲亦係膿深鬱久之所化也屬逆

心法曰便毒又名血疔又名便癰無論男女皆可以生發於少腹之下腿根之上摺紋縫中屬肝腎二經由強力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精搏血留聚於中途壅遏而成或因暴怒傷肝氣滯血凝而發魚口因生於摺紋縫中其瘡口潰大身立則口必合身曲則口必張形如魚口開合之狀故名之也

魚口便毒橫痃門主方

九龍丹

魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者

穿山甲

炒

沒藥

青木香

血竭

滴乳香

兜茶

各一

共為

末用當歸尾三兩紅花二兩酒煎膏丸如桐子大每服二錢熱酒送下數服自消

魚口 不見水猪腰子一個剖開入雄黃三錢貼於患上

山甲內消散

魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者

歸尾

甘草節

大黃

各三

白殭蚕錢穿山甲

片

黑丑

一打碎土水驚去戲

酒水同煎渣再煎服大便行三四次喫淡粥補住避風為妙

魚口便毒初起

生明礬三錢或五錢碾粗末用生酒吞下欲吐忍之出汗即愈一半次全消

胡桃散

大胡桃一個剖開去肉將全蠋二枚裝入燒存性研末熱酒調服

綠鳳散

魚口便毒癰癰核初起 雞蛋一個入瓦罐煮三四滾取起用銀簪打三四十孔再入罐內加芫花末

一錢全煮一二十滾去藥食蛋

通水丹

治下部諸瘡魚口便毒橫痃腹癰初起人壯氣實小便淋瀝者 芫花不拘多少揀淨晒極乾研為極細

末磁瓶收貯每用五分將大棗二三枚去核夾藥在內空心嚙下冷茶過口

便毒

白殭蚕炒當歸生大黃各三錢甘草各一錢穿山甲各五分研細空心酒調服三四錢

魚口

穿山甲炙白殭蚕左顧牡蠣各七分大黃各五分研細酒調服

魚口便毒

芙蓉葉 大黃 金銀花 桔梗 天花粉 陳皮 兒角刺 穿山甲各等 研細為丸如桐子大

每服三十九白湯送下

又方 魚膠切碎蛤粉拌炒研細每服五錢空心酒調下蓋被出汗連服十次外用胡椒一兩研碎燒酒調敷患處

即消

又方 大蝦蟆一個剥去皮入葱五錢連腸搗爛敷患處再以皮覆其上平日消散且無留毒之患如毒

盛未消再如法敷一次

又方 肥兒一枚去核鹽一合醋半斤煮如泥搗敷患處

婦人魚口

川貝母三錢甘草一錢無灰酒煎服孕婦忌服

消魚口便毒橫痃奇方

范令開 九頭獅子草各一錢貝母三錢白水煎服瀉一二次自消重者不過三劑必消

橫痃

長興莫氏 青殼雞蛋一個 刺蒺藜一合 好酒同煮蛋熟剥去殼再煎連蛋服立消

立消便毒

陳古公 廣膠 穿山甲炒連翹各二錢當歸兩荆芥 防風 紅花各二錢斑蝥一個去足炒金銀花八錢車前

大黃

各五錢若弱人 葱三根好酒二三觔煎好空心服之儘量飲醉出汗或下即消

便毒

油核桃七個瓜兒血竭二味揀勻丸如蛋大以鹽泥固濟火煨烟盡安泥地中上以碗蓋熄去泥研為細末無灰酒調下儘量飲醉即消

便毒 槐花一防風 穿山甲又連翹 僵蚕 荊芥各三錢 金銀花五錢 甘草八分 酒水同煎不效加乳香沒藥各一錢

油各立消

魚口 獨子肥兒泥封煨赤去泥將肥兒研細每服二錢酒調服取汗立消

魚口便毒橫痃將成膿者 小粉漿同小活鮑魚搗爛敷上即消

便毒魚口已潰不能長肉收口 狗肉二三觔煨爛取湯洗瘡口淨將狗肉漸漸推入瘡口內令滿外用綢紮定不可行走安息數日瘡肉漸生狗肉漸出盡瘡口長平

魚口初起三五日 五倍子炒黃研末百草霜和勻醋調敷一日夜全消

魚口便毒一日至七日未潰紅腫寒熱 黑丑研白丑 研蠶炒去絲 當歸尾 甘草節 金銀花各二錢 土木鱉去殼

片切 大黃五錢 穿山甲二片 猪牙皂二錢 朴硝錢 右作一劑酒水各一碗煎空心服行三四次溫粥補之輕者一服重者兩服消孕婦忌服虛人減半

便毒起初李岳 皂角子二十粒洗淨空心好酒吞下儘量飲醉一覺即消

便毒 生大黃六錢 全蝎去頭尾 穿山甲各三錢 白芷四錢 水煎服外用千年石灰一兩明礬三錢鹽少許米湯調敷即消

魚口便毒橫痃初起立消 用雞蛋煮熟劈開去黃將蛋連殼合在腫上以艾圓如豈大灸三五壯如未能全消隔日再灸之

魚口 白魚膠五錢剉銅鍋炒黑色略帶黃些研細末用老酒調成團空心時以匙挑放舌上須多用酒吞下其藥直達患處如瘡大可再製五錢服之即消如已潰亦效

陰腫如斗門主方

男子陰腫如斗其色紅赤不能治者 馬鞭草搗爛敷之或煎洗之亦效

陰腫大如斗核痛 白礬二兩 雄黃一兩 甘草五錢 水煎先黃後洗神效

囊腫秘方錦囊 川椒 麥芽炒焦 地膚子各一兩 葱白頭連根者二十根 煎湯淋洗囊上良久次日再洗以消為度

小兒風熱外腎焮赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如雞卵殼狀同春 老杉木燒灰入膩粉清油調敷之神效

陰癰腫大不消 硼砂水研塗之大有效

陰腫

下疳

小兒坐地多時或風邪或蟲蟻吹呵陰囊腫硬 蟬蛻五錢水一大碗煎洗不過三次腫消痛止更服五苓散加燈

心煎服 又方 蔥園中蚯蚓屎研細以甘草湯調敷

小兒外腎赤腫 老杉木_{煨存} 宮粉_{各等} 研細清油調搽並治大人繡毬風

腎囊羣丸腫大 棉花子仁一兩煎湯常洗自消

氣卵胞 老絲瓜皮 老生薑皮 共入鍋內炒沖生白酒熱服得汗即消

下疳門主論

王肯堂曰下疳瘡生數口_編 又曰小腹至陰之下

玉莖之根癢極沸湯沃之稍止而復作有三四竅黃

水淋漓若幼時曾患惡瘡後來亦有此症作_{結毒以}

陳實功曰下疳者乃淫慾邪火鬱滯而成其來有三

一由男子慾念萌動陽物與舉淫火猖狂而未經發

泄以致敗精濁血流滯中遂結而為腫初起必先小便淋瀝溺痛次流黃濁敗精陽物漸漸破損甚則腫痛腐爛治

當疎利肝腎邪火為主用清汗導滯湯主之一由婦人陰器於精濁氣未淨接與交媾以致淫水毒精傳襲而成初

起必先皮腫光亮甚如水晶皮破流水腫痛日生麻癢時發治當解毒消風為主如龍膽瀉肝湯合平胃散主之一

由房術熱藥塗抹玉莖洗擦陰器助陽火煽動陰精僥倖不衰久戰不泄多致精助火鬱未發而成皆由蘊毒所

致初起陽物癢痛堅硬紫脹疔瘡漸生腐爛漸作膿水淋漓不時與舉治當瀉火解毒為主如黃連解毒湯蘆薈丸

主之_{正宗}

蔣示吉曰又有先發時瘡誤用薰條擦藥收斂結毒於此者最重必成蠟燭卸矣_{約說} 又曰如肝經濕熱下注者不

過澀淋黃濁莖中作痛不紅不腫者輕 又曰濕熱下注者輕淫火毒發者重 又曰下疳又名曰關精瘡其潰爛

日甚者名蠟燭卸 又曰若小便淋瀝漸爛漸開色紫無膿癢如針刺者難治

馮魯瞻曰下疳者玉莖生瘡甚至蝕透而久不愈宜內服燥濕解毒外用薰擦可也多係肝經濕熱故尤宜清汗除

疳 下



濕癩

李東垣曰妬精瘡因壯年人精氣盈滿久曠房室陰上生瘡亦腫作害妨悶癢痛者是也

申斗垣曰龜頭及莖上有瘡腫焮於內而外則皮裏不見其瘡如袖口之色手故名曰袖口瘡最為難治何也蓋藥不能透至瘡上治法用藥加冰片膏子入雞蛋殼內套龜頭上浸之內服清肝腎濕熱藥

而痛亦寥寥中有水此乃交媾不洗肝經濕熱所致肝性主臊故瘡亦臊名曰臊瘡宜用兜茶敷之

用地骨皮泔水洗過取室女首經布燒灰搓之立效

寶漢卿曰玉莖內生瘡名曰蛀桿玉莖外生瘡名曰蛀桿

胡公弼曰妬精瘡乃陰頭潰爛成膿或癢或痛蓋緣後生未娶精氣溢盛陽物興起當泄不泄強泄服裂龜頭嫩皮日久潰爛腐肉成膿間有害其生命者治之當戒房事外以黃柏皮散煎洗拭乾再搽詞子灰散或銀粉神丹

陳遠公曰龜頭生瘡瘡服敗毒藥盡從二便而出倘大腸燥結則敗毒藥不能走大腸勢必趨小便而出小便口細毒難盡泄於是毒不留於腸中而單結於外勢毒必發安得不腐爛哉往往連龜身爛盡人多以藥外敷雖外

藥亦不可少然不先消火毒遽用外遍不當如石之壓草也故必先內治之用散毒神丹茯苓一兩黃柏生甘草黑

梔仁各三錢肉桂一錢水煎服四劑火毒感盡從小便而出疼亦少止後用生勢丹敷之炒黃柏三兩兜茶生甘草

各一兩大黃三錢丹砂如見乳香沒藥各一錢冰片麝香各三分為末搽之疼即止數日膿血乾筋肉再長一月全

愈但不能長龜頭也愈後服十全大補湯一二月則外勢仍能伸縮尚可種子若多服敗毒泄火之劑無論命門寒

冷而外勢亦且冰冷安能陽和之驟復哉此治法之次序也

心法曰下疳統疳瘡又名妬精瘡生於前陰經云前陰者宗筋之所主督經脈絡循陰器合纂間

二陰是瘡生於此屬肝腎三經也其名異而形殊生於馬口者名下疳生於玉莖上者名蛀瘡莖上生瘡

外皮腫脹包裹者名袖口瘡龜頭外腫如瘤者名雞瘡瘡久而偏潰者名蠟爛瘡痛引辜丸陰囊腫墜者

名雞脫瘡痛而多膿潰而不深形如剝皮爛店者名瘡瘡生馬口傍有孔如棕眼眼內作癢捻之有微膿出者

名鐵根瘡生楊梅瘡時或誤用黃搭等藥以致腐爛如四者名楊梅瘡又生楊梅時服輕粉水銀打成刻藥以

下疳

下疳

下疳

致便溺尿管內刺痛者名楊梅內疳
澄曰凡治下疳第一戒患者喫鹹若肯飲食喫淡一月收功只消半月

下疳門主方

九味蘆薈丸 當歸 胡黃連 川芎 蕪荑 白芍 各一龍膽草 酒浸炒 真蘆薈 廣木香 甘草 各三

右為末米粥搗丸麻子大每服一錢或一錢五分白湯送下若虛者佐以加味歸脾湯加味逍遙散治之

珍珠散 下疳皮損腐爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿不能生皮又治新瘡玉莖損傷新娶陰戶傷痛搽之極效並

治湯瀝火傷皮損肉爛疼痛不止 新白珍珠 一錢以豆腐內煮數度研上好花青 五分即青黛 輕粉 一三味共

研干轉細如飛麵磁瓶收貯初起搽之即愈若腐爛疼痛甘草湯洗淨猪脊髓調搽又治婦人陰蝕瘡極效湯瀝

火傷痛者以玉紅膏調搽 滑石 沒藥 龍骨 各等 右研極細末乘瘡膿汁未乾搽之不可見水自結痂矣

又方 紅東去核將銅綠成塊者在裏內於炭火上煨存性研極細末加大呢水片再研磁瓶密貯先將瘡

上用陳松蘿茶洗淨軟絹拭乾將藥搽上雖龜頭爛半者無不奇效 又方 螳螂子 煨白殭蠶 煨兒茶 輕粉

各等 研極細用甘草湯洗淨搽之 又方 玉莖瘡瘡或漸至蝕透有爛去一半者服之而愈 扁蓄 黃連

兩甘草 兩一 水煎內服外洗 又方 甘蔗頭 煨兒茶 三冰片 一分

瘡瘡簡便方 用戴舊油透羅縵帽沿燒灰杭粉瓦上煨黃色各等分共研極細磁瓶中收貯先用紅棗十五個甘

草三錢煎湯溫洗患上挹乾搽之 又方 蟾蜍窩拭淨貼之 又方 安慶 白螺蛳 要叮在岸上的四十九枚陰陽

用大田螺二個將膈挑開入冰片三分同螺化水雞翎上攪如未痊可如法再製服 又方 蟹殼煨研加冰片

少許搽之 又方 鉛粉 煨冰片 分 研細外以銀花 蕪荑 花 椒 煎湯洗淨乾搽 又方 血竭 兒茶 乳香

油 龍骨 末 沒藥 三錢 研細搽之 又方 早田螺 煨麝香 輕粉 冰片 分 研細香油調搽 又方

燈草灰入輕粉麝香少許乾搽 又方 防風煎湯洗

下疳妬精瘡 七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

金螺散 大田螺數枚水養吐盡泥沙俟屬開入研細冰片末同螺化水以鉛粉填滿仍用磨合上放新瓦上煨令紅亦去殼研細又填入第二螺內又煨如此三次研細密貯任用

二靈丹 下疳初起流膿 兜茶一錢冰片三分 研勻將瘡先用冷茶或甘草湯洗淨挹乾以雞翎將藥掃上龜頭爛半 竹蛀蟲糞 銀粉 臘肉骨髓 松香 研細和勻用燒酒將瘡洗淨以搽之內單服土茯苓湯

當茶 七寶橫榔散 玉莖瘡瘡或漸至蝕透久不愈者 橫榔 密陀僧 牛黃 輕粉 黃連 黃柏 朴硝 研末先將葱白漿水洗淨軟帛拭乾如瘡濕乾瘡乾油調搽

聖粉散 下疳瘡蝕臭腐爛痛不可忍 密陀僧 黃丹 黃柏 孩兒茶 乳香 輕粉 三錢研極細用葱湯洗瘡濕則乾搽乾則用香油調搽兼治小兒疳瘡

玉莖生疳爛去大半 吧嗒杏仁二錢研細紙包壓去油取淨白霜一錢加冰片三分再乳絕細聽用先以甘草煎湯洗淨挹乾搽上

下疳痛不可忍 黑羊角 煨穿山甲 二錢乳香 去油 沒藥 去油 各一錢 研細酒調服 下疳大爛 黃蠟 八錢 白蠟 面粉 各一 冰片 一錢 麻油 三兩 先將油與二蠟熬化隨下面粉次下冰片和勻作

隔紙膏貼之五日後痛自止肉自生矣 銀粉散 胡公錫 治下疳母論新久腐爛作痛及楊梅瘡毒後結毒玉莖腐爛或陽物爛半者 好錫六錢化開入珠

砂末二錢攪炒炒枯去砂留錫再化開入水銀一兩和勻傾出聽用又將杭粉一兩鋪火紙上捲成一條以一頭點火燃至紙盡吹去紙反單用粉同前錫末加輕粉一兩共研極細末收貯凡遇前症先用甘草煎湯淋洗拭

乾以此藥搽上即止痛生肌收斂 妬精瘡 玉莖爛一二寸者兼用柯子反散神方 用鶴仙 黃柏 荆芥 甘草 馬鞭草 葱全煎洗取膿

柯子反散 黃柏 炒存 柯子 反各二 麝香 許 共研極細搽患處令睡醒服冷水兩三口切勿令陽道興起脹斷

瘡 磨二七即愈 黃柏 一方 無

銀粉神散

專治玉莖蝕生

長如初止少元頭者或舌頭被人咬去抹上此丹亦能長全大有神功

黑鉛

五錢

輕粉

五錢

水銀

五錢

研砂

珍珠

各一錢

先將黑鉛化開投水銀研不見星共為細末收貯前症

先用蔥艾花椒煎湯洗淨若怕洗畏痛須先薰止了痛再洗拭乾上藥若舌頭咬去先用乳香沒藥煎水口噙之

止痛後上藥自然生長全愈

兒茶散

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳久不愈

海藏

橡斗子

二枚

合盛黃丹

令滿以亂髮厚纏定燒烟盡為度同研為細末先以蔥白熱漿水洗瘡

膿淨再上藥不過三次如神

陰頭生瘡

孫真人

蜜煎甘草末頻塗之

竹節霜

百效

龜頭因熱毒馬口結蕊或粗衣擦損

取新竹節上霜刮下一擦即愈

下疳蝕爛

白菓樹葉包裏

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

下疳

南北鉛製白霜一錢紅升丹三分乳勻搽上更妙

疳瘡舌爛鼻爛龜頭爛

黑鉛一兩八錢黑狗腦內以鹽泥封固每用法製鉛末一錢五分加乳香油去油

鉛霜各三硼砂五分雄黃分金箔十張寒水石四分輕粉二分

共乳細末磁瓶密貯古斷者用米泔水葱茶煎湯溫

救拭乾上藥待長時洗去藥又漸漸搽之

龜頭爛者又以蔥湯薰洗過搽之

疳瘡常立庚龍膽草

山梔生用當歸尾

木通 黃芩 柴胡 澤瀉 生甘草

白水煎痛加荊芥 防風

白芷

如紅腫加

川連 大黃

蛀桿疳爛去半段者

先用苦茶洗淨用黃連末搽三四日待腐肉去盡取雄犬玉莖連肉在火上炙黃煨乾存性

為末每用少許加入黃連末內搽之犬莖末只可逐日漸加不可驟用太多則收口速而反裂破矣至多亦不過

與黃連末等分為率

下疳

輕粉 黃柏各一

共研細末先用麥門冬煎湯洗洗搽之

下疳紅腫熱痛

鯉魚膽汁敷

大莖甘草湯

黑豇一合

生甘草一兩 赤皮蔥三根 槐條六十 煎洗一切疳瘡

一子消毒散

肥皂子

杏仁 炒蟬蛻

殭蚕 皂角子

枝各七

土茯苓八兩

猪牙皂一條

荊芥

防風

牛膝

各一

金銀花

猪板油二

水八碗

煎三碗

早午晚分三次

服如

結毒服二十一日全愈

袖口疳

加黃柏一錢

肥皂子加倍

楊

梅瘡

加菜豆側柏葉糯米各三錢

內疳加海金沙白

且五分

研極細乾搽或鴨蛋清調搽

鳳衣散

抱雞卵

黃丹

冰片二分

輕粉一錢

研極細乾搽或鴨蛋清調搽

早螺散

冰片

麝香

白田螺殼

輕粉一錢

研極細以香油調搽之

白玉膏

貼疳瘡一切瘡

白芷

蘆甘石

甘松

當歸尾

乳香

五靈脂

三奈

北細辛

樟冰

各五錢

沒藥

象皮

白蠟

松香

冰片

麝香

鉛粉

先將麻油二

筋熬成至烟起離火入白蠟松香

又熬不住手攪看有泡起便將鉛粉陸續下但滾即取起稍停又入火如此數次見有菊花紋小泡便入前諸藥末

仍取起滴水成珠入冰麝攪勻待凝定時傾水三兩盞入罐收貯聽攤貼

鳳凰散 治男女下疳腫爛疼痛難堪並治一切皮腫破爛諸瘡即時消腫定痛拔毒生肌 抱雞蛋殼連衣 乳

細末每一錢加冰片二分密貯用時或乾搽或搽膽汁或麻油調敷

黑膏散 治男女下疳瘰癧不可當者並一切極癰諸瘡 橄欖核煨灰 研極細末每一錢加冰片二分密貯或乾

搽或麻油搽膽汁俱可調搽

蠟燭卸下疳 抱過雞蛋殼煨存 黃連 輕粉 各等分乳細香油調搽立時止痛結靨

下疳 陳拾灰 橄欖核煨灰 兜茶 輕粉各三錢 冰片錢 研極細末搽上用雞蛋軟皮黃連湯煮過 貼之

初婚玉莖傷損門主論

陳實功曰凡初婚玉莖擠夾傷損出血疼痛者先以蔥湯洗淨隨用珍珠散加冰片搽之腐皮漸乾痛自漸止矣正

傷寒瘰癧後內外瘡門主論

馮魯瞻曰傷寒瘰癧後若小便澀有血者亦是餘熱毒也名曰內外瘡亦皆有膿若不出膿者死宜用黃連解毒湯加

生地當歸尾連翹木通滑石牛膝扁蓄琥珀甘草梢之類錦囊

囊癰門主論

王肯堂曰囊癰乃足厥陰肝經所主乃濕熱流入肝經而成治當清肝家濕熱佐以養陰固腎 又曰腎陰毒即陰

囊疽乃坐卧濕地久著汗濕衣袴寒濕下攻陰注經絡久而不散遂生此症初起陰囊紅腫疼痛者是也

朱丹溪曰囊癰即外腎癰也此癰生陰囊之上其症最酷陰道多虧濕熱相聚致生此毒若不速治則囊裂辜丸外

懸可用青荷葉包之或紫蘇葉洗去 包之或單油紙煮過包之

陳遠公曰有陰囊左右生癰者名曰便毒生於囊之下黃門之前名曰囊癰三處相較便毒易治囊癰最難治以囊

之下為懸癰其皮肉與他處不同在他處皮肉或橫生直生俱易合口而囊下橫中有直直中有橫不易收功此皆

少年貪於酒色忍精而闕耐飢而交或苟合有毒之婦或闕精有瘡之妓所謂欲洩不洩化為膿血是也治必大補

其虛化以化毒之味以毒因虛而成不治虛得乎逐邪至神丹金銀花四兩 蒲公英二兩 人參兩 當歸兩 生甘草兩 大黃

錢天花粉錢 水煎二服全愈潰者三劑收功此方用金銀花公英佐以參歸大黃之料未免霸氣然大虛之症又

用大黃甚透似乎不宜誰知毒感乘初起之時正氣未衰大補瀉火之為得乎倘因循不敢治及至流膿出血正氣蕭索始用參耆補氣往往用至數斤尚未能復元氣何若早用於化毒之中正又未傷毒又易散此因勢導利之法不可不知也

水腫

又曰有飲火酒入房精不得泄至半夜寒熱煩渴小便淋赤痰涎湧盛次日囊腫焮痛又次日

囊處盡腐玉莖下貼囊者亦腐人以為酒毒也誰知肝火酒毒濕而肆虐乎夫酒何至作腐蓋火酒大熱之物也人過飲火酒多致醉死死後身體腐爛以火酒乃氣酒遇熱自焚人身五臟六腑原自有火以火引火安得不炎燒耶飲火酒入房鼓動精房之火宜是命門之火非肝火也然木能生火肝木生相火理之常也入房借火酒之力火勢必猛火動無根復能久乎必精泄而火解矣無奈精欲泄而阻抑之火無泄路又無可依火酒又無解於是火入於肝將依母自歸也惟是相火內火也可附肝以為家而火酒外火也反得木而焚體囊與玉莖乃筋之火也筋屬肝因入房而聚陰器之際故火發而囊腫囊腫極而莖亦腐矣治法解酒之毒益以補氣血之品則濕熱解而腐肉長矣用救腐湯人參兩當歸二黃耆二白朮二茯苓五黃柏鉅炒梔子鉅三汶仁鉅澤瀉錢三白芍兩葛根鉅水煎服四劑腐肉去而新肉生又四劑囊莖悉平復矣酒毒成於拂抑平肝泄火利濕解毒宜也何以用參耆歸木大補氣血耶大凡氣血盛者力能勝酒縱酣飲無碍服火酒而腐必成於火酒之毒亦其氣血之衰力難勝酒所以兩火相合遂至焚身外腐苟不急補氣血則酒毒難消腐肉又何以連長哉

陳實功曰夫囊癰者乃陰虛濕熱流注於囊結而為腫至潰後畢凡懸掛者猶不傷人以其毒從外發治當補陰清利濕熱取效者十有八九近時人誤用店家熱藥多致熱甚為膿必難收欲初宜龍膽瀉肝湯稍久滋陰外敷金黃散如腫痛日久內膿已成脹痛者即針之內服十全大補湯加山萸肉丹皮澤瀉治之聞以六味地黃丸正宗馮魯瞻曰書曰癰疽入囊者死是屬肝經濕熱初起腫痛小便亦溫治宜清利解毒為主若膿已成而小便不利者是毒未散也當針泄之若膿已出而反痛者是氣血虛也當補益之倘元氣未虧而陰囊悉潰畢丸懸露者亦不為害錦囊又曰若小兒患此而由乳母多怒者宜子母並服清汗之藥又曰陰囊潰爛畢丸脫露名曰脫囊用紫蘇葉莖為細末如濕乾敷如未破者用香油調塗將青荷葉包上內服苓連甘草木通當歸之類多得保全患諸寶漢卿曰囊癰倘膿熟開刀須待膿熟用油頭繩紮住腎子以小刀開海底穴其膿血即流盡矣

體外亦不死但未知下虛人老者何如耳精要

汪省之曰囊癰乃濕熱下注濁氣順下流入膀胱陰道有虧濕熱不利有作膿者故滋陰除濕之藥斷不可缺膿盡

則自安耳理例

胡公弼曰又有因腹腫脹漸流入囊腫甚而囊自裂開畢丸懸掛在外水出不止用杉木炭末敷上外以紫蘇葉厚厚包裹令患人仰卧養息肉以龍膽瀉肝湯加滋陰藥服之自愈青囊

囊癰門主方

驗方新都醫案 瓜蒌 甘草節 金銀花各五錢 連翹 柴胡 青皮各二錢 水煎服

囊癰潰後 蚌殼煅 黃連 青黛各等 研細搽之

囊癰潰漏皮硬厚而出水者皆能治 蒼朮 吳茱萸炒 川芎 當歸身各一錢 白木 天花粉 官桂 木通各八分

青木香五分 生黃耆二錢 龍膽草五分 蛇盤菜以草代之無即 右判一劑白酒一碗煎空心服

囊癰渾身發熱口渴咽乾囊上紅腫疼痛是也 杜仲用鹽水拌炒斷絲磨為細末 生酒一酌煎半酌服之取汗即

消腫定痛如未愈再用一服即愈 如外敷用明雄黃一百草霜 研勻蜜水調敷如乾以雞翎蘸水潤之愈後再

用除根藥 用生南星 蘇木 紫蘇葉各五錢 陳香緣同 共為細末取末膏下水的健猪尿泡一個以酒煮爛搗

化金藥末搗勻做餅曬乾烘脆再磨為細末蒸餅打糊為丸空心燒鹽湯送下八九十丸服此一料永速除根不發

囊癰 海螵蛸 蛤粉 兒茶各等 研極細搽之 又方 乾荷葉 紫蘇葉各等 研極細酒調根不發 外敷

腎囊風門主論

王肯堂曰腎囊風即腎囊風瘡生於隱處癢癢成瘡挾有耳鳴目癢鼻赤齒浮指甲縫白等證是也準繩

戴院使曰癰風俗名腎囊風瘡因精水調外為風濕所襲從陰囊濕汗作癢起流注四肢手足白色惡生瘡瘍宛原

葉或成甘草歸氣洗外用煎藥根 陳寶功曰腎囊風乃肝經風濕而成其患作癢喜浴熱湯其形腎囊死瘡頑麻破流脂水者是正宗

陳寶功曰腎囊風乃肝經風濕而成其患作癢喜浴熱湯其形腎囊死瘡頑麻破流脂水者是正宗

腎囊風門主方

繡毬風 老杉木一段燒存性研細用熟雞蛋黃炒枯取油調搽

又方 苦參 蛇床子各二兩 吳茱萸一兩 水四大碗煎一半候溫洗之帶濕撲上後藥寒水石硫黃各等分研細搽

土絹帛包紮 又方 豆殼煎湯洗 又方 磨古鏡水搽 又方 落蘇葉煎湯洗並燒灰搽 又方 韭菜

煎水洗 又方 苦參二兩 白茯苓五錢 甘草細楊柳葉煎湯乘熱薰洗後用蚯蚓屎焙燥研搽三四次愈

陰毬開花單方 狗獃子七個煎湯入罐內將陰毬掛罐口離一二寸湯候黃待溫傾盆內洗之如此者三日全愈

腎囊癢 荷葉 吳茱萸 蒼水各一兩 水煎滾臨洗加皮硝一兩洗之

繡毬風 五梧子一個錐一眼入銀砂一錢用陰陽瓦焙研細末麻油調搽

洗方 藏靈仙 蛇床子 土大黃 苦參各五錢 砂仁殼三錢 老葱頭七個 煎湯薰洗

腎囊風 山萸肉的核子煎湯溫洗

又方 蛇床子 艾葉 吳茱萸各一兩 水煎百沸放盆內加芒硝五錢化盡頻洗 又方 紫蘇 明礬 葛蒲

臭樹花 浮萍 花椒 共煎湯薰洗數次除根 又方 乾荷葉煎湯薰洗二三次 又方 絲瓜子仁酒煎

臨臥服之出汗即愈 又方 繡毬花煎洗 又方 牆頭上醬板豆草或鮮或陰乾煎洗

囊風癢痛黃水不乾者 蚯蚓泥 鉛粉 井水調敷

腎囊生瘡門主論

卵袋生瘡抓之流水 陳紫蘇 大紅椒 煎湯薰洗三次

外腎生瘡 蚯蚓尿二兩 萊豆粉一兩 水研塗乾又敷

濕陰瘡門主論

李東垣曰濕陰瘡由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之癢癢成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也精義

胞漏瘡門主論

申斗垣曰肝經濕熱外胞囊上起粟子作癢甚則滴水濕透中衣名曰胞漏瘡或 又曰又有楊梅瘡毒結於此以

致腎囊破裂漏水腥臭久治不痊宜土茯苓湯加入參等補藥治之

疝氣偏墜門主論

夫疝者是陰氣積於內復為寒氣所襲而發故素問以下論疝皆以為寒然不可單論曰寒蓋雖為寒鬱而作亦由醉飽無度內蒸濕熱痰積流於厥陰木性急速又為寒束是以痛甚症雖見於腎症實本乎肝厥陰肝脈絡於陰器耳可見內積濕熱鬱於中外被寒邪鬱束於外且有痰飲食積死血鬱結為病故謂專主肝經而與腎絕無相干也其候羣丸牽引小腹或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙激搏而痛無有定處不堪忍也其症有七寒水癰血氣狐筋是也錫飲寒疝者厥陰經中受寒故筋攣卵縮其狀囊冷結便如石陰莖不舉或控羣丸而痛此必得之於久坐濕地寒氣鬱於外也水疝者囊腫痛而狀如水晶陰汗時出癢癢而出黃水小腹按之而作水聲此必得之於醉酒房勞汗出遇風濕熱乘虛流結囊中二便脹秘不通也癰疝者陰囊腫大如升斗不癢不痛此因感受濕氣是以陰核氣結亦有鈎痛者血疝者狀如黃瓜在於小腹兩傍橫骨兩端俗名便離此乃得之重感春夏大燥勞動使內氣血流通滲入將囊結成癰腫也氣疝者上連腎區下及陰囊是或號哭忿怒氣鬱急迫而脹痛此必因父精怯陰痿強力入房成胎乃胎病也孤疝者其狀如瓦卧則入腹行則乃出腹入囊似狐之畫出穴而溺夜入穴而不溺故名孤疝也蓋環陰器上抵少腹者肝經之部分是受疝之處也一切疝氣非肝木受邪即肝木自病此乃肝經自病也筋疝者陰莖腫脹或潰膿而痛裏急筋縮或莖中痛痛極作癢或陰不收白物如精而隨溺出此得之於房勞或邪術所致也更有木腎者蓋心火下行腎水自溫真陽下降腎氣自和既溫且和焉有木強者哉此因嗜慾內戕腎虛以致陰陽水火不接乃沉寒脹大而痛硬也羣丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多也又有身體發熱耳後忽生疥腮紅腫脹痛腮腫將退而羣丸忽脹一丸極大一丸極小似乎偏墜而實非蓋耳傍乃少陽膽經之分與肝經相為表裏少陽感受風熱而遺發於肝經也婦人小腹傍逼近陰處併結脹痛或皮裏頂起如鴛子大乃寒氣聚於厥陰所致小腹受寒其病即發是謂陰疝女子血涸不月足僻咽乾癰秘小腹有塊前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不名疝而名瘕古方以烏頭梔子等分加鹽酒服之名梔附湯其效亦速後因此方隨症加減無有不應須分濕熱多少而治之