

胎產心法

卷上

下半

胎產心法卷之上

上谷間純璽

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼重則脹滿疼痛謂之子懸紫蘓飲爲必用之藥蓋因紫蘓飲爲治妊娠胎氣不和濁氣舉胎上湊胎熱氣逆心胃脹滿之證且此證挾氣者居多宜疎氣舒鬱非紫蘓腹皮川芎陳皮無以流氣非歸芍無以養血氣血旣利而胎自降然邪之所湊其正必虛故以人參甘草補之如飲食不甘加四君子有熱加苓梔歸芍內熱脯熱或四君兼逍遙散

若常常多怒時覺脹滿服順氣藥不應宜用和氣安胎飲或加味道遙散胎上攻而作痛宜紫蘇飲或順氣安胎散若脾虛停滯脹滿安胎飲力薄宜用加參平胃散有因鬱滯者亦宜紫蘇飲或加味歸脾湯有因痰結聚者紫蘇飲加芩連貝母有因暴怒者左關必弦洪肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔大抵胎氣上逆皆屬火旺急用芩木香附之類不可服大寒之藥反致他變予每治孕婦心胃脹滿用尊生和氣飲甚效子懸證有兩尺脉絕餘脉平和不可錯認死胎且死胎有面青舌青可辨宜紫蘇飲消之則胎歸原位脹消脉起

大如臨月胎上逼心嘔噦欲死急用車便灌之即下或烏梅
肉十枚研爛入生薑三片煎湯灌之亦下取酸以降飲之兼
辛以散火氣之逆也又有因坐草太早心懷恐懼氣結不行
紫蘗飲一服便產○後附針灸一方備用

四君子湯 治胃氣虛弱飲食不思倦怠少食

人參 一錢至三錢 白朮 一錢至二錢土炒黃

茯苓 一錢至錢半 炙甘草 六分至一錢

水煎服

逍遙散 附八味逍遙散又名加味逍遙散 治血虛肝燥

骨蒸勞熱往來寒熱咳嗽潮熱月經不調口乾便澀

柴胡

當歸酒拌

白芍酒炒

白朮土炒

茯苓各一錢

炙甘草五分

加煨薑薄荷引水煎服。○一方無茯苓薄荷有茯神生薑
爲引治肝脾血虛鬱怒傷肝血少目暗發熱脇痛等證。○
加丹皮梔子各七分名八味逍遙散又名加味逍遙散治
小便帶血或過勞及多食炒炙宜清膀胱之火柴胡當歸
加倍白朮加五分

和氣安胎飲 治孕婦多怒胸中脹滿若用烏藥香附

砂仁順氣等藥反加蒲朮宜服此飲

人參

白朮土炒

當歸

酒洗各二錢

川芎

條芩

各八分

陳皮

紫蘇

炙草各四分

木香

二分磨汁衝服

薑引煎服○一方無木香有砂仁

四分

名順氣安胎散治

孕婦胎氣上攻心腹脹滿作痛子懸之證有因氣惱者加

木香二分磨衝服。

加參平胃散 治孕婦脾氣虛弱飲食停滯以致腹脹
嘔吐安胎飲力緩宜用此散

人參

蒼朮 米泔浸製

陳皮

薑一片水煎服

尊生和氣飲 治孕婦心胃脹滿

人參

燕梗

白芍酒炒

川芎各六分

常歸一錢或六分酒洗

腹皮五分製淨

木香二分磨衝藥服

炙草三分

水煎服

附針灸方

妊娠六七個月。飲食絕然不進。胸膈脹。水與藥皆不能下。診脉平和。又非病脉。此乃隔氣不通。藥不能治。惟針灸可通。宜灸內關穴。即能進飲食矣。其穴在手掌大紋後二寸。兩筋間。此穴可針。亦可灸。男左女右。重則雙手同灸。輕者

七壯重加十數壯。艾如黍大。或如麥大。寸取本人同身寸。以左女右手。中指屈回。用草較所屈中指中節內紋兩頭盡處截斷。爲準一寸也。

紫蘓飲

見本卷安胎門

小柴胡湯

見本卷諸痛門

加味歸脾湯

見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極。如同月水。胞乾胎死。母亦難保。其調治之方。已詳論於胎漏門中。茲不重論。

妊娠吐血。凡七情內傷。六淫外感。皆足致失血之患。一主火熱者。以氣血壅養胎元。或有所感。則氣逆而火上乘。心煩滿悶。血隨而溢。甚者或致墮胎。但火有虛實之分。實火清熱養血。虛火滋陰補水。則血安胎固。若妄用行血清血之劑。胎必墮。而禍不旋踵矣。加肝經怒火。加味道遙散膏。梁積熱。加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘇飲。氣不攝血。補中益氣。去升麻。加煨葛根。腎經虛火。冬味地黃湯。

鼻衄不止。東垣涼膈散。加當歸生地。

各一錢

茅花一大團生

舊引。

咳嗽咳血。宜涼血。地黃湯。醫通云。咳嗽咯衄。胎前皆不宜見。如面赤聲啞。不治。又云。凡咯吐血。多致墮胎。胎賴血養。不宜漏溢。宜紫藕飲。加條芩。

尿血。乃熱乘血分。流滲於脬。故令尿血。自尿門而下。若胎漏。則自人門下血。可辨。宜四物。加山梔。髮灰。或阿膠。熟地。麥冬。五味之類。如怒動肝火。小柴胡。加山梔。脾氣下陷。及勞動脾火。補中益氣。加茯苓。車前。若厚味積熱。加味清胃散。若肝脾血熱。加味道遙散。

腸風臟毒下血者平胃散去蒼朮加槐角防風當歸烏梅治之。

加味清胃散 治胃中蘊熱。斑疹。口舌生瘡。齒齦腐爛。

出血

生地 四錢

丹皮 五錢

當歸

川連 酒蒸

連翹 去心各三錢

升麻

生草 各一錢五分

爲散。分三服。水煎。去滓。衝犀角磨汁三四分。入藥服之。

黃芩清肺飲 治渴而小便不利。

梔子炒黑

黃芩

各等分煎服。○予謂此方乃治雜證發渴而小便不利。妙在熱服探吐以提則肺氣立清。然胎前血證探吐之法似非所宜。若服而不吐不特綿延不能刻應。縱或小差其苦寒之性。畱薄於內。大傷氤氲之氣。治胎前之證者得不爲之預慮乎。

冬味地黃湯 附九方

熟地 四錢

山藥 二錢炒

山萸 一錢古方分兩加倍 皮

茯苓

澤瀉 各七分

麥冬 一錢或錢半

五味子 十粒

水煎服。○此方藥味十倍之煉蜜丸

即名冬味地黃丸
又名八仙長壽丸

涼血地黃湯

治妊娠咳嗽吐血咳血

生地 三錢

麥冬 去心

當歸 酒洗各二錢

黃芩 一錢五分

紫苑

知母 鹽水炒

白朮 土炒

天冬 去心各一錢

胎產心法

卷上

犀角

八分

陳皮

甘草

各四分

水煎服有喘加瓜蒌仁一錢

加味道遙散

見本卷子懸門附味道遙散下

加味歸脾湯

見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

紫蘗飲

四物湯

俱見本卷安胎門

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散

俱見本卷諸痛門

子腫子氣子滿論

子滿證卽俗呼胎水證也

妊娠子腫與子氣相類但子氣在下體子腫在頭面若子滿證又名爲胎水則在五六月已後比子氣子腫不同蓋胎大則腹滿遍身浮腫凡子氣子腫子滿由臟氣本弱或因泄瀉下利耗傷脾胃或寒熱瘧疾煩渴加飲濕漬脾胃使頭面手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞故初妊卽腫急宜調治水去脹消仍用六君子調補

所謂子腫者。姪娠面目虛浮。多因脾胃氣虛。或久瀉所致。宜健脾利水。全生白朮散主之。或用健脾利水湯。如未應用。六君子湯。或加腹皮車前。又專治肢體如水氣之證。亦有用加味五皮湯。治子腫之甚者。

所謂子氣者。姪娠自三月成胎之後。兩足面漸腫至腿膝。或腰以下腫。行步艱難。以致喘悶不寧。飲食不美。似水氣狀。甚至脚指間有黃水出者。蓋脾主四肢。脾氣虛弱。不能制水。而發腫。肺金少母。氣滋養而氣促滿悶。諸書名曰子氣。卽水氣。俗名皺脚。治此病者。先服加味天仙藤散。如不效。則服茯苓