

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百六十八



北京中醫藥大學圖書館版權所

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三

周王朱櫛 撰

傷寒論

大小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久
傷於寒本則不免耳天行非節之氣其亦得之有時
行疾疫之年小兒出腹便患寒者有也治其時行節度故

如大人法但用藥分劑少者藥較少耳 傷寒者冬時

嚴寒而人觸冒之寒氣入於腠理搏於血氣即寒熱頭痛體痛謂之傷寒其無驚者是熱乘心心主血脉小兒心神易動為熱所乘故發驚其大便不通是寒於氣而生熱熱流入大腸故燥澀而不通其咳嗽者邪在於肺肺主氣傷寒邪氣先客皮膚隨氣入肺故令嗽重者有膿血也其自汗者陽虛受邪陰氣又虛邪氣又乘於陰陰陽俱虛不能津液所以汗出也其餘熱往來是邪氣與正氣交爭正氣勝則邪氣却散故寒熱俱歇若邪氣

未盡者時干於正氣正氣為邪氣所干則壅否還熱故
餘熱徃來不已其嘔者是胃氣虛熱乘虛入胃得熱則
氣逆故嘔也其渴者是熱入臟臟得熱則津液竭燥故
渴也其鼻衄者是熱搏於氣而乘於血血得熱則流散
發從鼻出也 夫小兒傷寒得之與大人無異所異治
者無驚而已又多因夾食而得仲景云冬受寒毒之氣
即發者為傷寒其寒毒藏於肌骨之間至春而發者為
瘟病至夏而發之者為熱病又以冬氣溫春氣寒夏氣

冷秋氣熱謂之時氣萬全方云熱病傷寒溫病時氣傳
變無異也凡時氣者四時之間有不正之氣也為春應
暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反
溫非其時有其氣其氣傷人則頭疼壯熱咳嗽氣粗煩渴
心躁恍惚驚悸傳變與傷寒無異俗呼謂天行者是也
辯三陽受病訣詩云足太陽膀胱經頭疼腰脊痛項
強轉筋難面赤心煩躁尿清熱惡寒 足陽明胃之經
潮熱時微汗譫言臥不安尿紅多糞結飲水舌咽乾

足少陽膽之經來往發寒熱苦口連唇舌耳重脇胃疼
嘔吐喉中噎 辨三陰受病訣詩云足太陰脾之經胃

滿腹臍脹疼因冷氣攻大便常自利噎嘔實難通 足

少陰腎之經心煩但欲寐或渴或自利欲吐吐難通惡

寒多恐悸 足厥陰肝之經飢來不欲食食則吐虺虫

渴瀉心間疼四肢冷似風其間有陰極發躁陰證似陽

學者當以脉別之諸數為熱諸遲為寒無如此最驗也

小兒有陰證者即變為慢驚今列陰證庶幾識之 小

兒傷寒候診其脉來一投而止者便是得病一日假令
六投而止者便是得病六日其脉來洪者易治細微者
難治也 小兒傷寒可醫者七 鼻內清水鼻者是肺
之外應傷寒故外風吹着身皮毛及髮皆主於肺故令
外傷流出清水身寒毛立後則身熱躁呌口朝乾耳
冷汗出傷寒者是邪氣傷其正氣正氣軟弱則不能主
於身被邪氣攻出故為汗汗出多則冷面黃無力後若
不止則體虛生風宜補實之 鼻塞傷寒是外邪氣肺

所受則正氣在肺邪氣傷正氣則滯榮衛不通故乃鼻
塞是發後更與通關藥耳鮮面赤傷寒是傷氣及邪氣
入腹其肺當旺不肯受邪肺若受惠其初傳心則心氣
虛故令面赤日中則口乾夜間不卧陰陽相克可用
涼藥服之 吐白水何以吐白水其傷寒受在於胃氣
胃邪所傷胃弱則吐白水若吐食則入脾瘥後須變身
黃脾胃俱象土故色黃宜早暖脾胃耳 兩眼黃赤傷
寒是先受在脾其色黃次傳在肝主眼故邪傷於肝故

共脾邪入之故令眼黃赤宜以洗肝後發汗耳 小便
黃赤傷寒者寒氣傷肺肺虛故不受於心心實傳腑心
以小腸為腑受邪則滯滯氣則赤後則尿如血通小便
後取之 不可醫者六 傷寒面黑者不治傷寒氣傷
皮膚本入肺肺傳腎腎主水水屬北方其色黑復傳心
心屬火其水大能克火故令面黑不治耳 傷寒大小
腸痛不治其傷寒受在肺肺以大腸為腑臟不能受倒
傳出一藏不再傳入心則火克金心以小腸依為腑故

大小腸痛耳 傷寒忽作鴟聲不治此是傷寒邪氣傷肺肺主聲肺被邪傷絕則聲出不迴如便作鴟聲是肺絕也 傷寒呌聲不出不治此是傷寒入腎失解腎氣絕不能作聲即死耳 傷寒糞黑不治何以瀉黑血糞其傷寒邪傷肺肺絕不能行血其血黑色從大腸中下如死鵝鴨血一般即死如無大便赤黑不妨却是熱盛宜與涼藥耳 傷寒爪甲黑不治爪黑者傷寒傳肝其邪勝正氣絕肝主筋及主諸爪甲肝絕則不能榮於爪

甲者故為死之形也右件其傷寒皆是邪氣傷於臟腑滯其血氣則寒熱血脉亂不能飲食其頭疼面赤者則是陽毒其面青不語多哭身寒是為陰毒凡傷寒三日

前宜汗三日後宜轉又云陰毒宜迴陽

先與熱藥後方汗

陽毒

宜解

先與涼藥後與汗之

取轉亦此說三日前汗三日後轉此大

略之言耳

有初得便宜轉者有得之三兩日宜汗者不可拘此

傷寒外證一見

眼睛黃赤及鼻塞遍身壯熱口鼻出清水非時冷汗加之咳嗽氣閉毛起小便如粉汁此皆是傷寒候傷寒候

如覺面帶黑色大小腸乾痛上吐下瀉氣又刺痛耳內
膿及眼生浮膜皆惡候也 凡治傷寒須辨表裏不分
汗下差誤古人曰桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛
乃亡孫真人云汗下相反其害甚速如魚出水若蛾入
湯傷寒有表證有裏證有半在表有半在裏有表裏兩
證俱見有無表裏證在表宜汗在裏宜下半在表半在
裏宜和解表裏俱見兩證叅詳無表裏證大柴胡湯下
審驗汗下吐證者千金云陽盛陰虛汗出即死下之

當愈陽虛陰盛下之即死汗出即愈身熱增寒汗出陽
虛宜汗身熱潮熱汗出陰虛宜下調經論云陽虛則外
寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒似此別之不
汗強汗津液枯竭而死合汗不汗竅閉悶絕而死不下
強下洞洩不禁而死合下不下腫脹煩亂而死 惡寒
者不當風而憎寒惡風者不當風而憎寒皆屬表又云
大法春宜汗秋宜下 發熱惡寒身體痛而脉浮凡傷
寒發表須當隨輕重而汗有發汗者有和解者兼四時

發汗亦自不同春不可大發汗以陽氣尚弱可用小柴
胡湯之類冬不可發汗者以陽氣伏藏不問傷寒病數
用桂枝麻黃各半湯或得少汗而解或無汗自解病勢
甚者不拘此夏月天氣大熱而脉洪大宜正發汗不可
用麻黃桂枝熱性藥須是桂枝麻黃加黃芩石膏知母
升麻夏月有桂枝麻黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣
發黃斑太陰脉浮少陰發熱亦須發汗 脉經云汗不
出不至足者死熱病得汗大熱不去者死 脉沉數細

熱寒少脉微虛煩腹間有動氣衄血壞病已發汗吐下
不解為壞病 不惡寒反惡熱手掌心并腋下澼澼汗
出胃中乾燥糞結聚潮熱大便硬小便如常腹滿而喘
或譫言脉浮而滑或心胃連臍腹大段注悶腹中痛坐
臥不安胃悶喘急極者不候他證便下之凡大便秘妨
悶恐尚有表證者亦少少飲小承氣湯微解之不可過
多令大洩也若失下則氣血不通四肢便厥醫人不識
反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌不可不察 陽明病

自汗若發汗小便自利不可下宜蜜導通法脉浮惡寒
脉虛不轉失氣是腹中動氣也大便秘小便秘少未可
攻之恐津液還入胃必先硬後溏也小便如常乃可攻
之當問其小便日幾行若利小便日三四行今日再行
故大便不久出今為小便數少以津液還當入胃故大
便不久必通也 王氏云傷寒有承氣之戒又問轉藥
孰緊答曰大承氣湯最緊小承氣湯次大柴胡湯又次
之仲景治法蕩滌熱 皆用湯液不可用丸子 孫真