

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百
十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

大定回庫人書

普濟方卷二十九

泄瀉

濡泄



周王朱橚撰

經曰濕勝則濡泄甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉

脾為五藏之土陰且性惡寒濕今寒濕之氣而客於

脾能脾助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間

下謂之濡泄

大定回庫人書

普濟方

方

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連

去鬚

黃蘗

赤茯苓

去皮

白朮

澤瀉

各一兩

陳皮

人參

肉苳蔻

白芍藥

半夏

桂

各半兩

右為細末水浸餗餅和丸如梧桐子大每服五七十

丸食前溫米飲下

肉苳蔻散

治腸胃受濕濡泄不止兼治暴瀉

肉苳蔻

去殼

黃連

去鬚炒

訶梨勒

去核

炮

甘草

炙

赤茯苓

苓去黑皮 乾薑炮 白朮各半兩 厚朴去粗皮生薑汁炙一兩

右為散每服二錢空心食前米飲調下日三

當歸散 治腸胃寒濕濡泄腹內痞刺疼痛

當歸切焙 木香 乾薑炮 肉苳蔻去殼炮 訶梨勒去

核 黃連去鬚炒 各三分

右為散先用水四盞入甘草生薑各一分黑豆半合並半生半炒同煎至二盞去滓分作二服每服用調散三錢空心日午服之

加味五苓散 治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或煩

渴小便不利

赤茯苓

去皮

澤瀉

木猪苓

去皮

肉桂

不見火

白朮

各一兩

車前子

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓溫服不拘時或進來復丹亦可

灸肝散 治飲食生冷內受風寒泄瀉無度

川麴乾薑

炮半兩

大附子

炮半兩

縮砂仁

半兩

肉苳蔻

二箇

小茴香

四錢炒

川小椒

四兩

右為末每三四錢用白羊肝三二兩或獐猪肝或猪

羊腰子批開放藥在內鹽末一錢葱白二根同肝一

處紙裹潤濕燒香熟為度細嚼生薑湯下或米湯酒

送下食前空心服之

阿梨勒散

治寒溫傷脾濡瀉

阿梨勒

炮去核

吳茱萸

湯浸焙炒

木香

蕪荑

各半兩

黃連

去鬚炒

一兩

右為細散每服二錢空心米飲調下

白苳菴湯

出聖濟總錄

治腸胃虛濕濡瀉無度腸痛飲食

不化

白苳菴

去皮

訶梨勒

炮去核

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白焙炒各半

兩厚朴

生薑汁炙三分

右搗篩每服五錢切薤白三寸水一盞半煎七分去

滓空心溫服日午再服

枳殼湯

出聖濟總錄

治濡泄暴下不止

甘草

炙

阿膠

炙燥各半兩

黃連

去鬚微炒

枳殼

去穰炒三分

厚朴

去粗皮生薑

汁炙秤一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服

日再

桂附丸

出聖濟總錄

治濡泄水痢久不止

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮

赤石脂

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午

米飲下日三

附子湯

出聖濟總錄

治腸胃寒濕濡瀉不止及冷痢色白

食不消化

附子

炮裂去皮臍

甘草

炙

阿膠

炙燥各半兩

黃連

三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞空心

溫服日再一名甘草湯

白朮丸

出聖濟總錄

治脾胃受濕濡瀉不止健脾

白朮

乾薑

炮各三分

人參

三分

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九空心米飲下

日再

荳蔻散

出宣明論

治脾胃受濕濡泄不止而腸痛滑利

肉荳蔻

去殼炮五枚

甘草

炙剉一兩

厚朴

去粗皮薑汁炙一兩半

右為散每服二錢米飲下或湯調下食前溫服

猪苓丸

出聖濟總錄

治腸胃寒濕濡泄無度嗜困不食

猪苓

去黑皮半兩

肉荳蔻

去殼炮二枚

黃蘗

去粗皮炙一兩

右為末米飲丸菜豆大每服十丸食前熟水下

附子丸

出聖濟總錄

治濡泄不止或冷痢無度

附子

炮裂去皮臍

高良薑

各一兩

甘草

炙剉一分

右為末陳米煮糊丸如桐子大每服二十九米飲下

不拘時候

樗根丸

出聖濟總錄

治濡瀉裏急後重數走圜

樗根皮

剉一兩

甘草

炙剉一兩

枳殼

去穰麩炒半兩

右為散每服二錢粥飲調下食前一服止

戊己丸

出濟生方

治脾胃不定濕熱乘之泄瀉不止米穀

腸鳴腹痛

方見本門諸瀉類

對金飲子

出濟生
拔萃方

治瀉泄

平胃散

五錢

五苓散

二錢半

草苳菴

麴糵煨
熟半兩

右相和勻作四服生薑三片棗二枚水煮

白朮芍藥湯

出保
命集

治太陰脾經受濕水泄注下體重

微滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化宜此

和之

白朮

芍藥

各一兩

甘草

五錢

右剉每服一兩水二盞煎至一盞溫服清如痛甚者

宜蒼朮

芍藥湯

蒼朮芍藥湯

出保命集

蒼朮

一兩

芍藥

一兩

黃芩

半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎一盞溫

服清如脉弦頭微痛者宜蒼朮防風湯

蒼朮防風湯

出保命集

蒼朮

防風

各二兩

右剉同前煎服如下血者宜

蒼朮地榆湯

出保命集

蒼朮

二兩

地榆

一兩

右判同前煎服

已上証如心下痞每服各加枳實一錢如茯苓加
二錢由小便不利用如腹痛漸已瀉下微少宜訶子
散止之法云大勢已去而宜止之

附子丸

出聖濟總錄

治寒濕濡泄久不瘥

附子

一兩炮裂去皮臍

甘草

炙判二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心生薑

湯下日再

厚朴湯

一名黃連丸
出聖濟總錄

治傷濕濡泄不定亦治水穀痢

久不瘥

吳茱萸

湯洗三五
遍一分

赤芍藥

半兩

肉苳蔻

四枚
去殼

檳榔

剉四

枚

右搗羅為散每服三錢用不經水猪肝四兩去筋膜
批為薄片重摻藥置一鼎中入漿水一碗醃半合蓋

覆煮肝熟入鹽秤用一錢葱白三莖細切生薑彈子
許拍破同煮水欲盡空心為一服如服令食之初微
瀉不效此是逐下冷氣少時自止渴即以粥湯飲之
一方為丸桐子大每服十九粥飲下一方用破故紙
即補骨脂

猪肚丸

出危氏方

治臟寒泄瀉先用製成厚朴附子二味

生薑棗煎服空心仍服此猪肚丸

川烏

炮

附子

炮各二兩

乾薑

炮

白朮

厚朴

各一兩半

良薑

炒肉苳蔻煨

華撥

禹餘糧

火煨醋汁

丁香

硝砂仁

桂心

各一兩

右為末用獾猪肝一隻淨洗以川椒一兩去目茴香一兩大麴二兩入猪肝內用線縫定酒醋煮爛取出川椒茴香大麴焙乾為末均和煎藥以猪肚杵和得所為九梧桐子大每服五十九空心米飲下

人參湯 療中焦虛寒洞泄補虛

人參

三兩

甘草

三兩

黃芩

二兩

當歸

三兩

茯苓

四兩

芎藭

三兩

厚