

临床医学 多选题选编

上册



重庆医学院

前 言

根据临床教学的需要,我校于1984年编印了《临床医学多选题选编》,鉴于新教材已陆续出版,原书显然已不适应教学的要求,为此,我们以卫生部颁布的新教学大纲和84年统考命题范围为依据,参照新修订的全国高等医学院校统编教材,对原书做了修改、整理和补充,进行再版。

本书分上、中、下三册,内容包括内、外、妇、儿、传等16个学科,上册主要为内、儿科,中册主要为外、妇科,下册为在原有的基础增补的新内容,全书共收集试题6,000余道,附插图119幅,约60万字。

为了便于查阅和复习,本书目录均按各系统疾病分章,各章自立题序,每章后面附有标准答案。

由于我们的水平有限,书上难免有一些缺点和错误,恳切希望读者给予批评,指正。

重庆医科大学 1986.1.8



临床医学多选题选编

主 编：周雅德

副主编：邱鸿鑫

编 委：（依姓氏笔划为序）

王其南	王正中	卞度宏	任增育	沈鼎明	沈鼎烈	陈复仁	邱鸿鑫
何士元	周雅德	林尚清	张逢春	姚棒祥	高根五	黄 惠	黄宗干
舒昌达	饶邦复	蒋 夏	谭富生	颜家珍			

编写人员：（依姓氏笔划为序）

王正中	王宜燕	叶达智	丘德润	乔天愚	刘运俊	李法荫	李肇健
苏韵华	汪恕萍	陈家香	陈坤华	陈复仁	杨锡蒂	杨德兰	周开昭
周言中	郑履平	罗万华	张宝莉	姚榛祥	胡懋兰	郭树华	黄 惠
晏 勇	高根五	谌取鼎	程明德	程绮馨	蒋 夏	谯体义	蔡宝栋

编 辑：颜家珍 段美芬 向 萍 张湘蜀 付 荣 何亚玲

目 录

上 册

内 科

第一章	消化系统疾病和中毒.....	(1)
第二章	循环系统疾病.....	(53)
第三章	呼吸系统疾病.....	(97)
第四章	肾脏疾病.....	(137)
第五章	造血系统疾病.....	(163)
第六章	内分泌代谢疾病.....	(187)
第七章	传染病.....	(211)
第六章	神经系统疾病.....	(263)
第九章	精神病.....	(279)

儿 科

第十章	儿科基础.....	(294)
第十一章	新生儿与新生儿疾病.....	(302)
第十二章	儿科系统疾病.....	(311)



第一章 消化系统疾病和中毒

A 型题

1-1 胃粘膜屏障的物质主要是:

- A 胃粘液
- B 胃粘膜上皮细胞膜的脂蛋白层
- C 粘膜细胞的高度更新能力
- D 分泌型IgA
- E 壁细胞

1-2 慢性胃炎粘膜“过形成”可出现于

- A 浅表性
- B 肥厚性
- C 萎缩性
- D 单纯性
- E 以上均不是

1-3 与维生素B₁₂吸收有关的内因子是胃粘膜中哪种细胞产生的?

- A 表层柱状上皮细胞
- B 粘液细胞
- C 主细胞
- D 壁细胞
- E G细胞

1-4 仅见于萎缩性胃炎的粘膜变化为:

- A 肠型化生
- B 假幽门型化生
- C 中性白细胞浸润
- D 淋巴细胞浸润
- E 以上均不是

1-5 关于慢性胃炎的病理下列哪项不正确?

- A 慢性胃炎常兼有浅表性和萎缩性病变
- B 假幽门腺化生仅见于萎缩性胃

炎

C 肥厚性胃炎难以得到活检证实

D 肠腺化生可见于浅表或萎缩性胃炎

E 胃上皮细胞不典型增生仅见于萎缩性胃炎

1-6 胃镜观察慢性萎缩性胃炎不同于慢性浅表性胃炎的主要特征是:

- A 病变范围
- B 粘膜色泽
- C 有无充血, 渗出
- D 有无花斑状特征
- E 可否透见粘膜下血管

1-7 浅表性胃炎胃镜所见, 错误的是:

- A 胃窦部明显
- B 胃粘膜红白相间, 以红为主
- C 常有灰白色或黄色浓性分泌物附着粘膜上
- D 局部粘膜可见充血, 水肿
- E 粘膜皱壁细或平坦

1-8 急性单纯性胃炎的常见临床表现:

- A 上腹剧痛、呕吐与腹泻
- B 恶心呕吐与上消化道出血
- C 上腹不适、呕吐、发热与失水
- D 食欲减退、上腹痛与白细胞增加
- E 上腹不适、疼痛、恶心呕吐与腹泻

1-9 急性胃炎的诊断依据是:

- A 急性上腹痛, 食欲减退、恶心呕吐
- B 常伴有腹泻

- C 有服用刺激性食物或药物史
- D 除上述外, 必须慎重排除其他急腹症
- E 使用一般抗酸解痉药及抗生素有效

1—10 萎缩性胃炎最常见的临床表现是:

- A 胃酸低下
- B 腹胀
- C 呕吐
- D 中上腹节律性疼痛
- E 黑便

1—11 慢性萎缩性胃炎病人, 出现缺酸, 活检组织学改变有肠上皮化生、表示:

- A 病情稳定
- B 病情好转
- C 癌前期
- D 早期癌
- E 以上都不是

1—12 关于慢性萎缩胃窦胃炎哪项是错误的?

- A 发生胃癌者较胃体胃炎多见
- B 有厌食、消瘦、贫血、胃潴留等类似胃癌的症状
- C X 线钡餐有幽门前段息肉样, 结节样充盈缺损
- D 胃酸可正常或轻度障碍
- E 胃粘膜兼有浅表及萎缩性病变以萎缩为主

1—13 慢性胃炎的特异症状是:

- A 进食后中上腹胀痛
- B 饥饿时中上腹痛
- C 呕吐苦水
- D 反复上消化道出血
- E 以上都不是

1—14 慢性萎缩性胃窦胃炎与下列哪项无关?

- A 牙齿溢脓

- B 胃次全切除
- C 上消化道出血
- D 活检见腺窝增生
- E 胃泌素水平增高

1—15 下列那一项不符合萎缩性胃炎的特点?

- A 胃窦局部性萎缩为主
- B 胃酸分泌受抑制不明显
- C 癌变较萎缩性胃体胃炎多见
- D 发生贫血者较多见
- E 壁细胞抗体阴性

1—16 慢性胃体胃炎与胃窦胃炎的分类依据, 哪项是错误的?

- A 无胃管胃液分析
- B 血清抗壁细胞抗体试验
- C 血清胃泌素测定
- D 胃粘膜活组织检查
- E 临床追踪观察

1—17 临床疑有胃炎引起的上消化道出血, 为了确诊, 合适的检查方法是:

- A 吞线试验
- B 急诊胃肠钡餐检查
- C 紧急内窥镜检查
- D 剖腹探查
- E 粪便隐血试验

1—18 胃脱落细胞检查有核质变异细胞时应考虑哪种疾病:

- A 胃溃疡
- B 慢性浅表性胃炎
- C 胃息肉
- D 慢性萎缩性胃炎
- E 以上都不是

1—19 判断胃酸缺乏最可靠的指标是:

- A 呕吐物无酸
- B 空腹胃液中无游离盐酸
- C 空腹胃液pH等于大于7.0
- D 基础酸分泌量 (BAO) 等于

零
E 最大酸分泌量 (MAO) 等于零

1—20 X线钡餐检查不能诊断:

- A 胃窦胃炎
- B 胃溃疡
- C 胃体胃炎
- D 胃癌
- E 十二指肠球后溃疡

1—21 诊断胃窦胃炎的辅助检查是:

- A 胃酸分泌重度障碍, 血清壁细胞抗体 (PCA) (—)
- B 胃酸分泌轻度障碍 (PCA) (—)
- C 胃酸分泌轻度障碍 (PCA) (十)
- D 胃酸分泌重度障碍 (PCA) (十)
- E 胃酸分泌无障碍 (PCA) (十)

1—22 慢性胃窦胃炎的X线表现可表现为:

- A 整个胃壁变形
- B 胃粘膜呈锯齿状, 窦部痉挛变形
- C 胃蠕动亢进
- D 胃壁僵硬, 运动减弱
- E 胃内有潴留液

1—23 男, 43岁, 上腹不适五年。近一个月来食后胀饱感, 有时暖气。近二日粪便隐血++。胃酸正常。血清抗壁细胞抗体阴性。胃镜检查: 幽门区可见血管网。最可能的诊断是:

- A 浅表性胃炎
- B 浅表性胃炎合并出血
- C 萎缩性胃体胃炎
- D 萎缩性胃窦胃炎
- E 糜烂出血性胃炎

1—24 下列哪项不符合萎缩性胃体胃炎

- A 胃酸低或无
- B 血清胃泌素减少
- C 易发缺铁性贫血
- D 抗壁细胞抗体阳性
- E 消化道症状少

1—25 患者上腹部隐痛一年, 饭后上腹胀满, 食欲减退, 一般情况佳, 胃液分析: 空腹游离酸“0”, 注射五肽胃泌素后MAO10mEq%/小时, 诊断首先考虑为:

- A 胃溃疡
- B 肥厚性胃炎
- C 胃粘膜脱垂
- D 萎缩性胃炎
- E 胃癌

1—26 目前认为标准胃酸刺激方法是:

- A 面包试餐法
- B 美兰咖啡因法
- C 组织胺法
- D 五肽胃泌素法
- E 加大组织胺法

1—27 30岁, 男性, 胃镜检查时发现胃窦部粘膜明显充血水肿、有较多粘液, 粘膜下可见少量出血点, 幽门孔有较多胆汁反流, 下列药物哪种较好?

- A 生胃酮
- B 普鲁苯辛
- C 胆络胺或胃复安
- D 链霉素口服
- E 碳酸钙

1—28 诊断慢性胃炎最可靠的依据是:

- A 慢性上腹痛常在餐后加重
- B X一线钡餐检查
- C 胃液分析
- D 胃脱落细胞检查
- E 以上都不是

1—29 不适宜用于慢性胃窦胃炎治疗的药

是:

- A 胆酪胺或胃复安
- B 解痉药
- C 制酸药
- D 抗菌药
- E 肾上腺糖皮质激素

1-30 关于急性单纯性胃炎的治疗下列哪项是错误的

- A 停止一切对胃有刺激的饮食药物
- B 卧床休息
- C 多饮水的情况下短期禁食
- D 一般要用抗菌药物
- E 可用解痉剂

1-31 男, 54岁, 间歇性上腹部不适四年余, 餐后加重, 嗝气, 增大组织胺试验: BAO为零, MAO为5mEq/h (正常17-23mEq/h), 胃液pH4.5。最可能的疾病是:

- A 慢性浅表性胃炎
- B 十二指肠球部溃疡
- C 十二指肠球后溃疡
- D 慢性萎缩性胃炎
- E 慢性肥厚性胃炎

1-32 男, 40岁, 常有中上腹隐痛5年余, 胃纳差, 易腹胀。检查: 一般尚好。上颌窦压痛。上腹部轻度压痛。肝肋下一指, 质硬, 无压痛; 脾未及 MAO3mEq/h。肝功能正常。下列疾病, 哪种最可能?

- A 溃疡型胃癌
- B 慢性萎缩性胃炎
- C 慢性肥厚性胃炎
- D 慢性浅表性胃炎
- E 十二指肠球部溃疡

1-33 胃泌素的生理作用下列哪项是错误的

- A 强烈刺激胃酸分泌

- B 刺激胰液, 小肠液及胆汁分泌
- C 促进胃、肠、胆囊收缩并使十二指肠括约肌收缩
- D 促进胃粘膜、壁细胞和主细胞增殖
- E 刺激胰岛素分泌

1-34 以下哪种物质可使食管下端括约肌张力增高?

- A 盐酸
- B 内因子
- C 碱性粘液
- D 胃泌素
- E 胃蛋白酶

1-35 在产生消化性溃疡的原理上, 下述因素哪种最为重要

- A 胆汁反流
- B 无酸便无溃疡
- C 炎症
- D 饮食失调
- E 血型

1-36 胃肠道的保护机理中哪一项为最重要?

- A 胃肠壁旺盛的血液循环
- B 胃粘液屏障作用
- C 胃粘膜的屏障作用
- D 肠抑胃泌素和其它胃肠激素的调节作用
- E 正常的节律性胃、十二指肠运动功能

1-37 引起胃溃疡机理主要是:

- A 长期服碱性药引起的胃酸反馈增多
- B 过酸食物
- C 粘液分泌减少
- D 氢离子回渗
- E O型血

1-38 在十二指肠溃疡的发病原理中, 哪项是起决定性作用的:

- 1—38 持续和过度的精神紧张, 情绪激动
- B 植物神经系统功能失调
- C 胃酸—胃蛋白酶对粘膜的损害作用
- D 内分泌系统功能紊乱
- E 胆汁反流

1—39 溃疡病在病理上组织损害深达哪一层?

- A 粘膜层
- B 粘膜下层或肌层
- C 粘膜肌层
- D 肌层
- E 粘膜层及肌层

1—40 关于消化性溃疡的病理正确的是:

- A 胃溃疡多发生于泌酸最强的区域内
- B 溃疡的直径多数小于 2.5 厘米
- C 对吻性溃疡仅发生于十二指肠
- D 一个以上的溃疡称为复合性溃疡
- E 溃疡的愈合多在 2—4 周

1—41 胃酸引起消化性溃疡, 下列哪种酸性环境最有助于溃疡形成

- A pH2.5 以下
- B pH3.5
- C pH4.5
- D pH5.5
- E pH5.5 以上

1—42 在十二指肠溃疡的发病原理中, 哪项是起决定性作用的?

- A 持续和过度的精神紧张, 情绪激动
- B 植物神经系统功能失调
- C 胃酸—胃蛋白酶对粘膜的损害作用
- D 内分泌系统功能紊乱
- E 壁细胞总数增大

1—43 球后溃疡一般发生在:

- A 球部后壁
- B 十二指肠第一段
- C 十二指肠第二段
- D 十二指肠第三段
- E 十二指肠第四段

1—44 顽固性溃疡是指:

- A 反复出血的溃疡
- B 应激性溃疡
- C 复合性溃疡
- D 病程 10 年以上的溃疡
- E 以上都不是

1—45 难治性溃疡不是下列中哪种?

- A 球后溃疡
- B 幽门管溃疡
- C 穿透性溃疡
- D 严格内科治疗 4 周无效的小弯溃疡
- E 以上都不是

1—46 穿透性溃疡

- A 指慢性的胃或十二指肠内容物穿入腹膜腔的过程
- B 常伴局限性腹膜炎
- C 多见于胃前壁溃疡
- D 十二指肠球部后壁多见
- E 大剂量抗酸剂治疗常取得满意效果

1—47 我国上消化道出血最常见的原因是:

- A 急性胃炎
- B 慢性胃炎
- C 急性胃粘膜病变
- D 消化性溃疡
- E 食管静脉曲张破裂

1—48 消化性溃疡并发穿孔可有几种形式

- A 一种
- B 二种
- C 三种

- D 四种 溃疡 溃疡 溃疡 溃疡 1-43
- E 五种 溃疡 溃疡 溃疡 溃疡 A
- 1-49 消化性溃疡慢性穿孔最常见的部位是：
A 胃大弯
B 胃小弯
C 幽门管
D 十二指肠后壁
E 胃角
- 1-50 消化性溃疡愈合一般需要：
A 2-3周
B 4-8周
C 10-12周
D 12-14周
E 14周以上
- 1-51 关于溃疡愈合哪项是错误的？
A 溃疡愈合一般需4~8周
B 愈合后多不留有瘢痕
C 穿透性溃疡愈合后最容易引起畸形
D 缓解期反映溃疡为非活动性或正在愈合中，甚至已愈合
E 溃疡愈合时而引起的器质性幽门狭窄见于3%的溃疡患者。
- 1-52 胃癌的好发部位：
A 贲门部
B 胃底
C 胃大弯
D 胃小弯
E 幽门区
- 1-53 消化性溃疡的主要诊断依据是：
A 慢性、周期性、节律性上腹痛
B 上腹部压痛
C 钡餐检查有激惹及变形
D 钡餐检查有龛影
E 胃液分析结果异常
- 1-54 关于消化性溃疡疼痛的特点正确的是：

- A 十二指肠穿透性溃疡：左背疼
B 胃穿透性溃疡：右上腹疼
C 球后溃疡：空腹与夜间疼重
D 幽门管溃疡：疼痛节律性明显
E 胃大弯溃疡：易发生慢性穿孔
- 1-55 关于溃疡病的临床症状，不正确的是：
A 胃溃疡多为餐后痛
B 十二指肠溃疡多为空腹和夜间痛
C 消化性溃疡病人均有上腹痛
D 十二指肠溃疡易发展为穿透性溃疡
E 球后溃疡易发生大出血
- 1-56 下列有关十二指肠溃疡的临床，哪一项不正确
A 有空腹疼痛，进食后疼痛减轻的规律
B 90%溃疡好发于球部
C 前壁溃疡穿孔者多见
D 血中胃泌素水平显著升高
E 发生癌变机会很少
- 1-57 关于十二指肠球部溃疡哪项是正确的：
A MAO 8毫克当量/小时
B 复发率是低的
C 多与胃溃疡并存
D 与胃溃疡比发病年龄较轻
E 进食后疼痛加重
- 1-58 男性，45岁，反复右上腹痛3年，放射至背部，先后三次上消化道出血、基础泌酸量(BAO) 9毫当量/小时，高峰排酸量(PAO) 30毫当量/小时，钡餐检查二次，十二指肠球部发现溃疡。最可能是：
A 慢性胃炎
B 胃泌素瘤
C 胆囊炎

D 胃癌
E 以上都不是
1—59 关于幽门管部溃疡的特点, 不正确的是:

- A 易发生幽门梗阻
- B 易发展为穿透性溃疡
- C 疼痛节律性明显
- D 呕吐较严重
- E 制酸药疗效不显著

1—60 穿透性溃疡是:

- A 指慢性的胃或十二指肠内容物穿入腹膜腔的过程
- B 常伴有局限性腹膜炎
- C 多见于胃溃疡
- D 可引起较剧烈上腹痛, 并可出现放射性痛
- E 大剂量制酸剂常可取得良效

1—61 消化性溃疡患者出现脱水, 电解质和酸碱平衡紊乱及营养缺乏主要由于:

- A 厌食
- B 出血
- C 幽门梗阻
- D 并发胃炎
- E 疼痛

1—62 诊断幽门梗阻最重要的表现是:

- A 呕吐后腹痛缓解
- B 胃蠕动波
- C 拍水声
- D 胃型
- E 以上都不是

1—63 下列哪项表现对幽门梗阻的诊断最重要:

- A 胃型或蠕动波
- B 呕吐物中有隔夜或隔日食物
- C 呕吐后腹胀可减轻
- D 震水音
- E 水、电解质与酸碱平衡失调

1—64 下列哪项最能提示消化性溃疡发生了并发症:

- A 常发生夜间痛
- B 恶心、腹胀明显
- C 上腹部压痛
- D 疼痛的节律发生改变
- E 嗝气返酸加重

1—65 消化性溃疡合并症中最多的是:

- A 急性穿孔
- B 慢性穿孔
- C 大量出血
- D 幽门梗阻
- E 癌变

1—66 男性患者, 28岁, 周期节律性上腹痛8年, 多为饥饿痛, 夜间痛近日复发, 但三天后疼痛消失, 觉上腹胀, 心慌。检: 面色苍白心率118次/分, BP: 94/60mmHg, 腹部检查 阴性。本患者可能是:

- A 溃疡已愈合
- B 溃疡活动趋于静止
- C 溃疡并发出血
- D 溃疡有急性穿孔
- E 以上都不是

1—67 男性, 34岁, 早餐后觉有便意, 后解出黄色成形便, 当起身时突然晕倒在地, 面色苍白, 大汗。过去史无特殊, 血压90/80毫米汞柱, 脉搏142次/分, 神清, 四肢冷, 心音规律, 无杂音, 肝脾未扪及, 肠鸣音明显增多。血红蛋白12克%, 白细胞计数及分类正常。最可能的诊断是:

- A 低血糖反应
- B 感染性休克
- C 心源性休克
- D 一时性晕厥
- E 上消化道出血并休克

1—68 消化性溃疡合并大出血的特点, 不

正确的是:

- A 出血后疼痛加重
- B 呕血常混有食物
- C 呕血呈酸性
- D 呕血常为咖啡色
- E 出血后可有发热及氮质血症

1-69 男性,40岁,饱餐后突发上腹剧痛并很快扩散至全腹6小时,恶心、出汗、肢体发冷,无明确溃疡病史。体检:T37.5°C,P100次/分,BP110/90mmHg,肝浊音界缩小,全腹压痛、肌痉、反跳痛,以上腹偏右最明显,肝未扪清楚,移动性浊音(+).

血淀粉酶64温氏单位,血白细胞14000中性80%。此例诊断最可能是

- A 急性胰腺炎
- B 急性胆囊炎
- C 溃疡病穿孔
- D 急性胆管炎
- E 肝脓肿

1-70 提示溃疡穿孔最有意义的根据是:

- A 突发腹痛
- B 急性腹膜炎体征
- C 休克征象
- D 腹腔试验穿刺
- E 气腹征象

1-71 消化性溃疡中最多的致死原因是:

A 癌变

B 大出血休克

C 急性穿孔、化脓性腹膜炎

D 幽门梗阻、电解质紊乱

E 慢性消耗

1-72 十二指肠球部溃疡并发症,下列哪项是错误的:

- A 大量出血
- B 急性穿孔
- C 幽门梗阻
- D 癌变
- E 粘膜糜烂

1-73

患者上腹痛3年余,近2月来厌食

顿餐发现胃小弯溃疡,增大组织胺胃液分析,胃液pH=7,血清胃泌素增高,考虑最可能的诊断是:

- A 胃溃疡并胃窦胃炎
- B 胃溃疡癌变
- C 胃溃疡合并十二指肠溃疡
- D 胃泌素瘤
- E 以上都不是

1-74

判断胃酸缺乏最可靠的指标是:

- A 呕吐物无酸
- B 空腹胃液中无游离盐酸
- C 空腹胃液pH等于或大于7.0
- D 基础酸分泌量(BAO)等于零
- E 最大酸分泌量(MAO)等于零

1-75

关于胃酸分析,以下概念正确的是:

- A BAO正常值为12—18mEq/小时
- B MAO正常值为40—60mEq/小时
- C MAO即指胃总酸度
- E 十二指肠溃疡病人BAO与MAO均增高

1-76

消化性溃疡作胃液分析时,下述判断哪项是错误的?

- A 胃溃疡的胃酸分泌多正常或稍低于正常
- B 十二指肠溃疡胃酸分泌多增加
- C 用各种方法证实胃酸缺乏时,应疑为溃疡癌变
- D 复合性溃疡的胃酸分泌多数降低
- E 基础胃酸>15毫当量/时,最大胃酸分泌>60毫当量/时,提示为胃泌素瘤

1-77 鉴别消化性溃疡和慢性胃炎的最好方法是:

- A 粪便隐血检查
- B X线钡餐检查
- C 纤维胃镜检查
- D 胃粘膜脱落细胞检查
- E 五肽胃泌素胃液分析

1-78 哪项表现应高度怀疑胃溃疡癌变:

- A 上腹痛向背部放射
- B 并发上消化道出血
- C 增大组织胺试验表示胃酸缺乏
- D 血清胃泌素降低
- E 钡餐发现多发性溃疡

1-79 下列哪项不是判断上消化道出血已经停止的实验室指标?

- A 血红蛋白测定
- B 网织红细胞计数
- C 血沉
- D 尿素氮
- E 红细胞压积

1-80 当怀疑癌性溃疡时, 确诊的主要根据:

- A 粪隐血试验
- B 纤维胃镜检查
- C 脱落细胞检查
- D X线钡餐检查
- E 胃粘液活组织检查

1-81 急性上消化道出血的当时, 为估计出血量可急检:

- A 红细胞和血红蛋白
- B 红细胞压积
- C 红细胞血色素指数
- D 网织红细胞
- E 以上都不是

1-82 关于胃酸测定结果的判定, 不正确的是:

- A 胃溃疡病人胃酸显著低于正常
- B 胃酸缺乏者, 应高度怀疑恶性

溃疡

C MAO > 40mEq/h 提示十二指肠

胃溃疡

D MAO > 60mEq/h 应疑及胃泌素瘤

E MAO < BAO 是胃泌素瘤的特征

1-83 男性, 42岁, 餐后上腹隐痛4年, 此次饱餐后突发上腹刀割样剧痛2小时, 疼痛很快扩散到全腹。体检脸色苍白, 出冷汗, 体温36.5°C, 脉搏96次/分, 血压110/80mmHg, 全腹压痛、反跳痛, 肌紧张, 以中上腹最明显, 肠鸣音消失, 白细胞12000, 中性80。此例应先作哪项检查以助诊断?

- A 急查血淀粉酶
- B 急症胃镜检查
- C 急症钡餐检查
- D 腹部站立位X透视
- E 急查血脂肪酶

1-84 胃溃疡与溃疡型胃癌在X线上的主要区别是:

- A 胃壁硬度
- B 粘膜皱襞中断
- C 溃疡周围有无浸润隆起
- D 溃疡大小
- E 溃疡是否突出胃腔之内

1-85 甲氰咪胍最适宜用于治疗:

- A 胃溃疡
- B 十二指肠溃疡
- C 慢性胃炎
- D 胃息肉
- E 幽门管溃疡

1-86 甲氰咪胍的作用是通过:

- A 抑制迷走神经
- B 保护胃粘膜
- C 抑制胃粘液分泌

D 调节中枢神经系统

1—87 应用下列何种药物治疗消化性溃疡，抑制胃酸和胃蛋白酶分泌最有效？

A 甲氧咪胍

B 阿托品

C 硫糖铝

D 前列腺素E₂

E 氢氧化铝凝胶

1—88 一般认为抗胆碱能药不适用于治疗胃溃疡，主要因为：

A 引起口干

B 引起心跳加快

C 引起胃窦部潴留

D 引起面部潮红

E 引起视力模糊

1—89 抗胆碱药药物用于治疗十二指肠溃疡的服用时间应是：

A 进餐时及睡前

B 餐前1—2小时及睡前

C 餐前1/2—1小时及睡前

D 餐后1/2—1小时及睡前

E 餐后1—2小时及睡前

1—90 抗胆碱能药可用下列哪种情况：

A 幽门梗阻

B 反流性食管炎

C 近期有溃疡大出血

D 十二指肠球部溃疡

E 胃溃疡

1—91 制酸剂治疗消化性溃疡的作用和目的是：

A 促进愈合

B 防止复发

C 缓解疼痛

D 术前准备

E 避免并发症

1—92 应用制酸剂治疗消化性溃疡时，每

次服药时间宜在：

A 清晨及每餐后二小时

B 每餐后一小时及睡前

C 每餐前一小时及睡前

D 每餐后二小时及睡前

E 清晨及每餐前一小时

1—93 关于十二指肠溃疡的治疗，最重要的是：

A 少食多餐

B 保护粘膜

C 制止胃酸

D 中枢镇静

E 早期手术

1—94 十二指肠溃疡患者，有轻度腹泻、青光眼和高血压，可应用下列何种药物治疗？

A 生胃酮

B 阿托品

C 颠通定

D 硫糖铝

E 氧化镁

1—95 生胃酮治疗胃溃疡的机理与下列的哪项无关？

A 抑制胃蛋白酶

B 促进受损粘膜的愈合

C 防止氢离子回渗

D 抑制胃酸分泌

E 促进胃粘液分泌

1—96 生胃酮的副作用与下列哪项无关？

A 引起高血压

B 引起水肿

C 引起低钾性碱中毒

D 引起低钾性肌病

E 引起可逆性粒细胞减少

1—97 对于治疗胃溃疡的药物，下列哪项最佳？

A 小量制酸剂增加给药次数

B 增加每次制酸剂剂量

1-99 60岁, 男性, 确诊为十二指肠溃疡出血, 经内科积极治疗24小时, 血压90—60/60~40mmHg, 脉搏120次/分, 此时最好的措施为:

- A 继续观察
- B 胃内去甲肾上腺素灌注
- C 垂体加压素静注
- D 急诊手术
- E 甲氧咪胍静滴

1-100 对上消化道大量出血的患者, 下列处理中首选应是:

- A 快速输血
- B 口服去甲肾上腺素
- C 静脉滴注止血敏
- D 胃降温止血
- E 激光止血

1-101 下述治疗方案哪项正确?

- A 大多数消化性溃疡患者均需休息或住院
- B 一般患者必须严格控制食谱
- C 一般患者如能控制饮食, 可不用药物治疗
- D 缓解期无需治疗
- E 溃疡病长期持续治疗

1-102 23岁, 男性, 十二指肠球部溃疡患者, 新近出现呕吐隔夜食, 吐后症状减轻, 下列治疗措施哪项是错误的:

- A 灭吐灵(胃复安)
- B 三矽酸镁
- C 安定
- D 普鲁本辛
- E 甲氧咪胍

1-103 患者因慢性肾功能不全而腹泻, 同时并发胃溃疡选用下列哪种药物适宜

- A 阿托品

B 生胃酮

C 碳酸氢钠

D 氢氧化铝凝胶

E 甲氧咪胍

1-104 十二指肠溃疡并幽门梗阻患者剧烈呕吐, 血清钾2.3毫当量/升, 血清钠116毫当量/升, 血清氯化物86毫当量/升, 二氧化碳结合力70容积%。

下列处理措施哪项正确?

A 生理盐水+氯化钾静滴及阿托品

B 10%葡萄糖+氯化钾静滴及普鲁本辛

C 50%葡萄糖+氯化钾静脉注射

D 生理盐水+氯化钾静滴及抽胃液减压

E 乳酸钠静滴

1-105 男, 28岁上腹痛8个月, 与饮食无明显关系, 吐酸水, 常腹泻。制酸药效果不佳。X线胃肠钡餐造影发现食管、胃及十二指肠球部均有溃疡。

BAO为22mEq/h。最合适的诊断是:

A 多发性溃疡

B 复合性溃疡

C 恶性淋巴瘤

D 胰腺β细胞腺瘤

E 胃泌素瘤

1-106 最能提示胃泌素瘤的检查是:

A BAO测定

B MAO测定

C BAO/MAO比

D 胃泌素测定

E 胰升血糖素测定

1-107 患者男, 36岁, 上腹疼廿余年, 上消化道出血三次。胃液检查, 空腹胃液量2200ml。BAO64mEq/hMAO92mEq/h据此, 最可能的诊断是:

A 胃溃疡

- B 十二指肠溃疡
- C 胃粘膜脱垂
- D 幽门梗阻
- E 胃泌素瘤

1—108 十二指肠溃疡活动期大便隐血试验阳性,提示每日出血量有:

- A $< 1\text{ml}$
- B $1 \sim 2\text{ml}$
- C $2 \sim 3\text{ml}$
- D $3 \sim 4\text{ml}$
- E $> 5\text{ml}$

1—109 关于球后溃疡,下述哪项是正确的

- A 溃疡多发生在紧邻球部之后的胃后壁上
- B 夜间痛得向背部放射痛多见且突出
- C 钡餐检查不易漏诊
- D 内科治疗效果良好
- E 易反复少量出血

1—110 男,38岁,反复发作上腹隐痛1年余,冬季好发。近月腹痛较前加重无明显节律性。粪便隐血++。钡餐检查如图1—2。1—110最合适的诊断是:

- A 胃癌
- B 胃溃疡
- C 复合性溃疡
- D 慢性胃炎
- E 十二指肠球部溃疡

1—111 48岁男性胃溃疡者,近二月来上腹疼痛不止,呕吐、食减、腹软、钡餐如照片1—3。1—111应考虑哪种最可能:

- A 溃疡活动性增加
- B 合并幽门梗阻
- C 合并胃炎
- D 癌变
- E 亚急性穿孔

1—112 男性,45岁,反复中上腹痛4年,加重2月,胃纳稍减,大便隐血(+)。胃结肠镜检查如图1—4。1—112诊断最大可能是:

- A 胃窦炎
- B 球部溃疡
- C 胃体溃疡
- D 胃癌
- E 复合溃疡

1—113 肠结核主要好发部位是:

- A 空肠
- B 横结肠
- C 回盲部
- D 升结肠
- E 乙状结肠

1—114 关于溃疡型肠结核的病理特点正确的是:

- A 孤立与集合淋巴结干酪样坏死
- B 病变深达肌层,易发生急性穿孔
- C 病变损害血管,易发生出血
- D 溃疡沿肠纵径发展,不易发生梗阻
- E 修复过程充分,不易发生肠瘘或腹腔脓肿

1—115 溃疡型肠结核病理变化下列哪项是错误的?

- A 溃疡常围绕肠管纵径扩展
- B 溃疡边缘不规则
- C 溃疡深浅不一
- D 常累及周围腹膜
- E 邻近肠系膜也受累

1—116 结核性腹膜炎,哪种类型最常见:

- A 粘连型
- B 渗出型
- C 干酪型
- D 粘连腹水型
- E 粘连腹水干酪型

1—117 发生肠结核的最常见感染途径是:

- A 直接蔓延(如盆腔结核)
- B 血循环播散
- C 结核杆菌经口感染
- D 结核杆菌经淋巴扩散
- E 机体对结核杆菌的变态反应

1—118 结核性腹膜炎的感染途径主要是:

- A 血接播散
- B 腹腔内结核坏死灶溃破感染
- C 腹腔内结核直接蔓延
- D 胸腔结核经淋巴路波及
- E 腹膜后结核波及

1—119 溃疡型肠结核的主要临床表现是:

- A 右下腹痛
- B 腹泻
- C 粘液、脓便
- D 里急后重
- E 腹部肿块

1—120 溃疡型肠结核的临床表现哪项是错误的?

- A 右下腹痛进食后加重
- B 腹泻为主
- C 多无全身结核中毒症状
- D 下腹可触及较固定包块
- E 钡剂灌肠可见Stierlin征象

1—121 关于增生型肠结核临床特点,正确的是:

- A 常有腹泻或腹泻便秘交替
- B 因慢性肠穿孔而形成腹部包块或腹腔脓肿
- C 结核中毒及肠外结核表现明显
- D 可发生肠梗阻
- E 粪便中易查到结核杆菌

1—122 增生性肠结核临床主要症状是:

- A 腹泻
- B 便秘
- C 腹泻与便秘交替出现
- D 盗汗

E 消瘦

1—123 35岁,女性,半年来脐周隐痛,低热,伴轻度腹泻,闭经,右下腹可触及一肿块及压痛,诊断最可能是:

- A 右侧输卵管炎
- B 慢性阑尾炎
- C 肠结核
- D Meckel's憩室炎
- E 非特异性溃疡性结肠炎

1—124 女性23岁,主要症状为右下腹痛,腹泻半年,体检消瘦,右下腹麦氏点压痛,钡灌肠特点:盲肠缩短,伴压痛。诊断的最大可能是:

- A 慢性阑尾炎
- B 慢性非特异性溃疡性结肠炎
- C 慢性痢疾
- D 过敏性结肠炎
- E 回盲部结核

1—125 35岁,女,轻度腹泻和便秘交替出现三月,下腹痛,消瘦、低热,粪便稀薄,含少量粘液,但无脓血细胞,下腹轻压痛,Hb10g%,WBC9000 N60% L40%,乙状结肠镜检阴性,最可能诊断:

- A 慢性痢疾
- B 肠结核
- C 溃疡性结肠炎
- D 慢性结肠炎
- E 沙门氏菌感染

1—126 X线钡餐肠系检查发现肠管有跳伟征象(Stierlin sign)考虑:

- A 克隆病
- B 溃疡性结肠炎
- C 肠道肿瘤
- D 肠阿米巴病
- E 肠结核

1—127 溃疡型结核时X线钡餐检查的Stierlin征是指: