

久漏瘡

丹漏瘡須先照補藥以生氣血卽參芪朮歸苓為主
大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸炷
隨漏之大小便灸令微熱不可令痛乾則易之乾者
再研爲末再和膏灸如困則止來日再灸宜至肉平
爲効亦有用附片灸者仍以前血氣藥作膏藥貼之
婁經云肉之太會爲谷肉之小會爲絡肉分之間
絡合之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗
榮衛不行必將爲膿膜內銷骨髓外破大脰留于節湊
必將爲敗積寒留官榮衛不養肉縮筋肋肘不得伸

內為骨痺外為不仁命曰大寒留于谿谷也此用附
子灸者蓋此義也

時康祖大夫患心漏二十年當胸數竅血液長流醫
皆莫能治或曰竅多則愈損閉則慮完他岐當存其
一二猶為上策坐此形神困瘁又積苦腰痛行則偃
偻不飲酒雖雞魚蟹蛤之屬皆不入口淳熙間通判
溫州郡守韓子溫見而憐之為檢聖惠方載腰痛二
門冷熱二症脉之使白擇康祖曰其年老久羸安敢
以為熱始作寒症治療取一方用鹿茸者服之逾旬
痛減更覺氣宇和暢之一意專服悉屏他藥泊月

腰屈復伸無復呼痛心漏亦愈以告醫者皆莫能測
其所以然後九年康祖自鎮江通判滿秩造朝訪子
溫則精力倍昔飲啖無所忌云漏愈之後日勝一日
子溫書吏吳弼亦苦是疾照方服之浹旬而愈其方
本治腰痛用鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍皆
貳兩鹽花參分爲末棗肉丸三十丸空心酒下天
聖中工部尚書忠肅公家有媼病漏十餘年一日有
醫過視之曰此可治也卽取活鱖一竹針五七枚乃
擲鱖于地鱖因屈盤就盤以竹針貫之覆瘡良久取
視有白虫數十如針着鱖卽鈐置杯中蠕動如線

復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰虫因未盡然
餘皆小虫請以常用藥傳之時得檳榔黃連一味卽
爲散傳之明日乃以乾艾作湯投白礬末二三錢先
洗瘡口然後傳藥蓋人血氣冷必假艾力以助陽而
艾性亦能殺蟲也如是者再卽生肌不逾月愈醫曰
瘡一月不治則有虫虫能蠕動氣血亦隨之故瘡漏
不可遽合則結毒實虫所爲又曰人每有疾經月不
痊則必虛憊婦人則補脾血小兒則防驚疳二廣則
并治瘡瘍由此醫名大著 有人脚肚上生一瘡久
遂成漏經二年百藥不効自度必死一山人見之云

此鱔漏耳但以石灰二三升白沸湯泡薰洗如覺瘡
痒卽是也如其言用灰湯淋洗果痒三兩次遂乾

一婦項下忽生一塊腫漸緣至妳上腫起莫知何病
偶用刀刺破出清水一碗日久瘡不合有道人見之
曰此蟻漏也緣用飯誤食蟻得此耳詢之果然道人
云此易治但用穿山甲數片燒存性灰爲末傅瘡上
遂愈蓋穿山甲蟻之畏也 柳休祖者善上筮其妻
病鼠瘡積年不瘥垂命休祖遂十得順之復按卦合
得姓石人治之當獲鼠而愈也旣而鄉里有奴姓石
能治此病遂灸頭上三處覺佳俄有一鼠逕前而伏

呼猫咋之視鼠頭上有三灸處妻遂差

悔師云經云腎移寒於脾發為癰腫少氣脾移寒於肝發為癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋

聖濟云衣服過厚表易著寒所得之源大抵如

此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸矣而成膿如泔而稀久不能瘥瘡口不合變為疳漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以此

骨碎補丸主之

骨碎補丸方

骨碎補

補骨脂

熟地黃

川當歸

續斷

石楠葉

黃芪

石斛

牛膝

杜仲

草薺

附子

以上各二兩

炮一兩

白芍藥

川芎

兔絲子

沙參

羌活

防風

獨活

天麻

各一兩半

此方與大儂方相表裏前桂枝拾遺後有木瓜兔

絲子白朮

右爲末煉蜜丸空心鹽湯下

元戎云邢三郎家小兒病寒疽久不愈先以四物穿山甲湯透之復以地黃當歸湯補之繼以骨碎補丸外治

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂宜用

羌活

防風

細辛

附子

甘草

川芎

續斷

白芍藥

白朮

當歸

桂心

麻黃

黃芪

熟地黃

此方與前骨碎補丸相表裏

營氣不從逆于肉理乃生癰腫

陷脉爲癰留連肉

腠腧氣化薄傳爲善畏及爲驚駭

桂附丸 治氣漏諸瘡

桂心

附子

炮裂米醋中浸再炮三五次去皮臍

厚朴

薑製

粉草

炙

白朮

各一兩

木香

半斤

乳香

研二斤

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下貳叁拾丸丹溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只因瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫

久漏痛

又利二

生

其瀉衛尤速恐不若參芪佐以陳皮庶乎與病情相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之為當又虛甚者宜參朮歸芪膏

陷脉散 治漏瘡及二三十年癰瘤或大如盂孟父

久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕臥寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑 炮

琥珀 研

大黃

附子 炮去皮 各一兩

丹參 七斤 半

石硫黃 研

白石英 研

鍾乳粉 研

烏鰂骨 研各半兩

用黃檗蒼朮芪芍地黃甘草升麻葛根南星半夏牛
膝滑石桂調之近三四個月而安

本草治瘰有頭出膿水不止以啄木鳥一隻燒灰酒
調服一錢匕立瘥

東垣云瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記疔
瘰惡瘡諸藥不効者取蟾蜍煎去兩頭安瘡口上以
艾炷灸之七壯一易不過七枚無不効者又法用乞
火婆蟲兒灸之同前法累驗神効人皆祕之往往父
子不傳

取朽骨久疽及痔漏中有者

取黑骨雞胫骨上等砒霜實之鹽泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去鹽泥用骨研細飯丸如粟未大以紙撚送入孔竅內更用膏藥貼之

本事雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之用黃砒置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燻三日三夜其烟上着以雞羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗記其事族人楊偶年少時有湯子頰連齒輔車外腫若覆甌肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘡中少頃取

右爲末貯以瓷合裏勿令泄氣若瘡濕卽傳無
汁卽煎豬脂和傅之以乾爲度或死肌不消加芒
硝二兩益佳一法胡燕窠一枚

丹治漏瘡

川芎 半兩

細辛 二錢

白芷稍 二錢

甘草 細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小
用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟撚成繩子撚入孔
中至不可入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之

子和小渠表三因強寇入家傷其兩脰外腫作瘡數

年不已膿汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而
出延爲濕瘡求治戴人曰爾中焦當有綠水二三升
涎數掬袁曰何也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚
則膽傷足少陽經也蕪兩外臙皆足少陽之部此膽
之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如渥
既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經兩
旁入瘡中故飲水瘡中冰出乃上湧寒痰汗如流水
次下綠水果二三升一夕而痂乾真可怪也

嘗治足膝下至踝漏瘡通足腫大於好足二倍行步
不全用五龍凡大下之者六番每番皆五七行下後

朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃堊卽瓦盆也

豬骨膏 治諸瘡口氣冷不瘥

豬筒骨

二箇取髓

松脂

二錢通明者研

乳香

另研

黃連

去鬚爲末

白芨

研末各二錢半

鉛丹

另研

黃蠟

各半兩

右搗研熔蠟和爲膏不拘時傳之

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛

附子

半兩炮去皮臍

川椒

去

雄黃

研細各二錢半

白礬

七錢半火煨研

膩粉

二錢研

爲細末研勻每用清麻油調傳瘡上

雄黃散 治冷瘡煖瘡口

雄黃 研

百合

乳香

黃蘗 炙去粗皮

墻上爛白蜆殼

小蚌蛤子是各一分

右為細末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯溫洗拭

乾傅之

黑靈散 治漏瘡

牡蠣粉

號丹

硫黃

研各一分 露蜂房 剉二分

右同炒令烟盡為細末入髮灰一分麝香少許和

勻傅之

馬齒莧膏

治一切瘻