

玉機微義卷之六

泄瀉門

此門宜與滯下參看

○瀉痢生死脉法

內經云脉細皮寒少氣泄利前後飲食不入是謂五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活

脉經云淺注脉緩時小結者生浮大數者死又洞洩食不化不得留下膿血脉微小流連者生緊急者死脉訣云下痢微小即爲生脉大浮洪無差日

○仲景治痢大法

○東垣治痢大法

按此並見滯下門

○瀉分寒熱

下一字
一本作
不化二
字

病機機要云。臟腑瀉痢。其證多種。大抵從風濕熱論。是知寒少熱多。寒則不能久也。故曰暴瀉非陽。久瀉非陰。大便完穀下有寒。有熱。熱者脉疾。身多動者。聲響亮。暴注下迫。此陽也。寒者脉沉而細。身不動作。目睛不了了。飲食不下。鼻準氣息者。姜附湯主之。若身重四肢不舉。朮附湯主之。

按此以瀉之久。暴分陰陽。正如傷寒之病。始爲寒而終則傳變而爲熱也。然亦必以脉證參訂焉。原病式曰。瀉白爲寒。青黃紅赤黑皆以爲熱也。大抵瀉痢小便清白不澁爲寒。赤澁者爲熱。又完穀不化而色不變。吐利腥穢。澄澈清冷。小便清白不澁。身涼。

不渴。脉遲細而微者寒也。穀雖不化而色變非白。煩渴小便赤澀者熱證也。凡穀消化無問色及他證便爲熱也。寒泄而穀消化者未之有也。或火性急速傳化失常。穀雖不化而飧泄者亦有之矣。仲景云邪熱不殺穀。然熱得濕則飧泄也。

○論瀉痢有濕有熱有風有寒

機要云有太陰經受濕而爲水泄。虛滑身重微滿。不知穀味。久則防變而爲膿血。脾經傳腎謂之賊邪。故難愈。若先利而後滑。謂之微邪。故易痊。此皆脾土受濕之所爲也。

有厥陰經下痢不止。其脉沉而遲。手足厥逆。涕唾膿

血此難治宜麻黃湯小續命汗之此有表邪縮於內當瀉表邪而愈

有暴下無聲身冷自汗小便自利大便不禁氣難布息脉微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也

○論暴注屬火

子和云夫暴注瀉水不已內經曰注下也注下水利也暴速甚者屬火宜用水調桂苓甘露飲五苓益元散或以長流水煎放冷服涼膈通聖散亦能治之慎不可驟用罌粟殼乾姜豆蔻之類縱瀉止亦轉生他疾止可分陰陽利水道而已

按已上論所辨寒熱風濕火等證所以明六淫之

邪皆能爲瀉爲注者。亦當各隨肝淫之邪分而治之可也。

○論胃氣下降爲飧泄

機要云。夫脾胃同濕土之化。主腐熟水穀。胃氣和平。飲食入胃。精氣則輸於脾土。歸於肺。行於百脉而成榮衛。若飲食一傷。起居不時。損其胃氣。則上升精蕪之氣反下降。是爲飧泄。久則大陰傳少陰而爲腸澼。

○論春傷於風夏必飧泄

機要云。春宜緩形。形緩動則肝木乃榮。反靜密則是行秋令。金能制木。風內藏。甚至則火盛而金去。獨火木旺而脾土損矣。輕則飧泄。脉泄穀不化。重則下利。

膿血稠粘。良方云。經云。春傷於風。夏必飧泄。蓋風喜傷肝。春時木旺。不受邪。反移氣尅於脾土。脾既受尅。不能運化。因成積滯。夏秋之間。再感暑濕風冷之氣。發動而成痢也。

○論飧泄屬風宜汗

子和云。飧泄不止。完穀不出發汗可也。桂枝麻黃湯主之。此證以風爲根。蓋風隨汗出也。

按飧泄證。機要謂胃氣下流。及春行秋令。良方謂春木旺移氣尅脾。二論雖殊。要之皆曰風木傳變。而脾土受邪爾。子和謂風隨汗解。此論固是。然亦須隨其傳變而治。不可執此一法也。

○瀉分三因

三因證氏云。泄瀉一證。經中所謂洞泄。飧泄。溏泄。溢泄。濡泄。米穀注下是也。所目有內外不內外差殊耳。經云。春傷於風。夏必飧泄。又云。濕勝則濡泄。寒甚則爲泄。暑熱盛之亦爲泄。至於七情感動。藏氣不平。亦致溏泄。其如飲食不節。過食生冷而成泄瀉者。乃脾胃有傷也。但停滯泄瀉一證。直須積滯已消。然後用以斷下藥。今人往往便固止之。多成痢疾者矣。治法先理中焦。次分利水穀。治中不效。然後斷下。

按此三因所分甚詳。但外所淫者。既六而立方止。有其二。內之七情爲證。而又不詳及於治法。

○治瀉痢用吐下汗三法

子和云。一僧臟腑不調。三年不效。此洞泄也。以謀慮不決而成。肝主謀慮。甚則乘脾。脾濕不流。乃上湧痰半盆。又以舟車丸。瀦川散下數行。仍使澡浴出汗。自爾日勝一日。常以胃風湯白朮散調養之。

按子和爲治。大率多用此三法。洞泄一證。縱其果有積滯鬱結之甚。元氣壯實者。亦不宜驟用此三法。況有積滯雖甚。而元氣尤虛者哉。設使果當用此三法者。亦當如仲景察證以辨其吐汗下者。有下不可下之殊。況仲景治痢。又有合下合溫之法。焉。此得非孟浪乎。

○丹溪論局方用熱藥泄藥治痢之誤

按此見滯下門

謹按泄瀉一證。古方率以爲腸胃虛寒與風冷乘之爲論。故多行溫熱之劑。彼瀉痢者。豈無積滯。豈無熱證乎。今觀病機要所論。有屬寒屬風濕屬火之證。此曰於外而傷者也。又云。厥陰經動并胃氣下降爲瀉痢。三曰所言七情感動。臟氣不平。亦致溏泄。此則曰於內而傷者也。外則當調六氣。內則當平五藏。况又有飲食所傷。腸胃停滯所致者。治法各不同也。然更有曰胃氣下流而泄者。在法則當升舉。曰風而成飧泄者。則當解散。曰痰積於

上焦以致大腸之不固而泄者。又當去上焦之痰。而不治其瀉。曰脾胃氣虛而泄者。又當補中益氣。使胃氣升騰而泄自止。蓋各求其本而治可也。

泄瀉治法

○治濕之劑

機要白朮芍藥湯。治太陰脾經受濕。水泄注下體重。微滿困弱無力。不欲飲食。暴泄無數。水穀不化。宜此湯和之。身重暴下。是大勢來亦宜和也。

白朮

芍藥

各一兩

甘草 五錢

右剉每服一兩水煎

治濕瀉茯苓湯

又治食瀉濕熱

白朮

茯苓 各七錢半

右㕮咀每服一兩水煎食前服

一方有芍藥三味等分名白朮散

按已上二方和中除濕足太陰陽明經藥也白朮之甘入胃而除脾胃之濕芍藥之酸澁除胃中之濕熱四肢困茯苓利水道而除濕此三味泄痢須用之藥也

蒼朮芍藥湯治證如前

蒼朮 二兩

芍藥 一兩

黃芩 半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢煎服清

按此解散濕熱上中二焦之劑太陰經的藥也

良方胃苓湯。治夏秋之間。脾胃傷冷。水穀不分。泄瀉

不止

五苓散

平胃散

右合和姜棗煎空心服

按此乃表裏除濕之劑。東垣所謂上下分消其濕是也。太陽太陰經藥也。出陽明飲痞例

仲景五苓散

宜明益元散

二方並
昇濕劑

按已上二方。除濕利小便之劑。太陽經的藥也

○治風之劑

機要防風芍藥湯。治泄痢飧泄。身熱脉弦腹痛而得

得一本
作渴

及頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩各一兩

右咬咀。每服半兩。水煎服清。

按此治風辛涼之劑。太陰太陽經藥也。

蒼朮防風湯。治泄痢脉弦頭微痛。

蒼朮

二兩

防風

一兩

一方蒼朮四兩。麻黃一兩。防風五錢。姜七片。煎詳見

正傳本門

按此足太陰陽明經藥也。

良方神朮散。治春傷於風。芤必飧泄。

蒼朮一斤

藁本

川芎各六兩

五機論卷六
十
羌活 四兩

粉草

細辛 各一兩
六錢

右爲粗末。每服三錢。姜二片煎。要出汗。加葱白。
按已上三方。治風勝濕。辛溫之劑。此則太陽經藥
也。

局方胃風湯。治大人小兒風冷乘虛入客腸胃。水穀
不化。泄瀉注下。方見滯
下門

按此方名曰治風。其實和血之藥也。

(一) 治熱之劑

局方戊己丸。治脾胃濕熱泄痢不止。方見滯
下門

按泄瀉局方多以爲寒。至劉張始言有屬熱屬火
之證。故諸方中治熱瀉之方甚少。然仲景治傷寒

挾熱下痢用葛根黃芩黃連湯。但入未之思耳。

○治暑之劑

局方來復丹治伏暑泄瀉如水。

方見暑門

易簡云。硝石性寒。佐以陳皮。其性疎快。硫黃且能利人。若作暖藥以止瀉。誤矣。蓋由啖食生冷。或冒暑熱之氣。中脘閉結。揮霍變亂。此藥通利三焦。分理陰陽。服之甚驗。

按此出厥陰硫黃例藥也。

香薷飲治伏暑吐瀉。

方見暑劑

按此治暑之表藥也。肺脾經藥也。出太陰厚朴例。宣明桂苓甘露飲。治飲水不消。嘔吐泄痢。或下痢赤。

白方見暑劑

按五苓散益元散加寒水石。解利濕熱。太陽經藥也。

○治寒之劑

機要漿水散。治暴瀉如水。周身汗出。一身盡冷。脉微而弱。氣少不能語。甚者加吐。此為急病。

半夏一兩湯洗

附子半兩炮

乾姜一作乾生薑

桂

甘草炙各五錢

良姜二錢半

右為細末。每服三五錢。漿水二盞煎至半盞。和滓熱服。

白朮湯