

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷二百十二

周王朱橚 撰

泄痢門

白痢

附論

大凡泄痢者冷痢之類蓋腸胃受冷留而不去舉津液
相傳結滯如膿或如凝脂腹痛而下故為白痢

附方
金方
治冷白痢及腹痛

附子

一兩半

赤石脂

一兩

乾薑

一兩半

芍藥

甘草

各半兩

當歸

龍骨

各一兩半

白朮

二兩

牡蠣

一兩半

人參

三分

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓空

心溫服日晚再服有膿加厚朴一兩去麤皮薑汁塗

炙紫色若嘔加陳皮一兩湯浸去白焙

龍骨湯 療白滯下夜無復數

龍骨

牡蠣

各三兩

烏梅肉

熟艾

乾薑

白頭

翁

各一兩

女薑

黃連

當歸

各二兩

甘草

六兩

右切以水七升煮取三升二合分服日三服一斷便
止忌海藻松菜猪肉冷水

豆蔻丸 治白滯痢腹臍撮痛

肉豆蔻一兩草豆蔻一兩縮砂仁一兩母丁香一兩木香

沉香各半兩墨半兩枇杷葉炙一兩

右搗羅為末燒粟米飯為丸櫻桃大每服二丸米飯
化下食前服

厚朴散出聖惠方治白痢四肢不和腹內疝痛

厚朴

二兩 地榆

一兩 當歸

一兩 黃連

一兩

赤芍藥

半兩

赤石

脂

二兩 禹餘糧

二兩 乾薑

一兩 吳茱萸

半兩

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

馬蘭子散

出聖惠方

治赤白痢腹內疴痛行數極多色白如

泔浞不欲飲食

馬蘭子

二兩 地榆

一兩

厚朴

一兩

艾葉

一兩

赤石脂

二兩

龍骨

二兩 當歸

一兩

肉豆蔻

一兩

白朮

一兩

一兩

右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

訶梨勒散

出聖惠方

治白痢腹痛胸膈痞滿不能飲食

訶梨勒

一兩

木香

三兩

附子

一兩

乾薑

一兩

白茯苓

一兩

厚朴

一兩枳實

一兩

甘草

半兩

當歸

一兩

剉

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

黃連散

出聖惠方

治白痢腹痛不思飲食瘦瘁骨立宜服

黃連

一兩

乾薑

一兩

厚朴

一兩

神麴

各一兩

禹餘糧

各一兩

赤石

脂

脂

二兩

當歸

酸石榴

川烏頭

各一兩

炮製

各一兩

右搗羅為末以醋煮麴糊為丸如梧桐子大每服不

計時候以艾湯下三十丸

牡蠣散 治白膿痢晝夜無數

牡蠣一兩 龍骨一兩 烏梅肉半兩 白頭翁 女薑 黃連

當歸 甘草各半兩炙

右搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

人參湯 治白滯痢及小便白

人參 龍骨 當歸 乾薑 甘草 白茯苓半兩

厚朴一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓空心服

日晚再如小兒患量大小加減

肉豆蔻散出聖惠方治白痢心腹脹滿不能飲食

肉豆蔻一兩厚朴三兩乾薑一兩甘草半兩訶梨勒一兩

陳橘皮一兩湯浸

右搗細羅為末每服不計時候以粥飲調下二錢

龍骨散出聖惠方治白痢腹痛不能飲食

龍骨 赤石脂 白朮各一兩厚朴 當歸各二兩吳

茱萸

三分
湯浸

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

陳麴湯 治白滯痢及腹痛不止

陳麴

黃連

厚朴

各一兩

乾薑

附子

各半兩
炮製

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓

空心服日晚再服

白朮湯 治白滯痢及水痢日夜一二十行心中痛

白朮

三分

甘草

半兩

厚朴

一兩

黃栢

龍骨

各半兩

右搗篩每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓空心服日晚再服

阿魏丸 治丈夫婦人久患白滯痢如魚腦

阿魏

一分桂末半兩

木香

半兩

安息香

一分

獨頭蒜

二顆

右同研極細溫酒和丸如梧桐子大每服三十丸空

心陳米飲下日午再服

黃芩丸 治白痢多膿肚中疴痛

黃芩

黃連

黃蘗

各一兩半

吳茱萸

炒一兩

訶梨勒皮

炒二兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸食前橘

皮湯下日晚再服

當歸丸 治白膿及諸痢

當歸 黃連炒三分 烏梅肉半兩 阿膠半兩

右為末鎔蠟為丸如梧桐子大每服空心溫粥飲下

二十丸日午再服

豆蔻湯 治白滯痢心腹脹滿不下食

肉豆蔻

甘草

各半兩

乾薑

半兩炮

厚朴

一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服日午再服

薑附散 治臟寒下痢白膿心腹疼痛

乾薑

附子

訶梨勒

龍骨

各一兩

右為散每服三錢煎烏梅湯空心調下

烏梅肉丸

主冷白膿痢食不消病深為白滯痢者腸

虛而氣冷客之搏于腸間津液凝滯成白故為白滯

痢

烏梅肉

熟艾

黃蘗

甘草

各二兩炙

右搗篩為末蜜和丸如梧桐子大粥飲服十五丸三

服忌海藻菰菜

桃花丸

出十便良方

治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢

純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂

乾薑

各等分

右為末水麩糊丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲

下空心日三服若血痢甘草湯下白痢乾薑湯下一
方為末飲下蜜丸亦可

薑粟散

治瀉痢純白者

方見本門

和氣飲子

治大小腑皆通下痢白色宜服此兼進訶

梨勒丸

人參

白朮

當歸

肉豆蔻

阿膠

白茯苓

乾薑

各三分

木香

罌粟殼

香薷

甘草

已上各二錢

蒿豉餅

等分

右為呔咀每服五錢匕水一盞半煎七分去滓服無

時候

訶梨勒丸 治白痢

訶子半兩肉豆蔻一兩木香三錢乾薑半兩阿膠三錢

右為細末糯米粥濃飲為丸如梧桐子大每服五十

丸陳粟米飲下前方相間服痢減則減痢止則勿服

○果州人何伯巽進士及第留意于醫月有所得用

藥多奇中近日孫女病此易三醫不効因招其調治

得二方不數服而愈

治傷酒後臟腑不調忽時下黃白痢胸膈不快飯食無
味精神少爽宜服此方

黃橘皮 桔梗 桑寄生 蓬莪茂 草豆蔻

甘草 木香 防風 芎藭

各一分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎兩三沸空心服

實腸散 治白痢

肉豆蔻 一個 訶子 一錢 當歸 一錢 厚朴 一錢 龍骨 一錢 陳皮

二錢甘草灸一錢

右並為細末每服二錢陳米湯調下

當歸散 治白痢腹痛不止

當歸 阿膠 乾薑 白朮 赤芍藥 附子各

兩烏梅肉二兩甘草半兩厚朴一兩半

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分
去滓不計時候稍熱服

赤痢 附論