

髮柳



髮消



髮巢蜂



髮疽天



腦癰

腦後頸後頂心發是六腑陽毒聚頂太陽膀胱主之久積痰火濕熱上蒸于腦也

大凡頭腦上生癰疽宜服降火化痰消腫托之藥不可輕易吐炙惟初起隔蒜炙之則可但艾炷宜小而少若勢成者外敷攔癰膏陰陽散之類若熱上蒸連頤而穿口必主穿喉而死若服藥色黯不潰不斂爲陰精涸名腦癰不治但施方必隨證而治之癰疽生于腦前者名腦發又名癰冠發若生于腦後枕處者名枕發但宜用千金托裏散

○千金托裏散 紅內消 秦龜身 大川芎 穿山蜈蚣 小

黃芪名二防 風 羌活 白芷 山慈姑 蘇升麻 京赤

芍 川山甲名一錢五分 甘草 五分 半酒半水煎服毒未成者

一貼即消已成者三貼即破也後膿血去多則氣血虛弱宜服

內補散大貼

方能合

○內補散

好人參

不川此作咳者

小黃

茂 泰歸身

大川芎

川厚朴

厚肉桂

防風肉

甘草

即 白芷頭

各等分水煎服如四

邊紅不退加紅肉消山慈

姑去肉桂如

膿濃閉毒倍加川芎如膿水清不乾倍加黃芪自

久口不合再

服三貼外用烏枚燒灰存性敷口上

又方

治

潰破者內服

前十宜散外用鹽茶洗麻油抹白硃砂散厚攤玉

容膏貼之如有汚肉亦如前治法總要化毒生肌斂口治之

癰疽生子腦後

對口者名曰天疽又名對口發其狀大而色紫黑

若不急治熱入

淵液前傷任脉內蘊肝肺十餘日死急用肉托平

金散或千金托

裏散外以白硃砂散麻油調敷毒上中間隔口快

○內托千金散

人參

黃芪

歸尾

白芷稍

白芍

官桂

小芎

防風

桔梗

銀花

瓜蒌

甘草

水煎酒間服

癰疽生千腦心者四邊嫩赤腫硬連于耳項寒熱疼痛若不急治

毒入于血肉多腐壞膿水從頭中而出血逆痰起不治

癰疽生于頸後者瘡頭向上瘡尾向下肉多竊根形如蜂窠乃反

疔也其名遂即曰蜂窠發癰腫者易療如痰發或流入兩肩者不

治但按腫起者急宜用前方括歌內計煉附子升麻赤芍

如痛腦癰癰腫作痛煩渴好飲冷水宜除痰火濕熱之劑用活命

飲或黃連消毒散加天花粉選用

黃連消毒散黃連錢羌活錢獨活錢黃芪錢黃芩錢黃柏錢

防風錢甘草錢人參錢當歸錢花粉錢桔梗錢知母錢

宅舍蘇葉陳皮

活命飲白芍白芷川芎當歸貝母陳皮天花粉

金銀花乳香沒藥大黃甘草皂刺角川山酒藥

如腫毒口乾作渴好飲熱湯為腎虛火熾宜前方歌括內括裏消

毒散或托裏益氣湯選用之

托裏益氣湯

人參

茯苓

白朮

貝母

陳皮

香附

白芍

歸身

熟地

桔梗

甘草

水煎服

如因膏染熱鬱成腦疽者宜用

當歸

黃連

黃芩

酒炒各

黃柏

燭連

防風

羌活

山梔

甘草

各一錢

獨活

澤瀉

本水浸良久入酒半盞同煎熱服日二次三日盡六服

却將藥清汁調下木香檳榔末各三錢

乘枕瘋

腦枕後痛浮腫者可針先服大頭腫內開闔散久服咽

喉內地黃散

頭瘡

頭上生瘡

用黃連

五錢

蛇床子

二錢

五倍子

一錢

輕粉

香油調搽但先宜荆芥葱煎水洗

頭瘡濕爛良方

用燕窠土細搗為末乾摻或準用石羔半生白

凡火煨為末乾摻

頭上生瘡生虱

用銀硃一錢打爛艾葉及火帛捲筒點灼放桶

內以烟薰之但要布蓋定頭莫使烟出久已熏次日瘡癰死
頭上生瘡如梅花點 用生鯉魚一個去骨錐不見生水以生礬

末一錢人言三分入魚肉茶油浸焙乾爲末乾摻之五六日即
脫去但先宜花椒鹽茶洗淨

疔頭 用羊舌根草白礬火煨搗爛敷神効

又禿頭方 用烏魚頭一個花椒一撮麻油一大鍾秀釘磨油半

鍾四味將鉄杓盛置火上煎七得魚枯去魚骨搽之

楊花疔 用金頭蜈蚣一條紫草不拘多少麻油煎成膏搽患處

但先要用茶洗淨如小兒肥瘡去蜈蚣

小兒禿瘡用木油一面肥皂八錢同煎撈去肥皂以油抹

小兒頭瘡爛成塊久不愈者以花椒末新猪油煎膏調塗三五愈

小兒滿頭瘡用舊綱巾燒灰爲末麻油調搽

小兒頭上黃水瘡用雄黃硃砂硫黃寒水石枯凡蛇床子等分爲

末麻油調搽溫者于搽

小兒頭生紅餅瘡名胎癰先用生艾白芷大伏皮葱白煎湯洗淨拭干次用生藍藥入蜜熬膏敷之

大頭腫

天頭腫又名雷頭風是症乃溫在高顙之上故頭面痛腫疔瘡甚則咽噎堵寒害人最速冬溫後多病此症有似傷寒也熱身痛治宜分表裏三陽

病大頭腫如脉浮表症多者宜清震湯或方括歌內荆防敗毒散治之清震湯 升麻 蒼朮 各一兩 蓮葉 一皮 水煎服

脉沉裏表見者宜羌活湯為主 羌活湯 羌活 酒炒 黃芩 酒炒

大黃 酒炒 如連兩日鼻面腫者陽明也宜羌黃湯加乾葛并麻葛

如發耳前後并頭角者少陽也宜羌黃湯加瓜蒌仁牛蒡子

如腦後項下腫起者太陽也宜羌黃湯加防風荆芥俱水煎時上

服之收大便邪氣去則止甚者加芒硝

如咽喉腫痛者姜虫一兩大黃二兩宜丸彈子大井水化服

如表裏俱解腫不消者磁鋒去血外用開闔散細辛牙皂倍羊

及藜蘆少許搗鼻啖以泄其毒

如久不愈欲作膿者內服方括內歌托裏消毒散

如潰後腫赤不消膿清白者宜大君子湯加桔梗芩歸

六君子湯

陳皮

半夏

人參

白朮

茯苓

甘草

如氣素弱脉微者用人參白朮當歸川芎陳皮柴胡升麻甘草等

分以升舉陽氣用牛蒡子玄參連翹桔梗減半以解熱毒要知

腫赤便屬純陽脉微便屬陰慎之慎之

頭風神方

翠鳥舌

一個以桐油浸晒乾復浸如此不計其數要

舌硬如三稜針一般方住遇頭風發將鳥舌于頭上亂針即愈

不過三五次即愈

邊頭痛風 一 邊頭疼如破可針先用開門散次用咽喉內地

散合紫證散服后用補藥

開閉散

川芎

錢五

白芷

兩一

北辛

去葉三錢

薄荷葉

紅五

爲末

每服二錢

食

後用葱湯或熱茶或水調下後服用茶葱煎熱水下

髮疽

髮疽之症乃肝胆怒火或風熱腎虛血燥脾勞所致也方宜隨症

治之如怒火風熱宜柴胡清肝湯腫痛甚者臙腦癰內活命飲

○柴胡清肝湯

柴胡

山梔

白芍

黃芩

人參

連翹

桔梗

如腎水不能生水以致肝胆火盛血燥髮及頭目腫痛

者或曰肺潮熱宜用當歸川芎白芍熟地柴胡桔梗煎服

如因勞役腫痛寒熱喘渴目汗者宜補中益氣湯去升麻柴胡加

五味麥門冬炮姜煎服

○補中益氣湯

人參

黃芪

甘草

白朮

柴胡

當歸身

升麻
陳皮
半夏

髮發單方用頭髮灰香油調搽

耳瘡

耳瘡之症乃三焦肝風熱或血虛腎虛火動所致不可不隨症而治也耳瘡發熱熈痛屬三焦厥陰風熱宜鬢疽內柴胡清肝湯內熱痒痛出膿寒熱瀉數牽引胸脇脹痛屬肝火血虛宜八味逍遙散

常歸 白芍 茯苓 才平 車前 枳殼 甘草

耳中有膿乃腎經氣實熱上冲耳遂使津液壅滯爲膿或小兒冰
浴水入耳中停蓄搏于氣血醞釀成膿治宜黃龍散枯凡錢一龍骨

鐵黃丹飛入胭脂燒灰射香詩爲未先以綿枝子展去耳中膿

方以葉摻入內日用之勿令風入

耳內出膿臭熱疼痛用鯁鮑草洗淨入鹽少許共搗末絹帛濾汁

滴入耳內後用枯白片末將筆管吹入其中二三次乃効

耳邊眼下赤爛濕痒用黃丹煨赤色白凡飛壯朶豆粉各一錢

細末若摻翳上或睡調搽亦可

耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水或乾痛不可忍者宜用蛇退皮燒存性爲末以鵝管推入耳中

耳間疼痛如刀割出血流膿久不乾者鳩屎夜明砂吹入內甚神

耳濕用陳皮燒灰吹入耳中數次神効

耳底用桑礪硝一個慢火炙八分煖存性入射一分爲末每用半

分摻耳內如有膿先用綿拭去膿方摻

聾耳神方 用蒼朮削尖入耳孔內將艾火置蒼朮頭上煖六七

合架風 兩耳下生一舌核紅腫牙關緊閉口不得開剪刀微開

以竹筴入內灌地黃散台紫証散有方俱見咽喉類

皮株子風 兩耳浮腫生核者老人多有此病宜服咽喉內紫證

散地黃散及大頭腫內開散

百虫入耳 用兩刀于耳邊用磨戛作破即出或用麻油滋之即

百力全書卷之二

又方用桃葉柳碎塞耳目出
又方用葱涕滋耳中虫自出或

閉塞諸數自出

蚰蜒入耳

用猪尿灌耳立出

取猫尿用盆盛猫以生姜擦牙

蒼蠅入耳

用皂角子研爛用生鮮魚血灌耳中即出

蟻子入耳

用猪精肉一指炙炙令香置耳孔边即出

蜈蚣入耳

用生姜汁或韭汁灌耳自出或以熟雞肉一塊置耳

雜物入耳中不得出

以麻繩剪一頭散溶牛膠在上探入耳中

使其物粘之徐引出効

水入耳中用薄荷汁點之効

黃豆入耳中用鵝翎管截長一二

寸許去其中痕留少許於一頭以有膜之頭人耳用口氣吸唧

內痔

內痔之症生于口上勝酒初發加連花根蒂小而垂廼大大最是
虛勞元氣薄也

另治法

以鈎刀決其根燒鉄烙以止其血次以雄黃輕粉七

霸白萍曰歛爲末敷之以槐枝作枕支其牙頰間毋使口含

二時許瘡癰定合口自便次日出膿以生肌搗之

馬牙疳

用紅束一個去核包信沙許以濕帛裹定火內燒并

黃藥其爲末貼牙上

小兒口中生瘡

用薄荷荆介各一錢栢葉二分半甘草三分共

爲末入朴硝青黛礪砂各二分和勻以絹帛拭去口中白將前

藥少許點舌或密調搽如泄瀉用乳調更妙

口舌瘡

夫口舌爲病或爲糜爛生瘡或爲重舌木舌原其所因未有不因

七情煩擾五味過傷之所致也

口瘡用綠袍散黃柏

去

破青黛二錢

右爲末搽患處隨之吐出涎

即愈或單生白凡口含一二出涎數次如神

又方 用黃連黃柏黃芩枝子細辛乾姜右各等分爲細末先用

米泔水漱口後搽藥于患處吐嚥不拘神効

膈癰疽舌上生瘡咽喉腫痛用升麻赤芍人參桔梗干葛各錢

半甘草七分冰煎徐服

口爛出涎用噉化丸兒茶薄荷寒水石各三分粉草炙萍硝各仁

白凡煨過二分蜜丸噉化

口舌痛生瘡用上清丸薄荷葉三兩礪砂五錢天花粉一兩天竺

黃五錢風化硝百葉煎防丰兒茶甘草各一兩桔梗七錢

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每用一九噉化

氣口乾口舌生瘡宜礪砂紅花腦射香各分馬牙硝風化細寒

水石一兩右爲末以甘草膏爲丸如麻子大不拘時含一九煉

凡口瘡用涼藥不愈者乃中氣虛相火熾無制用于姜人參白木

等服從治之即愈甚者加附子或用官桂末參之或用乾姜

連等分爲末摻之涎出立効

舌上腫硬

甲百草霜海鹽爲末并花水調敷

又方

用蒲黃末頻摻舌上內以黃連一味煎湯服之以瀉心火

舌長過寸

古用水片敷之即收

舌無故出血如泉以槐花爲末摻之即止

舌上忽脹出口外俗云是蜈蚣毒用雄雞血一小盞浸之即縮入

色舌蓮花風乃舌下浮腫生毒可針兩邊尖片切莫針中央先用

地黃散次用紫證散後用三味熏藥或用角藥右方俱見咽喉

木舌風 舌尖角生毒難以轉移紅腫破用針次用地黃散

搶食風 飲食中忽生血泡在腭及舌根左右隨食脹塞不能吞

用芒針七破內服地黃散合紫證散方見咽喉

唇嘴風 下唇腫痛可針可熏先宜地黃散次紫證散開閉散其

地黃散紫證散方見咽喉具開閉散見大頭腫內

口舌唇舌

唇皸燥裂生瘡

宜橄欖燒灰不拘多少猪油和敷患處

口唇乾裂破成瘡

用蘆薈石三火煨文蛤一兩黃柏兩蒼朮五錢除

甘石三味同炒赤色共研細八片腦三分再研用蠟油調敷唇

水茶南京傳用上品細茶去梗一片用甘草濃煎取汁調兒茶末

六兩冰崖一錢拌透細茶

晚次日晒乾

吞口膈妙不可

香茶餅南京傳

用孩兒茶四兩桂花二兩薄荷一兩硼砂五錢水

片二分爲末用甘草黃汁熬膏作餅噙化嚙下能清上化痰香

牙齒

夫齒者腎之標骨之餘也足陽明胃之脉貫絡于齒上齦手陽明

大腸之脉貫絡于齒下齦其間有腫痛臭爛者皆由陽明胃有風

邪或濕熱而生虫也惟痛而動搖者多屬腎元虛耳治宜瀉陽明

之濕熱更以擦牙及誅虫之劑投之

上下牙齒疼痛不可忍牽動痛滿而發塊大痛此是過食辛辣之