

傷寒類方

徐泗谿先生十三種

序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃叔和之所搜集者雖分定六經而語無詮次陽經中多陰經治法陰經中多陽經治法參錯不一後人各生議論每成一書必前後更易數條互相訾議各是其說愈更愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書乃救誤之書也其自序云傷天橫之莫救所以尋求古訓博採衆方蓋因誤治之後變證錯雜必無循經現證之理當時著書亦不過隨證立方本無一定之次序也余始亦疑其有鎖亂乃探求三十年而後悟其所以然之故於是不類經而類方蓋方之治病有定而病之變遷無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用不爽此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理解肌發汗攻邪散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其加減輕重又各有法度不可分毫假借細分之不外十二類每類先定主方卽以同類諸方附焉其方之精思妙用又復一一註明條分而縷悉之隨以論中用此方之證死於方後而更明發其所以然之故使讀者於病情藥性一目顯然不論從何經來從何經去而見證施治與仲景之意無不吻合豈非至便之法乎余纂集成帙之後又復鑽窮者七年而五易其稿乃無遺憾前宋朱肱活人書亦曾彙治法於方後但方不分類而又無所發明故閱之終不得其要領此書之成後之讀傷寒論者庶可以此爲津梁乎

乾隆二十四年小陽月上浣洞溪徐大椿序

傷寒論類方目錄

桂枝湯類一十九方

桂枝湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝甘草湯

桂枝二越婢一湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

麻黃湯類二六方

麻黃湯

麻黃附子細辛湯

葛根湯類三三方

葛根湯

柴胡湯類四六方

小柴胡湯

胡柴桂枝乾薑湯

梔子湯類五七方

梔子豉湯

梔子厚朴枳實湯

承氣湯類六十二方

桂枝加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加葛根湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃附子甘草湯

葛根黃芩黃連湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

梔子甘草豉湯

梔子柏皮湯

桂枝加桂湯

小建中湯

桂枝麻者各半湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝去芍藥湯

桂枝加芍藥湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根加半夏湯

柴胡加桂枝湯

梔子生薑豉湯

枳實梔子豉湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

梔子乾薑湯

梔子乾薑湯

梔子乾薑湯

梔子乾薑湯

大承氣湯

抵當湯

大陷胸丸

瀉心湯類七十一方

生薑瀉心湯

附子瀉心湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白虎湯類八三方

白虎湯

五苓湯類九四方

五苓散

四逆湯類十一方

四逆湯

乾薑附子湯

四逆散

理中湯類十一方

理中丸

桂枝附子湯

芍藥甘草附子湯

小承氣湯

抵當丸

小陷胸湯

甘草瀉心湯

黃連湯

旋復代赭石湯

白虎加人參湯

猪苓湯

四逆加人參湯

茯苓四逆湯

當歸四逆湯

真武湯

桂枝附子去桂加白朮湯

桂枝人參湯

調胃承氣湯

十棗湯

白散

半夏瀉心湯

黃芩湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

竹葉石膏湯

文蛤散

通脈四逆湯

白通湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

附子湯

甘草附子湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

桃仁承氣湯

大陷胸湯

麻仁丸

大黃黃連瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

茯苓甘草湯

通脈四逆加猪膽汁湯

白通加猪膽汁湯

赤石脂禹餘糧湯

炙甘草湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

茵陳蒿湯

麻黃連軹赤小豆湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

黃連阿膠湯

吳茱萸湯

半夏散及湯

桃花湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

烏梅丸

白頭翁湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導方

豬膽汁方

燒褌散

以上共一百十三方

之和故又
申晉之
以榮行脈中循行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯
自汗與發汗週別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正發汗驅邪復發者因其自汗而更發之則榮衛和而自汗反止矣
病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時未熱發汗則愈宜桂枝湯主之
病無他病陽證不必備而惟發熱傷寒不大便六七日宜下之候頭痛有熱者未可與承氣湯
太陽證仍在不得以日久不便而下也按其熱自汗故亦用桂枝湯
傷寒不大便六七日宜下之候頭痛有熱者未可與承氣湯
未可二字從金匱增入傷寒論失此二字其小便清者知不在裏仍在表也
裏有熱當須發汗若頭痛者必衄
汗出而頭痛未解則宜桂枝湯
傷寒發汗解半

日許復煩脈浮數者可更發汗
發汗未透故煩乃宜桂枝湯
傷寒醫下之續得下痢清穀不止
身疼痛者表急當救裏
此誤下之證邪在外而引之入陰故便清發熱陽氣下脫可危雖表證未除後身疼痛清便自調者急當救表
清穀已止疼痛蓋凡病皆當先表後裏惟下痢清穀則以扶陽為急而表證為後清穀多者便膿血
後身疼痛清便自調者急當救表
未除仍從表治緩也表裏分治而序不亂後人欲以一方治數證必至兩誤
救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯
太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯
提出邪風二字見桂枝為驅風聖藥
陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方
陽明本自多汗但不惡寒而惡熱今多汗而猶太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯
太陰本無汗法因其脈獨浮則邪仍惡寒則仍在太陽矣雖陽明病而治從太陽
在表故亦用桂枝從不從風証也

病人煩熱汗出則解又加瘡狀
有時復熱日哺所發熱者屬陽明也
日哺發熱則為陽明之潮熱而非瘧矣
脈實者宜下之脈虛浮者宜發汗一證而治法迥別全以脈為據
此亦從脈而不從証之法
下之與大承毒湯發汗宜桂枝湯
下痢腹脹滿
身疼痛者表先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯
此節屬歐陰證未必由誤治而得然既見表證亦宜兼治
吐痢止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之
裏證除而表證猶在仍宜用桂枝法輕其劑而加減之可也
傷寒大下後復發汗
再誤心下痞邪入惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯
苦寒開降之法詳見後

桂枝加附子湯二
桂枝湯原方加附子一枚炮去
皮破八片
右六味以水七升煮取三升去渣溫服一升
太陽病發汗遂漏不止
此發汗太過如水流
其人惡風
中風本惡風汗後當愈今本念離風伸乃津脫陽虛之象但不至亡陽耳若更甚而厥冷惡寒則有陽脫之慮當用四逆湯矣
桂枝加附子湯主之
桂枝同附子服桂枝加桂湯
桂枝原方加桂三兩即另立名治證迥別古聖立方之嚴如

桂枝湯原方加桂二兩 右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升

燒針令其汗針處被寒復感新寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯不止一好故云各一壯與桂枝

加桂湯重加桂枝不特禦寒且制腎氣又藥味重則能達下凡奔豚證此方可增減用之

桂枝去芍藥湯四

桂枝湯原方去芍藥 右四味以水七升煮取三升溫服一升

桂枝去芍藥加附子湯五

即前方加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

太陽病下之後脈促胸滿者中虛而表邪仍在桂枝去芍藥湯主之太陽之邪未盡故用桂枝下後傷陰不宜更用涼藥若微惡寒者去芍藥方中加附

子湯主之微惡寒則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯六

桂枝湯原方加厚朴二兩炙去皮杏仁五十枚右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳別錄厚朴主消痰下氣本經杏仁主咳逆上氣太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之前條乃本然之喘此乃誤下之喘因殊而法一

而法一

小建中湯七

桂枝湯原方加膠飴一升 右六味以水七升煮取三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家

不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脈濡陰脈弦中宮之陽氣虛則木來乘土故陽濡而陰弦也法當腹中急痛先與小建中湯膠飴大甘以助中宮不差者與小柴胡湯上之治太陰不

愈遲而治少陽所以疎土中之木也以驅弦放用此法 傷寒一三日心中悸而煩者小建中湯主之悸而煩其為虛煩可知故用建中湯以補心脾之氣蓋糖子湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八

傷寒類方 桂枝湯

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩 右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此以多服為妙取其

陰也 味厚入

發汗後身疼痛表未盡 脈沈遲 氣虛 已甚 此湯主之表未盡宜藥而氣虛不能散藥故用人參凡藥虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯 九

桂枝四兩 去皮 甘草二兩 炙 右二味以水三升煮取一升頓服此以一劑為一服者

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此湯王之發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛二味扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲墮地即用真武湯矣一證而輕重不同用

方遲異其 義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤 去皮 桂枝四兩 去皮 甘草二兩 炙 大棗十二枚 擘 右四味以甘爛水一斗以水二斗揚之高漚取用 按甘爛水大約取其動極思靜之意 先煮茯苓凡方中專重之藥法必先

減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是擾胸中之陽臍下悸則因發汗太過上焦乾渴腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以治奔豚

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六銖 去皮 芍藥一兩 去皮 生薑半斤 切 甘草二兩 炙 麻黃四兩 去節各 杏仁二十四個 去皮及雙仁者 右七味以水五升先煮麻黃一

二沸去上沫欲去沫故先煮 納諸藥煮取一升八合減去三之一 去滓溫服六合二云桂枝湯二合麻黃湯三合頓服將息

如上述

太陽病得之八九日過 如瘧狀發熱惡寒熱多寒少邪已其人不少 清便欲自可無或一日二三度發非瘧脈

微緩者不浮不逆不大 為欲愈也餘邪欲退之 脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也此三句申明上文欲愈之故蓋由氣難除而正氣亦衰當靜

以養之使胃氣漸充則榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增醫者不審誤人多矣 面色反有熱色者未欲解也面有熱色則餘邪尚盛 以其不得小汗出身必痒宜服

微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足矣陽明篇云身痒如蟲行皮中狀者此以久虛故也按此方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分三服祇服四錢零乃治邪退後至輕之劑勿藥也

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七芍藥六錢甘草一兩杏仁十六個麻黃十六錢生薑一兩大棗五個右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升合為三升分再服

服桂枝湯大汗出脈洪大者汗雖出而邪未盡與桂枝湯如前法此所謂邪不盡若形如瘧日再發者汗出必解桂枝二麻黃一湯主之此與桂枝麻黃各半湯意略同但此因大秤出之後故桂枝略重而麻黃略輕

桂枝二越婢一湯十三桂枝湯加麻黃石羔二味

桂枝去皮芍藥 甘草 麻黃去節各十八錢大棗四個生薑一兩石羔二十四錢右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去渣服一升 附越婢方麻黃六兩 甘草二兩 石羔半斤 生薑三兩 大棗十五個

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可更汗此無陽與亡不同并與他處之陽虛亦別蓋其人本非壯盛而後等證故以此湯清燥榮衛令得復汗而解況熱多寒少熱在氣分尤與石膏為宜古聖用藥之審如此按以上三方所謂一二各半之說照方計算並不對準未知何說或云將本方各煎或一分或二分相和服此亦一法恒方中又各藥注明分兩則何也存考

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四芍藥三兩甘草二兩生薑 茯苓 白朮各二兩大棗十二個右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈此方專於利小也

服桂枝湯或下之仍頭項痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之頭痛發熱桂枝證仍在也以其無汗則不宜更用桂枝心下滿則用白朮小便利則用茯苓此證乃亡津液而有停飲者也凡方中有加減法皆按更之藥若去其君藥別另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意仍不離乎桂枝也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五桂枝湯原方去芍藥加蜀漆三兩洗牡蠣五兩龍骨四兩右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升納諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂以火劫其胸中之陽起臥不安者此湯主之此與少陰轉出之亡陽通別蓋少陰之亡陽乃亡陰中之陽故用四逆輩同其屬於腎中今乃以火逼汗

亡其陽中之陽故用安神之品其陽於心中各有至理不可見也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心腹邪積龍骨牡蠣治驚癇瘧氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝一兩甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解

此治脈浮之經訣

用火灸之

治邪無從出因火而盛火反病從腰以下必重而痺名火逆也

火氣在上則陰氣病治於下故重而痺

火逆下之

又誤

因燒針煩躁者

更誤治下之虛其陰燒針又益其陽則胸中益煩躁不甯矣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

驚狂象故蜀漆不用其體藥大段相同

桂枝加葛根湯十七

此湯成無己本有麻黃非有麻黃則為葛根湯矣

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同

右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫納諸藥

煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強口反汗出惡風者

凡八仲頸之象邪氣漸深故加葛根

桂枝加葛根湯主之

桂枝如芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍右五味以水升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰證而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煎取三升去滓溫服一升日三服

本太陽病醫反下之

引邪入於太陰故

治因而腹滿時痛屬太陰也

雖見太陰證而陽之證尙未罷故仍用桂枝湯只加芍藥一倍以

欲太陰

大實痛者

此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過所現皆太陰之證

桂枝加大黃湯主之

此因誤下而見太陰之證大實痛則反成太陰之實邪仍用大黃引之即從太陰出不因誤下而禁下見證施

治無不盡然按活人書云桂枝湯自西北人四時行之無不應驗江淮間連冬及春可行之春末及夏至以前桂枝說可加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後可知如每半兩石膏一兩或加升麻一分者病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類一

麻黃湯一

麻黃三兩 桂枝二兩 甘草一兩 杏仁七十個 右四味以水九升先煎麻黃減二升此須多煮取其力專不隨 去上沫

納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆微似汗不須啜粥以其易發汗也 餘如桂枝將息法活人書云夏至後用麻黃湯暈加知母石燕黃芩蓋麻黃性熱恐有

發黃斑 出之處

大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節痛此痛處比桂枝證尤多而 惡風無汗而喘者此二證乃肺氣不舒之證麻黃治無汗杏仁仁

以謂之 太陽與陽明合病陽明之病象甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但 喘而胸滿者不可下病俱在 宜麻黃湯主之

經方 太陽與陽明合病見一二證即是不必全具也太陽病即上文所指者 喘而胸滿者不可下上備 宜麻黃湯主之

喘而胸滿此麻黃證 太陽病十日以去過脈浮細邪已而嗜臥者 正漸 外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯胸滿脇

之太陰合陽明也 日久邪留少 脈但浮者與麻黃湯若果邪在少陽脈必帶弦今但浮則尚在太 太陽病脈浮發熱身疼痛此乃太陽

經云諸 八九日不解表證仍在表證即上 此當發其汗宜麻 服藥已微除其人發煩目瞑陽證而不 劇者必衄衄乃解

緊為寒 熱在動血由肺之清道而出與汗從皮毛而洩同故熱解亦解 所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱內 麻黃湯主之此

俗謂所云紅汗也經云陽明病口燥但欲飲水不欲嘔者此必衄 脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮 脈浮而數者可發汗宜麻黃湯數為陽

非衄後更用麻黃也 浮緊不發汗治失 因致衄者麻黃湯主之前段衄後而解則不必復用麻 陽明病脈浮無汗而喘者陽明水脈大自汗今乃

黃湯 發汗則愈宜麻黃湯 麻黃杏仁甘草石膏湯二 此即越婢湯 加杏仁也 右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煎取二升

麻黃四兩 杏仁五十個 甘草二兩 石膏半斤 去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯既汗不可再汗 津液不得重傷 汗出而嘔向有留邪在肺 放汗出而嘔 無大熱者邪已 可與此湯汗出故用石燕 發汗後飲水

多者必喘以水灌之亦喘此二句明致喘之所由蓋喘未必皆 由於水而飲水則無有不喘者戒之 下後不可更行桂枝湯既下不可復汗 津液不得再傷 若汗出而喘無

大熱者可與此湯

大青龍湯三 此合麻黃桂枝越婢三 方為一方而解芍藥

傷寒類方 麻黃湯

麻黃六兩 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁四十枚 生薑三兩 大棗十二枚 石膏一斤 右七味以水九升先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升滓溫服一升取微似汗汗多者溫粉撲之此外治之法論中無溫粉方明理論載白朮薑本後人用牡蠣煎後人用牡蠣煎亦可 一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

後人用牡蠣煎亦可 一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

大陽中風脈浮緊緊為陰風 發熱惡寒非惡風 身疼痛不汗出而煩燥者邪深 大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

惡風乃桂枝證誤服此則汗不止而有亡陽之象矣立此方即垂此戒聖人之意深矣越婢湯石羔用半斤而此用雞子大一塊一劑之藥除大棗約共十六兩以令汗出之亦重三兩有餘則發汗之重劑矣雖少加石羔終不足以制也 少陰篇云脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也 傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯主之

脈不沈緊身有輕時為無少陰外證不厥何吐逆為無少陰裏證此邪氣俱在外也故以大青龍發其之最輕者何必投以青龍險峻之劑此 汗 按此條必有誤脈浮緩邪輕易散身不疼外證已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等證此病必另有主方而誤以大青龍當之者也

小青龍湯四 麻黃去節 芍藥 細辛 乾薑 甘草 桂枝去皮各 五味子半斤 半夏半升 右八味以水一斗先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣溫服一升 若微利者麻黃 薤花如雞子大熬令赤色利屬下焦陰分不可更益其氣薤花常用當時已不可得故改用薤花以其皆有去水之功也 若渴者去半夏加栝樓根三兩本草栝樓若噎者噎古作餽云寒氣相搏飲冷水令大出水得寒氣冷必相搏其人即餓按內經無噎字疑即嘔逆之輕者 去黃柏加附子一枚炮本草附子過中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩利而少腹滿則水不在上而若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖 杏仁見前 按此方專治水氣壅汗為水類肺為水源邪汗未盡必停在下矣故用茯苓 傷寒表不解水逆 心下有水氣即未出 乾嘔發熱而欬或渴或痢或噎或小便不利少腹脹滿或喘者小

以上皆水停心下現證其 傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴凡水停心下者喘而不渴 服湯已即小 渴者此寒氣欲解也

每證治法皆在加減中 此倒案法即指服湯已三字非 欲 小青龍湯主之 謂欲解之後更榮小青龍湯也

麻黃附子細辛湯五 麻黃去節 附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

麻黃二兩細辛二兩附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

麻黃二兩細辛二兩附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

麻黃二兩細辛二兩附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

麻黃二兩細辛二兩附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

麻黃二兩細辛二兩附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

麻黃二兩細辛二兩附子一枚 右三味先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煎取三升去渣服溫一升日三服

少陰病始得之反發熱脈沈者湯主之少陰病三字所該者廣必為少陰病也。雖謂少陰之病發否則何以知其非太陽陽明之發熱邪又必候其脈象之沈然。蓋此知其為少陰無疑也。凡證皆當如此。附子細辛為少陰溫經之藥。夫人知之用麻黃者以其發熱則邪隨汗去。夫長入陰則可引之外。慮不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表氣通用亦能溫。故陰經諸藥皆用之。麻黃則專於發表。今欲散少陰始入之邪。非麻黃不可。況已有附子足以溫少陰之經矣。

麻黃附子甘草湯六

麻黃去節二兩 甘草二兩 附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸此當少煮

去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服

一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

三證雖直少陰太陽病為最而位最近故猶有汗解之理况二三日而無裏證則

其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏證也

葛根湯類二

葛根湯一 此即桂枝湯加麻黃三兩葛根四兩

葛根四兩 麻黃三兩 芍藥二兩 生薑三兩 甘草二兩 桂枝二兩 大棗十二枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根二味主藥先煮

減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥已龍類餘如桂枝法將息及禁忌

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

前桂枝加葛根湯一經其現證亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也。陽明證汗出而惡熱今無汗而惡風則未全入陽明故曰太陽病。按葛根本草治

身大熱大熱乃陽明之證也以太陽將入陽明之經故加此藥

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

合病全在下利一證上證出蓋風邪入胃則下利矣

葛根黃芩黃連湯二

葛根半斤 甘草二兩 黃芩三兩 黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去渣分溫再服

服

太陽病桂枝證桂枝證即太陽傷風之正病也醫反下之大誤利遂不止邪下陷則利無止時脈促者表未解也

促有數竅脈獨在外尚未陷入三陰喘而

汗出者此湯主之因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之苦以洩之堅之連甘草為治病之主藥

葛根加半夏湯三

傷寒類方

黃麻湯 葛根湯 柴胡湯

五

太陽與陽明合病不下利前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病何從而但嘔者葛根加半夏湯主之前條太陽利則用芍連治利因其本屬桂枝證而加濕故止加葛根一味以解陽明初入之邪此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病立方各有法度

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草炙 生薑各三分 半夏半斤 大棗十二枚 右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎此法又取三升溫服一升日三服此湯除大棗共二十八兩較今秤亦五兩六錢等分三服已為重劑蓋少陽介於兩陽之間須兼入古聖不但用藥之若胸中煩而不嘔者去半夏人參煩不可用人參加枳實一箇枳實除胸痺此若渴者去半夏其煎法俱有情義夏半夏能蒸痰選即能耗津液加入人參生津合前成四兩半括蕪根四兩治消渴若腹中痛者去黃芩若加芍藥三兩除腹痛若脇中痞硬去大棗以其能補脾胃加牡蠣四兩別錄云治脇下痞熱若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩利小便若不渴外有微熱者去人參不渴則津液自足加桂枝三兩微熱則邪留太陽溫覆取微似汗愈若欬者去人參大棗二味與生薑加乾薑故加五味子子半升乾薑二兩古方治嗽五味乾姜必同用以散寒邪一以飲正氣從無單用五味治飲之法不知用必有害況湯熱勞火用處極多能深求其義則變化心生矣

傷寒五六日正當傳少陽之期中風往來寒熱太陽之寒熱時亦熱熱時亦寒胸脇苦滿胸脇為少陽之位默默不欲飲食木邪心煩喜嘔木氣或胸中煩加不嘔或渴少陽火邪或腹中痛木剋土或脇下痞硬木氣或心下悸有痰小便不利或不渴有蓋身有微熱太陽未盡或欬者肺有此湯主之少陽所現之證甚多柴胡湯所治血弱氣盡腹脹開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食臍府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此條申明所以往來寒熱及不嘔入臍府相連所致則小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之此必先見少陽之証故用柴胡傷寒四五日身熱惡風頸項強此是太陽脇下滿此則少陽所獨手足溫而渴者前條之渴者屬陽明此因脇下滿則雖似陽明不作陽明治矣小柴胡湯主之傷寒陽脈瀉陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之詳見桂枝類中傷寒中風有柴胡證但見一證便

論中凡可通用之方必有加減法

是不必悉具少陽與太陽陽明相為出入一證可據雖有他證可兼治矣 凡柴胡湯病證而下之治若柴胡證不罷者復與柴胡湯 凡誤治而未盡

傷寒十二日不解二候胸 傷寒十二日不解二候胸 傷寒十二日不解二候胸

脇滿而嘔此少陽 日哺所發潮熱此似 已而微利又現裏證藥 此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥

下之非其治也以瀉劑利之不應復以潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外 雖潮熱本屬少陽之

邪故仍以柴胡解外後以柴胡加芒硝主之 傷寒十二日不解二候胸

解在後加傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結 故醫結不舒非藥誤

芒硝湯下即遷延所致亦 必有表復有裏也以上諸證有表有裏 脈沈亦在裏也必沈 汗出為陽微以汗 假令純陰結不得復有

外證無汗 此為半在裏半在表也汗出為表 脈雖沈緊細即有 不得為少陰病所以然者陰不得有汗此為 今頭汗出

故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得尿而解其病可愈其通便之法即加芒硝及大柴胡等方是也 陽明病

發潮熱大便溏小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之陽明潮熱乃當下之證因大便小便自可則裏證未

脇下硬滿少陽 不大便可 而下而嘔亦少 舌上白胎者邪未結於陽明故舌胎白雖 可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣

因和身濺然汗出而解也此四句申明小柴胡之功效如此所以諸證得之皆愈也 按少陽之外為太陽裏為陽明而少陽居其間故

也陽明中風脈弦浮大 而短氣腹都滿脇下及心痛此即 久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥此證又

一身面目悉黃小便難此二證又 有潮熱此似 耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯雖有

裏證邪仍欲外出 脈但浮無餘證者與麻黃湯但浮無餘證則裏證全無必從汗解故用麻黃湯 此二條明陽明中風

加嘔者不治論中陽明篇云陽明病不能食攻其熱必瀉所以然者胃中虛冷故也虛冷二字尤明蓋陽微欲瀉也又云大吐大下汗出

腹滿故本太陽病不解轉入少陽者 此為傳經 脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱以上皆少 尚未吐下脈沈緊者未

下不經誤治也少陽已漸入裏故不與小柴胡湯 嘔而發熱者小柴胡湯主之但發熱而非往來寒熱則與太陽陽

十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脅痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯解見麻 傷寒差以

後更發熱者小柴胡主之此復證也非勞復非女勞復乃正氣不充餘邪未盡留在半表半裏 脈浮者以汗解之脈沉實者以

傷寒類方 柴胡湯

傷寒類方 柴胡湯

下解之復證之中更當考此二脈如果脈見浮象即邪留太陽當用汗法如脈見沈實則裏邪未盡甚用下法但汗下不著方名者因汗下之法不一證者於麻黃桂枝皮承氣大柴胡等方對證之輕重擇而用之則無不中病矣 婦人中風七八

日續得寒熱發作有時此即下文所謂經水適斷者此為熱入血室其血必結而成瘀矣 故使如瘧狀發作有時小柴

胡湯主之即以治瘧之法治之 又云婦人中風發熱惡寒經水適來此云來得之七八日熱除而脈遲身涼 胸脅下滿

如結胸狀識語者此為熱入血室也血室為中焦榮氣之所聚肝臟血心主血榮血結滯則肝氣以心經之氣亦凝故腦滿而神昏識語 當刺期門隨其實而瀉之期門在乳下第二肋端去

乳頭約四寸肝募也厥陰陰維之會刺入四分血結則為有形之證過期一時難效刺期門以瀉厥陰有餘之氣期尤親切而易散 又云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則識語如見

鬼狀者此為熱入血室晝清而夜昏者血室屬陰病在陰經也 無犯胃氣及上二焦必自愈此為中焦榮氣之疾汗下二法皆非所宜小柴胡湯刺期門則其治也 按熱入血室之狀此二條為最詳婦

人傷此證最多前條證稍輕後二條證尤重男子亦有之 大柴胡湯小柴胡去人參甘草加枳實芍藥大黃乃少陽陽明合治之方也

柴胡半斤 半夏半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 生薑五兩 枳實四個 大棗十二個 右七味以水一升一斗二升煮取六升

再煎取三升溫服一升日三服 此方本有大黃二兩王叔和云若不加大黃恐不為大柴胡也

太陽病過經十餘日反二三下之一誤後二三日柴胡證仍在者如寒熱嘔逆之類 先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱

微煩者猶有為未解也與大柴防湯下之則愈前雖已下非下法也 傷寒十餘日熱結在裏此大黃對證 復往來寒熱柴

初之與大柴胡湯 傷寒發熱汗出不解當用柴胡心中痞硬嘔吐而下痢者 此湯主之 傷寒後後者過

對證而輕而脈沈沈者內實也沈為在裏下解之宜大柴胡湯 柴胡加桂枝湯此小柴胡與桂枝湯併為一方乃少陽太陽合病之方

柴胡四兩 黃芩二兩 人參二兩 桂枝二兩 芍藥二兩 生薑各一兩 半夏半升 甘草一兩 大棗六枚 右九味水七升煮取三升

去渣溫服一升

傷寒六七日發熱微惡寒支節疼痛以上太陽陽證 微嘔心下支結以上少陽陽證 外證未去者太陽證為外證 柴胡桂枝湯主之 發汗

多亡陽譫語者此亡陽之輕者也 不可下勿誤以為有燥屎 與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈桂枝湯和榮衛柴胡湯通津液深著二湯合用之功

試讀未完 需要全本請在 線 購 頭 試 讀 完 本 請 在 線 購 頭