

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

普濟方卷三

周王朱橚撰

霍亂吐瀉

霍亂吐瀉

夫霍亂欲死者其氣取而邪氣盛也或邪氣暴爭而未止利或止利雖極而邪氣盛故真氣為之困乏其煩渴滿口逆自汗脈微者絕者是也此由陰陽痞隔不得升降內經所謂出入不順則神機化滅升降息則

氣立孤危

方

赤茯苓湯

出聖惠方

治霍亂吐痢不止腹痛轉筋煩悶欲死

赤茯苓

去黑皮

五味子

各半兩

藿香葉

半兩

黃耆

切

當歸

切白朮

炒各一分

乾木瓜

人參

各一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候再服

治霍亂困篤不識人方

出聖惠方

用雞蘇三兩剉以水三大盞煎至一盞半去滓分溫
三服

治霍亂頭旋倒欲絕方

用陳橘皮二錢湯點灌之取磚燒熱沃醋其上布厚

裹熨心下便活又治轉筋

胡椒湯

出聖惠方

治霍亂煩悶欲死

胡椒

三十粒

雞屎白

半合微炒

高良薑

剉

桂心

各半兩

木瓜

乾者

麥門冬

去心焙各一兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不拘時候溫服

阿魏丸

出聖濟總錄

治霍亂不止下痢氣腹滿脹悶欲死者

阿魏

研青橘皮

湯浸去白焙各一兩

酸榴皮

五味子

各半兩

陳麴

炒一兩

右先搗後四味細羅為末與阿魏同研令勻用糯米糊丸如梧子大每服二十九溫熱水下如脚轉筋絕甚者研開溫熱水調下

附子散

出聖惠方

治霍亂吐瀉欲垂絕者

附子

一兩炮去皮臍

乾薑

半兩炮製剉

甘草

二分炙微赤剉

桂心

三分

右搗篩為散每服三錢匕水一中盞煎至六分不計

時候溫服

生薑散治霍亂吐不止欲死

生薑

二兩切焙

陳橘皮

湯浸去白焙

乾木瓜

各一兩

右為散每服二錢以水調下連三五服

雄雀糞散

出聖濟總錄

治飲食傷飽取涼過度霍亂脹滿

欲死及上下不通用雄雀糞二十一粒研細用煖酒
半盞調服未效再服

生薑飲

出聖惠方

治霍亂吐下不止欲死

生薑

五兩牛屎一升

右切薑以水四升煎取二升分溫服

治霍亂醫所不能治秘方

出千金方

用童女月經衣合血燒末方寸調匕百方不瘥者用
之

活命散

出護命方

治一切男女并小兒上吐下瀉霍亂不止面

色青黑命欲臨死宜服此

防風

羌活

獨活

乾薑

細辛

各一分

草豆蔻

肉豆蔻

芎

各半兩

官桂

去皮半分

吳茱萸

乾木瓜

各一兩

兩

右杵羅為末每服五錢濃煎木瓜湯空心調下和滓

喫

霍亂心腹痛

附論

夫霍亂者由脾胃虛弱客風冷之氣陰陽不和致水穀相併清濁莫分變亂於腸胃之間令人心胸煩懊悶亂不安因名霍亂然邪氣上干於陽絡之間則心痛而嘔吐下搏陰經則腹痛而瀉痢故謂之霍亂心腹痛也

方

沉香丸

出聖濟總論

治霍亂心腹疴痛

沉香

丁香

犀角

鎊

枳實

去穰
麩炒

肉豆蔻

去壳
炮用

木

香

莪朮

炮各半兩

胡椒

一分

檳榔

剉四枚

乳香

研

沒藥

研各半兩巴豆去皮心麝香研各一錢

右搗前九味為末與巴豆沒藥乳香麝香和令勻糯
米粥為丸如菜菔子大每服五十丸生薑橘皮煎湯
下加至十丸

抵聖散出聖濟總錄治霍亂宿食不消心腹疴痛

厚朴去粗皮塗薑汁炙四兩白朮二兩高良薑半兩吳茱萸湯浸焙乾

炒一兩枳殼去瓢麩炒一兩人參白茯苓去黑皮甘草炙剉木

香陳皮去白焙草豆蔻去皮

右搗羅為散每服二錢以沸湯調下不拘時

附子散

出聖惠方

治霍亂虛煩吐瀉轉筋冷汗出腹中痛

附子

炮製去皮臍

草豆蔻

去皮

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

歸

剉微炒

乾薑

炮製剉

桂心

各半兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓

不拘時候溫服

人參散

出聖惠方

治霍亂吐瀉心腹痛四肢不和

人參

去蘆頭

白朮

赤芍藥

甘草

炙微赤剉

當歸

切微炒

赤茯苓 肉豆蔻 桂心 以上各半兩 乾薑 一兩炮製

右搗為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不

拘時候溫服

縮砂蜜散 出聖濟總錄 治霍亂心腹冷痛嘔逆惡心大腸滑

瀉

縮砂蜜 去皮炒 陳麴 炒 白朮 切炒 乾薑 炮 龍骨 赤石

脂 吳茱萸 湯浸焙用 芎藭 芍藥

右等分搗羅為散每服二錢以熱米飲下不拘時

候

肉豆蔻散

出聖惠方

治霍亂吐瀉不止冷氣入脾胃攻心腹

切痛

肉豆蔻

去壳

白朮桂心

枇杷葉

去毛炙微黃

吳茱萸

湯浸七次焙乾微炒各半兩

高良薑

三分剉

甘草

一分炙微赤剉

厚朴

一兩

去粗皮塗薑汁炙令香熟

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓

不拘時候溫服

高良薑散

出聖濟
總錄

治霍亂吐瀉不止心腹疔痛煩渴

高良薑

剉炒
二分

肉豆蔻

去
壳

吳茱萸

湯浸焙
乾炒

人參

蒼

木

米泔浸
宿剉炒

麥門冬

去心
焙

訶梨勒皮

陳橘皮

右搗為散每服三錢匕米飲調下不拘時候服藿香

正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂心小便不利

加車前子每料各一兩一方有茯苓無車前此藥溫

散風寒濕氣若暑證加香薷

厚朴人參湯療霍亂心痛煩嘔吐不止

厚朴

四兩炙

橘皮

人參

各二兩

高良薑

當歸

霍

香

各一兩

右以水七升煮取二升半絞去滓分溫三服各相去

如人行六七里忌生冷粘膩

理中加二味湯

出十便良方

治霍亂胸滿腹痛吐下

人參

乾薑

炮

白朮

各三兩

當歸

甘草

炙

芍藥

各一兩

兩

右以水七升煮取三升絞去滓溫服一升日三

夜一良忌海藻松菜

溫中湯出聖濟總錄治霍亂吐下虛煩不止心腹絞痛

人參 乾薑炮 白朮 甘草炙 當歸切

右等分粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫

服不計時候

厚朴湯出聖濟總錄治霍亂心腹痛煩不止或嘔

厚朴去粗皮 桂皮去粗 枳殼去瓢 芍藥 檳榔剉

一兩

右搗篩每服三錢以水一盞入薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

桔梗湯療霍亂食不消腸鳴腹痛熱不止

桔梗四兩白朮五兩乾薑各二兩茯苓各二兩倉米一升

右切以水八升煮倉米熟去米將汁煮藥取二升絞

去滓分服忌桃李雀犬肉酢

理中丸出十便良方治霍亂嘔吐心腹疼痛

高良薑切白朮各一兩桂皮去甘草炙各半兩