

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第三百八十四卷目錄

醫部彙考三百六十四

外科總論疔毒門六

方一

外科總論疔毒門六
方一
治喉喉心逆發熱而咽喉沉而實腫不問而皮
色不變根脚深大病因在內膿結凝滯當急疎利
之
黃連 芍藥 當歸 檳榔 木香 黃芩
梔子 薄荷 桔梗 甘草各一兩 連翹二兩
右除檳榔木香為末外並剉碎服一兩水一盞半
煎一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再煎二
錢以利為度如無熱證止用復散時時啞之如此內外
皆通寒衛和調則經絡自不凝滯矣
內托復散散
治膿於外根盤不深形證在表其脈浮痛在皮
內恐邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏
地骨皮 黃芩 防風各二兩 桂五錢 芍藥
黃芩 白朮 茯苓 人參 甘草 當歸
防己各一兩
右咬咀先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼
朮人參藥十二味再煎至三四盞取清汁作
三四服終日服之又煎蒼朮湯為湯去滓再休煎
前十二味藥湯服之此除濕散熱健脾胃氣和乎
如或末已再作半料服之若大便乾及煩熱少腹
黃連湯如微利煩熱已退即服復散半料如此
使榮衛俱行邪氣不能內侵也
當歸黃芩湯
治瘡瘍膿路已行而痛不可忍者
當歸 黃芩 生乾地黃 川芎 地骨皮
芍藥各半錢
右咬咀水煎服
如發熱加黃芩
如煩燥不能睡臥加梔子
如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮
右三方乃易水師弟治瘡之三法今特列於篇首
而以古今諸方屬列於後臨病之工詳審脈證而
施用之庶乎可以無失矣
托裏養榮湯
治癰疽疔腫及無名腫毒
桂枝七分 人參 黃芩 紅花 歸身 木
柴胡 連翹 當歸身 羌活 黃芩 防風
甘草炙各一錢
右作一服水一鐘煮一鐘煎至一鐘食前服
加味當歸飲子
治諸瘡瘍痛腫瘰癧瘡屬心火火鬱則發之
當歸 生地黃 升麻各五錢 防風二錢五分
荆芥穗 何首烏各二錢 柴胡 白芍藥
川芎 羌活 黃芩各二錢 紅花 蘇木
甘草各一錢
右咬咀每服五錢水一盞生薑三片煎至八分食
遠服沐浴取微汗效速使血氣流通和服之應效
人參敗毒散

醫部彙考第三百八十四卷

醫部彙考三百六十四

外科總論疔毒門六

方一

外科總論疔毒門六
方一
內疎黃連湯
治喉喉心逆發熱而咽喉沉而實腫不問而皮
色不變根脚深大病因在內膿結凝滯當急疎利
之
黃連 芍藥 當歸 檳榔 木香 黃芩
梔子 薄荷 桔梗 甘草各一兩 連翹二兩
右除檳榔木香為末外並剉碎服一兩水一盞半
煎一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再煎二
錢以利為度如無熱證止用復散時時啞之如此內外
皆通寒衛和調則經絡自不凝滯矣
內托復散散
治膿於外根盤不深形證在表其脈浮痛在皮
內恐邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏
地骨皮 黃芩 防風各二兩 桂五錢 芍藥
黃芩 白朮 茯苓 人參 甘草 當歸
防己各一兩
右咬咀先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼
朮人參藥十二味再煎至三四盞取清汁作
三四服終日服之又煎蒼朮湯為湯去滓再休煎
前十二味藥湯服之此除濕散熱健脾胃氣和乎
如或末已再作半料服之若大便乾及煩熱少腹
黃連湯如微利煩熱已退即服復散半料如此

使榮衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃芩湯

治瘡瘍膿路已行而痛不可忍者

當歸 黃芩

生乾地黃 川芎

地骨皮

芍藥各半錢

右咬咀水煎服

如發熱加黃芩

如煩燥不能睡臥加梔子

如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

右三方乃易水師弟治瘡之三法今特列於篇首

而以古今諸方屬列於後臨病之工詳審脈證而

施用之庶乎可以無失矣

托裏養榮湯

治癰疽疔腫及無名腫毒

桂枝七分 人參 黃芩 紅花 歸身 木

柴胡 連翹 當歸身 羌活 黃芩 防風

甘草炙各一錢

右作一服水一鐘煮一鐘煎至一鐘食前服

加味當歸飲子

治諸瘡瘍痛腫瘰癧瘡屬心火火鬱則發之

當歸 生地黃 升麻各五錢 防風二錢五分

荆芥穗 何首烏各二錢 柴胡 白芍藥

川芎 羌活 黃芩各二錢 紅花 蘇木

甘草各一錢

右咬咀每服五錢水一盞生薑三片煎至八分食

遠服沐浴取微汗效速使血氣流通和服之應效

人參敗毒散

人參 獨活 柴胡 桔梗炒 枳殼炒 羌活 茯苓 川芎 前胡 甘草各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎一鍾服後服內托復煎散

郭氏神效烏金散

治癰疽疔瘡痔毒附骨疽惡瘡等證若瘡黑陷如石堅四肢麻痺或時昏眩瀉語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡是

蒼耳頭端午午煎收 草烏頭 大麻頭火日收 木賊去節 蝦蟇頭 樺皮斷酥炙 麻黃去根節

右藥各等分同入磁器內鹽泥固濟炭火內從早煨至申分如無煤火為度煨為末每服二錢病重者三錢用酒調下未汗再一服如汗乾却服解毒利之藥如修合此藥必遇天晴好日於靜室中勿令雞犬貓畜及陰人見之又名百功元聖散

奪命丹

治諸般癰毒疔瘡惡瘡

蟾酥 輕粉各五分 朱砂三錢 白礬枯

寒水石 銅綠 乳香 沒藥 麝香各一錢 蟾牛二十一粒另研

右件為細末將蟾牛另煨一處如丸不就用好酒煎馬九如蟾豆大每服一丸生急三五重嚼極爛吐於手心包裏在內熱酒和急送下如重車行五七里汗出為效重者再服一二丸

蟾酥丸

治疔黃一切惡瘡

川烏 蓮花蕊 大朱砂各一錢半 乳香 沒藥各二錢 輕粉 蟾酥各一錢 麝香五分

右為細末糊為丸豌豆大每服一丸病重者三丸依前法服取汗

右三方郭氏稱為首葉皆主手發散皆出太陽側後二方出少陰側然皆切劑也智者當較輕重陰陽之分取擇用之

寸金丹 二名返魂丹 三名再生丹 四名追命丹 五名延壽丹 六名來回丹 七名却命丹 八名得道丹 九名勿示此方若有患瘡身未調者與三四服之瘡下便活如口噤但開牙關調化三四服下喉中立生此方治發背癰疽腫痛偏身附骨腫痛先覺時飲水口中候渴發熱四時沉重腫壯熱

麝香一分 南乳香 烏金石 輕粉 雄黃 狗寶 沒藥各一錢 輕粉 黃蠟各三錢

蟾酥二錢 金頭蜈蚣七條全者酥炙 頭首男孩兒乳一合

右件為細末除黃蠟乳汁一味熬成膏子同和丸如菽豆大小小兒丸如芥子大每服一丸病重者加至三丸白丁香七箇研爛新滾水調送下用衣服蓋之睡勿令透風汗出為度大發後痛如無煩瘡腫不遇三服立效服藥後喫白粥瓜菜就避大炒

烏金散

治疔毒癰瘡

牙皂四分 人言製 蟾酥 麝香各五分

血餘蝦蟇 蛇蛻蝦蟇 落蜂房各一錢 蟾蛇酒洗 血竭 乳香 礞石炒去綠各二錢 本蟾三錢湯泡七次 辰砂研水飛 雄黃

穿山甲炙黃各一錢半 天龍四錢酒炙去頭足 川烏尖 沒藥

右各為細末科學分兩和勻每服二分赤砂地調影頭酒送下取汗為度

奪命丹 治證同前

輕粉 麝香 白蛇製各五分 蟾酥一錢 雄黃 辰砂 乳香 沒藥 血竭各錢半 金蟾泡炙

天龍去頭足 穿山甲炙各一錢 蟾蜍炙五錢 右為細末和勻服法同前

奪命丹 治證同前

輕粉 麝香 白蛇製各五分 白蟻殼研 血竭各一錢 蟾酥酒化 銅綠 寒水石煨

乳香 沒藥 雄黃各一錢 蟾牛二十一粒連殼

右為末先將蟾牛研爛如泥勻和前藥為丸如來豆大辰砂一錢為末如丸不就加好酒打三五百下每服二九丸用葱白三寸與病者嚼爛吐於

男左女右手手心將藥丸塞入葱白用無灰酒三四盞溫熱送下蓋蓋取汗為度重者不過二服

內乳乳光湯

羌活 黃藥酒洗各二錢 防風 藥本 連翹 當歸各一錢 肉桂三分 甘草炙 蒼朮

陳皮各五分 黃芪一錢五分

右作一服酒一大匙水一大匙煎至一匙去滓煎服空心以夾被蓋覆其難使藥行能去之一服愈

托裏溫經湯
治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏中聚而

赤脈痛不可忍惡寒發熱或相引肢體疼痛

麻黃去根節 白芷 當歸各二錢 防風去蘆

葛根各三錢 升麻四錢 炙草 白芍各錢半

人參 蒼朮各一錢

右剉如麻豆大每服一兩水一盞先煮麻黃令

沸熱去沫再下餘藥同煎至一盞去滓大溫服訖

臥於暖處即以綿衣覆之得汗而散

當歸拈痛湯
治一切風濕無名腫痛下注濕毒脚膝生瘡

赤腫裏外腫痛腫水不絕或癢或痛脈沉實數

動滑者並宜服之

羌活 人參 苦參酒製 葛根 真牙木

升麻各二錢 黃芩酒製 茵陳酒炒

甘草炙各半兩 防風 當歸身 知母酒製

澤瀉 猪苓各三錢 白朮一錢半

右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服之

復散散
治癰疽發背

黃藥 黃芩 黃連 知母 生地酒洗各一錢

防己 山椒 羌活 黃芪 麥門冬 甘草炙

獨活 人參各半錢 當歸尾二錢 陳皮

防風梢 甘草梢生 蘇木 當歸身 五味子

猪苓 藥本 連翹 桔梗各一錢半

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓隨服上下食前後服

金針散
治發背諸瘡腫

星角針各取一分新採一半黑者

石一味不拘多少曬乾為末食後酒調二三錢服

精要十宣散

人參 當歸 黃芪各二兩 川芎 防風

厚朴 桔梗 官桂 甘草 白芷各一兩

右剉細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數

服以多為妙不飲酒者用水香薰煎湯下然不若

酒力之勝也許學士云此方得於都下異人濟苦

者不可勝數

十六味流氣飲
治無名惡腫癰疽等症

川芎 當歸 芍藥 防風 人參 木香

黃芪 官桂 桔梗 白芷 檳榔 厚朴

烏藥 甘草 紫蘇 枳殼

右咬咀水煎服

千金托裏散
治一切瘡腫發背疔瘡

黃芪一兩半 厚朴 防風 桔梗各二兩

連翹二兩二錢 木香不見火 沒藥各三錢

乳香二錢 當歸半兩 川芎 白芷 芍藥

官桂 人參 甘草各一兩

右剉細末每服三錢酒一大盞煎三沸和滓溫

服

托毒散
治癰疽初起高腫發痛不定喘急氣粗

附子一枚炮去皮尖 當歸 麻黃 甘草

官桂 川芎 羌活 石草 龍腦草

石九味等分為末每服二錢水一大盞薑三片鹽

少許同煎

聖濟射干湯
治癰疽發背諸瘡腫痛脈洪實數者

射干 犀角 升麻 元參 黃芩 麥門冬

大黃各一兩 山梔半兩

右咬咀每服五錢加竹葉芒硝一錢以利為度

托裏散

治一切惡瘡發背疔瘡便毒如發脈洪實數腫甚

欲作膿者服消盡

川大黃 牡蠣 苦蘆根 皂角針 研碎

連翹各三錢 當歸 金銀花各一兩 赤芍藥

黃芩各一錢

右剉細末每半兩水酒各半煎服

戒酒丹
治諸癰腫一切風熱瘡毒發熱多汗大渴便秘

語結胸之證

大黃二兩半生半熟 芒硝 甘草各二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸病重一丸至

二丸食後常使入酒半盞化服或白湯合酒化服

渴心渴

治瘡毒癰腫發背諸瘡腫痛脈洪實數者

博物志編纂術典第三百八十四卷醫部 外科雜論 瘡毒門

黃芩 蘇木各兩 犀角一兩

右咬咀每服三五錢水煎服

清涼飲

治瘧瘧煩燥冷瘧瘧瘧實大便燥結小便赤澀

大黃炒 赤芍藥 當歸 甘草各二錢

右水煎服

精製瀉瀉湯

黃芪生 蓮蘆 沉香 大黃 漏蘆各一兩

粉草半兩

石為細末每服二錢薑蜜湯調下

內消升麻湯

治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻 大黃各二兩 黃芩一兩半 枳實炒

當歸 芍藥 甘草炙各一兩

右咬咀水煎食前服

孫真人單煮大黃湯

脈實沉而數者食肉之輩大腸燥者詳審用之

錦文大黃酒洗去皮

右一味剉如麻豆大水煮服

宜毒散

治一切瘡毒其功不可盡述

大黃煨 白芷各五錢

作一劑水一鐘煎一鐘食前服

內托散

治諸瘡毒惡瘡一服立愈

大黃 牡蠣各半兩 苦薤二枚 甘草三錢

右炮每服三錢水一大碗煎七分去滓溫服

軍驚散

治癰疽初發癰腫或少年癰瘰癧背等急宜直毒

利下熱退高度大人小兒四至皆可服之

紫背煎散 一雙鹽洗固火火燒過紅置地上出去火

毒用 輕粉 甘草各二錢 大黃五錢 黃芩

漏蘆去漬 瓜瓠各半兩

右為末每服二錢薄荷湯下連利酒亦可

內消丸

治瘰癧初生及癰瘰癧核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉 皂角不蛀者水浸至軟二味煎濃膏

牽牛取頭末各半斤 青皮 陳皮各一兩

沉香半兩 廣木炮 京三棱炮各三錢

右為末入牽牛頭末用煎膏和丸如豇豆大每服

三十九粒連湯送下食後

神仙解毒萬病丸

一各追毒丸一名玉樞丹一名紫金錠治一切毒

及瘋子鼠耳疔瘡金疔或喉症死牛馬河豚等毒

或時行瘟疫山嵐瘴氣惡寒閉鬱腹痛風濕腫

赤服及傷風寒暑熱毒上攻或白癰或癰水或打

撲傷損壞損傷骨痛腫痛火或蛇蟲大風所傷或

中邪狂走鬼胎鬼氣重宜服之居家出入不可無

此藥真濟世也食身之寶

文給三兩用淡紅黃水者炮淨洗淨

山慈姑二兩 續隨子去殼研以紙包壓去油再研

一兩 紅芽大黃洗淨一兩五錢 麝香三錢研

右各另為細末和勻以糯米湯和合於木臼中杵

千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合平

欲忌用辰日亦得勿令婦人孕服不具足人及鷄

犬之類見之合宜珍重否則無效

如癰疽發背未破用冷木磨塗瘡處并服良久覺

除癰

除癰 毒瘡寒心悶打語胃弱理瀉毒未發及

癰疽山嵐瘴氣經脈風冷入水海新一葉同研下

急中顛倒喘叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下

自凝或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿

者並冷水磨服下

蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處如戰戰或迷悶

者更宜服之諸般瘡疾不問新久臨發時煎桃柳

枝湯下

小兒急慢驚風五疳八痢寒水薄荷一葉同磨下

牙關緊急磨一錢研內服量大小用之牙痛酒

磨塗及含少許合下

湯火傷凍凍瘡瘡毒

打撲傷損炒松節湯下

年深日久頭痛太陽疼用酒入薄荷磨紙花貼太

陽穴上服之

諸般瘡疾口眼歪斜服目擊吃夜多睡遠言語

遲卒中風口噤牙關緊急筋脈牽掣骨節風腫手

腳疼痛行步艱難一應風氣疼痛並用磨下有

孕婦不可服

郭氏瑞效丸

治婦人經閉內積家治男子婦人橫痃瘰

當歸 京三棱 檳榔 木賊 山甲炒各一兩

牡蠣為末炒山甲用 連翹 枳殼各一兩半

砂砂 琥珀各一兩 巴豆二十一粒去油

磨香少許

右為末酒糊為丸桐子大每服十九至三十丸
溫酒下臨臥再服如利斷厥脈減九數大小便有
膿血出者即用別藥調治之

萬靈奪命丹

又名延壽濟世膏治一切瘡癰疔疽初起腫沉黃
及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之

朱砂 鹽花各二錢半 雄黃 明礬生用
楓香各二錢 赤石脂 黃丹飛過 琥珀

真輕粉各一錢五分 巴豆去殼水煮十沸
煎麻子另研各七箇 麝香 片腦各一錢

右為末用巴豆煎麻子膏和藥為丸如和不就加
煉蜜或成膏或磁器內如用時旋丸大每服
一丸并單水下或湯亦得忌熱物半日大小兒
以意加減服服

一粒全升

治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香 木香 乳香各五分 巴豆霜一錢半

各為細末照伴分數和勻用黑肥泥一箇半去皮
搗爛為丸如芡實大每服一丸鹽人虛實呷水

一口行一次胃氣壯實者只可呷水 四口不可
太過復呷水一口送藥下打盡數次以米飲清之

威靈仙飲

生威靈仙不拘多少為末

每服一錢空心溫酒調服逐日微利為度

五香連綿湯

治諸瘡癰初覺一二日便服連綿散寒發熱
沉香 木香 麝香 丁香 連翹 射干

升麻 獨活 桑寄生 甘草炙各一兩 乳香
木通各二兩 大黃一兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎七分溫服取利
千金漏蘆湯

治癰疽疔瘡惡肉時行熱毒赤瘡
漏蘆 連翹 黃芩 白朮 枳殼 升麻
粉草 麻黃 朴硝各一兩 大黃一兩半

右除粉外每服一錢水一盞薑二片薄荷三葉同
煎溫服取利為度

防風通聖散

治時毒熱毒便裏熱燥苦時毒發傷之復胃氣弱
損者須常警察升大瀉大實不用

防風 當歸 川芎 芍藥 大黃 芒硝
連翹 薄荷 麻黃 桔梗 石膏 黃芩

滑石各一兩 白朮 山梔 荆芥各一錢五分
甘草二兩

右水煎服或為太白湯調下仍量人虛實

中和湯
治瘡癰瘡除甘湯似瀉非瀉似難非難此因元氣
虛弱失於補托所致

人參 陳皮各一錢 黃芪 白朮 當歸
白朮各一錢半 茯苓 芍藥 皂角刺炒

乳香 沒藥 金銀花 甘草煎各一錢
右水煎各半服

內托散

一名度心散一日至二日內宜連進十數服
煨薑豆粉二兩 明乳香半兩慢火於銀石礬中炒

手搗攪便乾乾出細粉研細
右研令勻每服二錢至三錢鹽煎甘草湯調下時

時雖嘔噦藥常在胃脘間若毒心有毒逆之證
大宜服此如有寒而嘔逆不宜服此當用辛熱

國老行
治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可
具述

甘草大者一斤
右搗碎河水浸一宿候令藥汁濃去盡筋滓再用

細漚過銀石器內慢火熬成膏用礬收之每服一
二匙無火酒或白湯亦可會服藥毒刺者亦解

之本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云
一二匙恐力少也

解毒散
治癰疽如覺便宜服

正角脂 升麻 升麻 赤芍 木通各一兩到

石膏二兩 元參 麥冬去心 甘草生到各半兩
右每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服無時

清心肉肉金粉散
又名金花散

辰砂另研 白茯苓 人參 甘草各七錢半
藥豆粉四兩研 白豆蔻仁 升麻另研各半兩

雄黃研 腦子研 麝香研各一錢半
右以參各白豆蔻諸藥為末入研藥合勻每服一
錢半溫酒調下無時服此藥專治惡瘡熱毒瘡

作渴煩躁此藥解毒

內追毒丹

清心解毒散

大朱砂 雄黃 生龍角 琥珀已上並別細研

黑魚沉香各五錢 麝香一錢

右為末煉蜜丸梧子大每服一二十丸燈心薄荷湯下

傷暑散

治癰疽疔瘡血滯氣凝而致者

香附子去毛全澤以生薑汁洗一宿焙乾研極細

右無時以白湯調一錢服之又云治疔多因惡氣

得之若有此症心多愁煩服香附連食氣自有效

透心酒

治一切癰疽疔瘡毒候沒有死血陰毒在中

則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傳之即不痛或通熱在內熱過人手不可近

傳之必清涼或氣虛血弱清而不效若七情內鬱

治之必愈

遠志不以多少泔浸透去心乾為末

酒一盞調末三錢酒清飲之以清傳於心也

升香散

升香諸氣宜利三焦導導導發散邪熱治陰陽

之氣鬱結不消諸熱毒腫痛結核或似癰癤而

非使人頭痛惡心誠熱急

水香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

右剉散每服一錢水一盞半煎食後溫服

忍冬酒

初發便服此或食之中或居鄉僻田天野老自

發百中

忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和

得所發得四圍中心留一口又取五兩用木槌搗碎

不犯鐵器 甘草生剉一兩

右二味入砂瓶內用水二碗文武火煎至一椀入

好酒一大椀煎十數沸去渣分爲三服一日連夜

進盡病勢重一日夜可一劑

生地散

治發熱熱毒疼痛心神煩悶

生地黃二兩 川大黃剉碎炒 用升麻 黃芩

地骨皮 當歸剉微炒 木通 赤芍藥 黃芪

元參 甘草生各一兩 赤茯苓一兩半

右爲散每服四錢水一中盞入竹葉一七片煎至

六分去滓不拘時溫服

阿膠散

明阿膠炒如珠 粉草各一兩 橘紅半兩

右散酒分作三服以水一盞煎七分去滓溫服

牛膠飲

鼓譟拍忽毒發陰虛服之使毒氣不攻於內

牛膠通明者四兩

用酒一椀入膠內重湯煮透攪勻傾出更浸酒

隨意飲能飲者以醇爲度此方活人甚多

黃芩丸

服過一兩已上無不取效或止或痛不得就醫治

人不可勝數

白礬一兩 黃蠟半兩

右和九如桐子大每服十九丸漸加至五十九丸溫酒

送下如未破即清已破即含一日服百粒則有效

能防毒氣內攻尤能護脫胎終須服生片瘡愈後

服之尤佳

托裏消毒散

治胃氣虛弱或因鬼伐不能清散服之未成即消

已成即潰爛內自去新肉自生老腐肉既潰而新

肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬血虛者

四物湯爲主氣血俱虛者十全大補湯爲主兼忌

寒涼消毒之劑

人參 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌 芍藥炒

川芎 白朮炒 白茯苓各一錢 金銀花

白芷各七分 甘草炙 連翹各五分

右水煎服

托裏散

治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發

熱者宜用此神效其屬六淫七情及諸般難癒之

邪而爲患者皆各審其因而參以主治之劑其屬

胃氣虛者當以六君子湯爲主

人參氣虛者多用之 黃芪炒各二錢 白朮炒

陳皮 當歸 熟地黃自製 白芍藥酒炒

茯苓各一錢半

右水煎服

散毒散

治癰疽初覺腫結未成者可以消散

黃芪二兩 甘草炙 天羅生 山藥炒各一兩

爲細末每服二錢不拘時溫酒調服
化毒爲水內托散
凡患癰疽發背對口瘰癧乳花百種無名無頭

又此藥能令內消去毒化為黑水從小便出萬不失一此方不可秘藏不可輕視實之寶之乳香 穿山甲 白芨 知母 貝母 半夏 金銀花 皂角刺 天花粉 各一錢

右以咀用無灰酒一椀煎半椀去粗作一服溫進不宜加減將粗搗爛加秋過芙蓉葉細末一兩以滾水調過一宿自消不必用第二服忌發物大效仙方法命飲

又名真人活命散治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也 蒲乳香研 防風 白芷 貝母 赤芍藥 當歸尾 明沒藥研 角星刺炒 天花粉 甘草節 山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各三錢

在背脊見角刺為君在腹裏白芷為君在臂大加苦薑仁二錢在四肢金銀花為君如疔瘡加紫河車草根三錢如無亦可右為粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾煮小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去粗作三次服接連不斷開露上下服能飲酒者服藥後再飲三五盞此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒器服後倒脾胃痛定同生神功浩大不可慮度

保安方 治瘡托裏或已成者速潰 苦薑新者一枚去灰焙 沒藥通明者一錢研金銀花 甘草 生薑各半兩

右為細末用好無灰酒三升於銀石罈內煎至一

升分作三服三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此 秘方托裏散 治一切瘡毒始終常服不致內陷 苦藥大者一枚 當歸酒拌 黃芪鹽水拌炒 甘草 白芍藥各一兩半 皂角刺炒 金銀花 天花粉 熟地用生者酒拌入瓷器裏半日各一兩用無灰酒五茶鍾煎藥五兩入瓷器內厚紙封口再用油紙重封重湯鍋內煮用蓋覆之煮至藥香取出分服愈至痊癒

秘方托裏散 治一切瘡毒始終常服不致內陷 乳香 沒藥 穿山甲炮 當歸 木鼈子 連翹各一錢 苦薑實八錢 甘草炙五分 牙星角炒 貝母各七分 大黃生熟各一錢半 忍冬藤二錢 作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾食前服

歸芪湯 治癰疽無頭包腫痛 黃芪 當歸 苦薑仁 皂角刺 金銀花 甘草各一錢 右投咀水一鍾牛煎八分去滓入乳香酒再煎服

集毒透毒湯 又治通疽散又治何首烏散 何首烏不犯鐵 當歸 木通去皮尖 赤芍炒 白芷不見火 茴香炒 木藪炒 甘草 陳根松脂炒若惡心加薑汁炒

右方止此九味各等分酒水酒湯便隨用之酒水相半亦可惟洗汗加獨活每服四錢病在上食後服病在下食前服 流痰交加散

治發背癰疽發背癰疽乾乾研為細末 罌粟殼去灰換節制燥乾為細末 甘草用濕紙裹煨乾為細末 皂白乳藥藥末去麝香乾乾為細末 川芎濕紙裹煨乾為細末

右什藥末各另包收石磨加減用之 如神托裏散 治發背等瘡初起又治疔瘡并一切腫毒及發散傷寒 蒼耳草根 桑白草根 金銀藤用花亦可 五味子根各等分

右投咀每服五錢用生白酒一盞煎至七分去粗服臥臥取散汁吞內煎 前鋒正將 治一切癰疽不問發背發疔作瘡疼痛其效如神 刺芥 薄荷 山蟬心 老公頭 天花粉 蘇片 蘇葉 敗血心 川白芷 赤芍藥 蘇牙兒前切炒已上各等分 淮烏大者一箇衆

紅內消倍其數 甘草每十五文入一文薑醋加用右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調服效如神經日不見效忌忌是涼藥濕血可加當歸

无活如熱毒黃酒調乳藥加當歸藥研汁調其

餘從只用半下或麥門冬去心煎湯亦可但較緩

引兵先鋒

凡用內消先用薑湯溫潮上湯解熱以升麻葛根湯去散後服此

木通 羅葵 荊芥 薄荷 白芷 天花粉

甘草 赤芍藥 麥門冬各去心 生乾地黃

山梔子 車前子 連翹各等分

右到每服二錢燈心生地黃煎湯加淡竹葉煎

溫服上屬食前下屬空心老人氣虛者宜加當歸

羌活

加味十奇散

主內寒治癰發已成未成服內消藥三五日不效

或至四十已上氣血衰弱成者連服未成者連散

服至瘡口合而止內能固脫去舊生新又各固聖

元降

當歸酒浸 桂心不見火 人參 土芎 桔梗

香白芷 防風去蘆 犀角去粗皮薑汁炒

甘草五文 乳香 沒藥并研研

右件藥各等分研為末每服二錢酒調日三服病

愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯

稀發散

治癰疽發背及一切瘡毒等證如神

稀發草其葉長如牛舌其氣如豬臭者

五爪龍即五藤 生大荔

右四物各等分細研用酒和勻濾去粗服一椀得

大汗通身而愈

團藥

五倍子炒一兩 天南星 草烏頭 黃藥

白及各二兩

右為細末調如糊隨血團匝如牆壁可移陰處於

不論急如神

敷藥

白薇 白芷 天南星 白芨 貝母各等分

右為末水調傅外用團藥束定內用傳藥提起制

之有連

將軍錢散膏

治諸惡毒赤紅腫突起用藥掃瘡四圍不令滋蔓

走疔毒氣

鹽霜白梅 南星 人黃 蒼耳根各一兩

白芨 白薇 防風 川烏頭各半兩 草烏頭

雄黃各二錢

右為末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如

乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵線塗上止重

瘡若突突如藥乾以翎羽蘸水掃之日換三次

大妙

又方

治一切癰疽腫毒

草烏 貝母 天花粉 南星 芙蓉葉各等分

右為細末醋調搗四圍雷頭出毒如乾以酢酒之

正鐵線散

貝母去心 白芷 蒼耳草灰酢拌攪乾各一兩

或加龍計一錢九妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

大鐵線散

芙蓉 豬苓皮 木槿子各四兩 白芷 黃藥

寒水石 赤豆 白薇 貝母各二兩 大黃

紫刺皮 白芨 真地黃 羌活去蘆各一兩

防風半兩

右為末涼水調團藥四時如肉脫去白芨白薇加

生地黃地榆用芭蕉油調傷熱甚者用三消散

水黃散

團藥膏

犀角屑 大黃 白芨 草烏皮尖 白薇

麝香 砂硝各等分

右為細末蜜醋調薄攤油紙上稍乾揭下再漆調

濕貼之即消

外用消毒藥

治諸腫毒堅硬不消

升麻 葛根 風濕子 地骨皮 金銀花

黃花地丁 甘草生各等分

右為粗末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四

時熱用冷則再投

團藥方

草烏 白芨 白薇 黃藥 砂硝各等分

右為末用蜜醋調團藥外即便敷起

神白膏

貼五發未破

南星 大黃 草烏 白薇各半兩 蚌粉

大柏皮 赤小豆各一兩

右為末取皂莢頭研取油調角四時加乳沒尤妙

雄黃散

治癰疽發背瘡疼痛不止
粟米小粉三兩炒 草烏頭 南星 絡石
百合各一兩 白芨 二兩 乳香 沒藥 雄黃
黃丹各半兩

右爲極細末溫水調敷之

鐵并欄
治無名腫毒或背疽腫痛

芙蓉葉重陽前收研末 著耳端午前收燒灰存性
右同研細以蜜水調敷之

局龍膏

一名局金散治一切癰毒癰疽收亦並
木麝子去殼切 半夏各二兩 小粉四兩
草烏頭半兩

右於鐵鍋內慢火炒令糖焦爲細末出火毒再研
以水調稀稠得所敷諸四圍中留頂出毒氣或用
酢調亦得

宜毒散

初發或發後敷貼消腫散毒團聚
露蜂房三兩炒焦 南星 赤小豆各半兩
小米一合 生草烏二錢半 生白礬半錢

右爲細末用淡酢調塗四畔乾即再上

拔毒散

癰疽腫痛通用能散膿
南星上等大白者一兩 草烏頭 白芷各半兩
木麝子仁 一錢研

右爲細末分兩法酢入重調敷貼之

銅毒散

治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿
天南星一兩 貝母七錢半 白芷 赤小豆
直搗蜜炒各半兩 雄黃一錢

右爲細末初用酢調敷後用蜜水調敷

思毒散

癰疽通用
木麝子去油 天南星 半夏生 赤小豆
白芷 草烏連皮尖各等分

右爲細末硬調法酢調敷熱熨則蜜水調敷
神功妙貼散

塗敷數層量內使膿血化爲水出散毒
大南星圓白者 蓖麻子仁各四錢 半夏生
白芷精 五倍子 蜜黃 貝母 白芨各三錢

沒藥 乳香各二錢 花藥石散一貼
右爲細末和井水入蜜調敷香色膠脂膏汁調

敷從量過抹收入果箇中間如錢大貼膏藥若癰
開大全用紗攤裹以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片

如瘡勢先貼藥上然後貼瘡久年蓮仰上竹葉亦
得竹葉出水煎藥以行之凡敷藥須是細末則不
痛

特異萬靈散

治癰疽發背瘡等患神妙
軟石膏燒通紅置覆在泥塊上一宿 大白南星
赤小豆 草烏連皮尖各半兩 乳香二錢別研

右爲細末蜜水調成膏從外抹收入膏最爲靈如
錢勿敷如瘡已成切忌入瘡口恐痛微痛排膿

不致潰爛散

治冷毒青硬無頭陰毒并瘡疥毒皆效
生鐵粉 輕粉各二錢 白松香一兩五錢
麝香少許

先將鐵粉松香爲細末入饅內加麻油一兩慢火
煎數沸離火待熱少退出輕粉麝香未攪勻即爲
膏矣收貯量於大小攤貼患處

隔皮取膿法

治諸般瘡毒

礬路甲細切炒 黃耆各一兩 白鹽半兩
草烏去皮四錢

右爲末水調作餅子慢火炙黃出火毒研末醋調
成膏用白紙攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

雄黃散

治癰疽赤腫疼痛未得潰潰貼之成膿
雄黃 黃藥 檳榔 川大黃 血竭各七錢半
麝香研一錢 黃連一兩 白芷 木香 芍藥
桂心各半兩 當歸炒三錢

右爲細末用雞翎調勻塗於網上貼腫處候
膿潰後即用膏藥搜膿生肌

萬應針頭丸

治一切癰疽疔毒等毒大瘡欲死者一粒即愈
麝香一錢 血竭如蠟者用散者不用 輕粉
蟾酥各試秤者 硃砂各三錢 片腦一錢

煨爛一對全用

右爲極細末煉蜜和丸爲劑如瘡有膿者用針頭

撲破微有血出將藥一黍米大致挑開藥內用
紙花周圍唾津貼緊上不過時刻即愈如兩腋
兒無頭落即是胎疔即將兩手虎口內白土絨用
針撲破如前法用藥封蓋忌雞鷄酒麪一切發
熱之物

萬能膏藥膏

治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒追膿
腹中痞塊貼塊上瘰癧貼大瘰及身柱其效如神
白松香淨者一斤 輕粉一錢 蓖麻子去殼
杏仁去皮各三百枚 乳香 沒藥各一兩五錢
銅青二兩

右共作一處用鐵錫木口於口中搗成膏如線少
加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛排
吊攤貼湯中燉不見火

四虎散

治發背初生筋脈緊急不舒

附子生去一兩 天南星 半夏 製毒各半兩

一方無附子有草烏各等分右為末熱酒調成膏
攤上腫處以熱絹縛定覺感處如火燒不妨

回陽玉龍膏

草烏頭三兩炒 軍薑二兩 白芷不見火
南星煨 赤芍藥各一兩炒 肉桂半兩不見火

此方治陰發背冷流注鼓椎風久損痛冷痺風濕
諸般氣冷痺紅赤者冷痺不痛者足頑癩癬婦
人冷血風諸陰證之第一藥也用熱酒調塗
洪貴丹

一名金丹又名寸金又名四寶散

天花粉三兩 蘇黃 白芷各一兩 赤芍藥三兩
右為末茶酒湯服隨證熱塗

金黃散

貼癰毒令內消
白芷 白及 白薇

右等分為細末新汲水調敷

天花毒露散

白及 白薇 白芷 白藜皮 砂硝

青黛 黃藥 老龍骨各一兩 大黃四兩

天花粉 赤露各二兩

右為細末酢漿調勻如疽毒未成則當頭毒退若
已成四面圍之中留頭用荳針膏貼之

治癰散

圍毒腫毒一切瘡毒並治

大黃 水仙子 山藥 苧根 苧露 小赤豆

寒水石 水蘊 香粉 花藥石

右將前藥搗和如乾加酢漿調勻如疽毒未成則
當頭毒退若已成四面圍之留一頭用荳針膏貼
之

神護膏

圍毒一切癰毒

小赤豆 黃皮 白薇 天花粉 天南星

白芷各等分

右為末陰用米酢與蜜水調用荳粉棧亦用芭
蕉油此是部色藥黃金散如黃皮為主

水澄膏

水澄膏

萬方調敷腫毒

鬱金 白薇 白及 五倍子各一兩 乳香
雄黃各五錢

右為細末水調敷如熱毒者用醋水尤妙

一名金花散

黃藥花七朵 川連一錢去麩 山梔二箇肥者

黃藥五錢 川鬱金三錢

右為末并準水調成膏傳此藥性愈宜速打之

清毒膏

治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔厥腫抽
熱毒散腫氣

羊桃根 大黃 黃芩 菰豆粉 黃藥各一兩

赤小豆

右為細末用生薑葉取自然汁入蜜少許相和調
藥令稀稠得所看四畔腫亦處大小剪生絹上勻
攤可厚一錢許貼之乾即易

水調膏

治瘡疽海熱赤眼生痛

川大黃生用研末 杏仁去皮尖研 薑花各三分

右為細末研令勻以新汲水調和搗得所旋即
塗腫上乾即易之

水澄膏

水澄膏

治風熱腫毒赤紅名攻瘰癧癰痛不止

白及 白薇各四錢 鬱金一對 大黃 黃藥

黃藥子 梔皮各七錢五分 乳香 沒藥

雄黃各半兩

右爲細末用新汲水一碗藥末不以多少潑於水內藥定去水數於膠處上用白紙封之用雞翎掃此水過劑

一黃散

治一切腫毒

黃藥 大黃各等分

右爲末用酢調搽如乾以水潤之

楊梅散

大黃一兩半 白芨一兩 研硝二兩

右爲末用井水調搽如乾再搽

三消散

退熱散 赤陳散 開者

研硝 煅硝 大黃 梔子炒黑 寒水石

南星各等分

右爲細末生地黃汁調塗貼芙蓉葉搗汁調亦可

四面楚歌

敷諸般瘡腫發赤痛不可忍未成則散已成則破至瘡口合而止

荆芥和根剉碎

赤芍藥 大蘗根 土當歸 山大黃 土白芷 天南星圓白者 赤小豆

商陸根剉片子焙 白芨 赤薇 白薇 草烏

寒水石煨或炒各等分

右爲末生地黃汁調或四時或苦盡根汁應用前

腫根研汁未清則滿塗上或有突起處則露出瘡口

水師晶明

治諸般已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去

故肉生新肉洗後淨乾再用角貼藥一日一次大藥皮 澤瀉 莽草 荆芥 赤芍 山火黃 土白芷 上當歸 各法各等分

右剉粗散用水一斗入葱白大椒搗末同煎洗如已爛入猪脂下豚爪肉煎可免乾痛洗淨爲度

研砂膏

治癰疽腫毒并治癰疽點落疔毒等

研砂生用一錢 石礬末一兩炒黃白 白丁香三錢炒黃色 黃丹半斤生用 煉 斤淋水五碗

右四味研爲極細末次將藥水煎作一椀成膏待冷以面末入膏和勻成磁器中一應毒物以此將貼之白丁香即麻症忌用堅實者不用燥烈者

六灰膏

治發背打疔瘡癰疽疔毒癰疽痔瘡瘰癧子疔子其功用與研砂膏同也

灰兒 桑木 藥水 熟麥科 筋科各燒爲灰

石礬灰研細

石件多少不妨初用湯泡水淋淋下之本煎成膏如細裝磁器中一應毒物以膏點之若點癰瘡痔瘡有癰去少許再點之再癰去如是漸漸點去

拔生膏

治諸般惡瘡及癰疽風槍瘰癧者點破即愈

血竭一錢 蟾酥 輕粉各一錢 麝香五分 雄黃五錢 乳香 沒藥各一錢

右件俱爲極細末再用舊藥棉或成塊灰一斗三升微灰湯八九個用藥或桑葉或艾式火煎作

二椀取一椀收留將一椀盛於好磁器內候溫將藥末入灰湯內用鐵匙或桑柳枝攪攪又用好細石灰一升入藥末湯攪勻取出候冷過宿盛於小

白磁器內凡遇諸惡瘡點在當頭一日二次大日又一次瘡頭愈破約五分出水出爲妙忌日久藥乾者新收留灰湯和用

替針丸

治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香 研砂 沒藥 乳香各一字

石灰藥汁內推糯米十四粒其法用石灰五升鹽灰三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三升用瓦器盛貯候用時以小背盛取半盞

濃汁即用皮紙貼於患處濃汁面上安定然後取糯米十四粒神在皮紙面上上一宿即是右同爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用津貼瘡頭

萬成即破膿流不快則用一粒納瘡口內使膿不滯好肉易生

義方

雄雀黃 一粒 硃砂 陳倉米 沒藥各一字

右研勻以米飯丸如粟大每用一粒貼瘡口眼中即潰出

替針丁香丸

草烏大 研砂 白丁香各等分

右爲末酸酢調搽將破者令速潰若未破無如刀快銀刮一洗亦見效

托裏溫中湯

治瘡爲寒裏而內陷者膿出清稀及腐涼心下痞

滿腸鳴切痛大便澀滯食則嘔氣短促呃逆不絕
不得安臥時有昏憤

丁香 陳皮 沉香 茴香 益母仁各一錢
木香一錢半 黑附子炮去皮膽四錢 羌活
乾薑炮各三錢 甘草炙一錢

加味十全湯

治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪蒸 地黃蒸 當歸 川芎 人參 扶苓
芍藥炒 白朮 陳皮各一兩 粉草炙 桂心

五味子各半兩 烏藥七錢

右改咀每服一兩用水一椀生薑五片薑二枚同
煎分作二服留滓曬乾為末服之丹溪云加味十

全湯須看年老壯衰之強弱證之緩急時之寒
熱加減用之

補中益氣湯

治瘧瘧之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食
無味或飲食失節或勞傷身熱脈洪大而無力或

頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃芪炙一錢五分 甘草炙 人參 當歸酒拌

白朮炒各一錢 升麻 柴胡 陳皮各三分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎一饅空心服

人參養榮湯

治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色
痿黃或吸氣氣喘食無味不能收斂或氣血原不

足不能收斂者大瘡愈後多服之不覺他病

白芍藥一錢半 人參 陳皮 黃芪炙 黃芪炙

桂心 當歸酒拌 白朮 甘草炙各一錢

熟地黃酒拌 五味子炒杵 茯苓各七分半
蓮華去心炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

四君子湯

治脾胃虛弱或因飲食不節不消不化不能食用
此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒七惡隨主脾

胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便
不實若脾胃氣虛虛口出血吐血便血尤宜用之

蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜於前湯但
加當歸脾胃既旺飲食自進除血自生若用四物

沉陰之劑脾胃復傷諸證蜂起若命門火衰而脾
土虛寒必用八味丸以補土母

人參 茯苓 白朮各一錢 甘草炙一錢

右薑棗木煎服

六君子湯

治脾胃虛弱或寒涼或伐脾胃不消或不消飲宜
服此湯以壯氣清諸證自愈

即四君子湯加陳皮半夏

異功散

治脾胃虛弱飲食少思

即四君子湯加陳皮

因物湯

治血虛發熱或因失血或因痘代或因諸後致腫
熱內熱煩燥不安皆宜服之經云血生於脾若脾

虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白朮
以補脾

熟地黃 當歸各三錢 芍藥二錢 川芎一錢半

以補脾

右木煎服

八珍湯

調和榮顏順理陰陽滋養氣血是飲食遠虛熱
此氣血虛之大藥也

當歸酒拌 川芎 芍藥炒 熟地黃酒拌

人參 白朮炒 茯苓各一錢 甘草炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

十全大補湯

治潰瘍發熱或惡寒或作嘔或嘔多或清或自汗
盜汗及流注準熱便毒久不作膿或膿成不潰潰

而不斂或血氣不足之人結癰未成服者宜加枳
殼者附連服之自消

八珍 肉桂 地黃酒拌蒸乾 川芎 茯苓

白芍藥炒 白朮十炒 黃芪用鹽水拌炒

當歸酒拌各一錢 甘草炙五分

作一劑用水二鍾薑棗煎服

脾肺湯

治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血
以致妄行吐下或怔忡健忘少寐或心脾作

痛自汗盜汗或肢體麻痺大便不調或婦人經候
不準或熱內熱或崩漏流注等證不能消散清飲

白朮 白茯苓 黃芪炒 當歸 龍眼肉

遠志肉 人參 酸棗仁炒各一錢 木香五分

甘草炙三錢

右薑棗木煎服

黃芪人參湯

治潰瘍破後食少無腥及有虛熱積氣所縛者

黃芪二錢 人參 白朮 麥門冬 蒼朮

陳皮 升麻 五味子 當歸身 甘草各一錢
黃蘗炒四分 炒劉五分

右作一服水二鐘煎至一鐘食遠服

托裏當歸湯

治清濁氣血俱虛瘡口不斂肺熱內熱寒熱往來

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證

當歸 黃芪 人參 熟地黃 川芎 芍藥各一錢 柴胡 甘草各五分

石水煎服

人參散

治癰疽內虛不足

人參 白朮 上白茯苓 枸杞子各一兩
熟地黃 黃芪各二兩 桂心 白芍藥

當歸微炒 甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分煎三枚
煎至六分去滓不拘時溫服

麥門冬湯

治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬去心 黃芪到 五味子炒 人參去蘆
白茯苓去黑皮 官桂去粗皮 當歸切碎

蓮志去心 芎藭各一兩 甘草炙七錢半

右攪咀每服五錢水一盞半入生薑半分碾碎大
棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服

護嬰都尉

治諸般已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此
清復服至愈而止

防風去濕 厚朴去粗皮薑汁炒 苦梗 白芷

黃芪炙各半兩 人參二錢 川芎 甘草
細桂 當歸各二錢

右爲末每服一錢空心溫鹽酒調服至瘡口令復
更服爲佳不飲酒者湯煎服時氣湯尤妙

六味丸

一各六味地黃丸此壯水之劑夫人之生以腎爲
主凡病首由腎虛而致此方乃天一之水之劑無

有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋
秘氣虛盜汗咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花

耳聾咽乾喉痛口舌生瘡腰膝不堅固腰膝痠軟五
臟齊損折腰不足一證尤當用之能生木故也

若腎虛發熱自汗盜汗諸血失血失音水乾爲痰
之聖藥血虛發熱之聖劑也

熱地黃生者自製八兩 山茱萸 山藥各四兩
白茯苓 牡丹皮 澤瀉各三兩

右地黃片齊餘食末蜜和丸桐子大每服七八十
丸滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而思流注
鶴膝等證不能清涼飲食減少思或食而不化

脾虛夜多夢遺各一兩
前方加肉桂附子各一兩

加減八味丸

治瘡同前

即六味丸加肉桂五味子各一兩
人參內托散

治瘡瘍潰而作痛者

人參 黃芪 當歸 川芎 厚朴 防風
桔梗 白芷 官桂 紫草 木香 甘草

右入糯米一盞水煎服

黃芪散

治瘡潰後補虛去客熱
黃芪 石竹各二兩 知母 麥門冬去心
白芍藥 白茯苓 桂心 熟地黃 人參去蘆

川芎各一兩 甘草炙微赤半兩

右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日
三四服

雷歸補血湯

治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤面紅煩渴
引飲晝夜不眠脈洪大而虛重按全無此脈虛血

虛也若誤服白虎湯必死宜此主之
黃芪炙一兩 當歸酒拌二錢

作一劑水一鍾半煎六分服
沉香散

治癰疽潰已絕肌肉內虛尚有餘熱
沉香到 柴胡去苗 黃芪 麥冬去心各一兩
白朮七錢半 熟地黃二兩 黃芩 苦梔根

甘草到各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入竹葉七片小麥五
十粒煎至六分去滓不拘時溫服

加味逍遙散

治肝脾血虛內熱發熱或遍身瘡癰瘰癧或肢體
作痛頭目昏重或怔忡赤白燥咽乾或發熱盜

汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胃乳腹脹

小便不利

甘草炙 當歸 芍藥酒炒 茯苓 白朮炒

柴胡各一錢 牡丹皮 山梔炒各七分

右水煎服

梗子黃水湯

治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不

住用此退熱

通蘆 連翹 山梔仁 黃芩去心 防風

石菖蒲 白朮炒 生甘草 生犀角屑 人參

苦參各去置 茯苓上白者去皮各一錢半

生薑其土又置一兩

右爲粗末每大錢水一鍾煎至六分去滓溫服

六合同生丹

一名六合奪命散治發背癰疽爛有同生之妙

鉛粉一兩 輕粉 銀硃 雄黃 乳香著上衣

沒藥各一錢半

右六味各擇真正好者研爲極細末收貯凡治其

病先煎好酒茶將毒洗淨候乾拭乾後調結膠

子一枚用藥一分摻於豬腰子上傳患處待豬腰

子上發熱如蒸良久取去自此發毒氣減痛若定

瘡口出膿後不可手搽次日依前法仍傳之第三

日亦傳之瘡勢惡者可傳七八九次瘡小只傳一

次可愈瘡腫子不脫熱勿治又治對口瘡同前

藥散

治發背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍瘡五分 牛黃十二月生用食月燒存性

鐵鎗各重一兩

右研極細末以豬腦髓和好酢調傅瘡口二三五次

愈初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飯石膏

在農濱後園瘡口

麥飯石不消多少炭火煨至紅以好酢洗之如此煨

煨十數次研爲末重攤去粗者取細末入乳鉢數人

更連研五七日如麵極細爲妙 白飯研爲細末

虎角不用自說者須用帶腦頂骨全者是生取之

角截作二寸長炭火燒令煙盡研盡爲末再入乳

鉢更連研令極細

右用麥飯石細末二兩白飯末二兩虎角灰四兩

最要研得極細方有收口之效其和合藥末多寡

止痛收口排膿情相之異如此和合藥末多寡

用歷年好米酢入乳石鉢內熬令焦黑沸却旋旋

入藥末用竹篾子不住手攪熬一二時久令稀稠

得所提出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令著塵

用時先以豬腦湯洗去膿血以故帛把乾搗細黑

膏塗得四圍凡有赤處盡塗之但兩中心一口如

錢大末須能令內消已潰則排膿如漏水逐日瘡

口收斂瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥

貼瘡但肉膜不穿亦能取去洗瘡勿可手觸散肉

亦不可口氣吹者合藥亦忌氣之及月經有

孕婦人見之仍可將好水酢一大碗收磁器內候

逐日用藥於瘡上久則藥乾以棉帛點酢拭藥

上勿令潮也初起一日一洗一換藥十日後兩日

一換

解毒百用膏

豬牙皂角煨 南星各一兩 大米一合炒黑

吳小粉乾者四兩炒無去火毒

右爲末和勻黃水調圓順撲酒酢調圓

遍毒散

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮枯恐有穢毒攻起

宜用此

黃藥子 白藥子各一兩 透明雄黃一錢

赤小豆二兩

右爲末水調傅

青散子

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡口生肌

棉花葉蒸時收乾取四兩爲末 青赤小豆

白及各二兩

右爲末臨時用棉花末三錢白芨小豆末各一

錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不

用貼

