

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷十三



欽定四庫全書

續名醫類案卷十二

飲食傷

錢塘魏之琇撰

胃脘

實初治一人痛懶飲食即吐或宿食結於中焦不能飲

食四升後足令炙中脘五十壯服分氣丸丁香丸即

一人腹氣虛身冷物不消常覺口中出敗卵臭服草

續名醫類案

神丹即愈若服全真金液亦效

原注脾胃既為食所傷不可再施消尅唯

治以温化則

自健運矣

一人暑月飲食冷物傷肺氣致咳嗽胸膈不利先服金

液丹百粒泄去一行痛減三分又服五膈散而安但

覺常發後五年復大發灸中府穴五百壯方有極臭

下氣難聞自後永不再發

世醫不審病目動云暑月熱氣傷肺一派寒涼致水

氣不消變成

大病原注

汪頴曰一人好食燒鶩炙燻日常不缺人咸防其生癰

疽後卒不病訪知其入每夜必啜涼茶一碗乃知茶能解灸燂之毒也

龔子才治一人勞後喫紅柿十數枚又飲涼水數碗少頃又食熱麵數碗遂心腹大痛診之六脉沉微氣口稍此寒熱相搏所致以附子乾薑肉桂枳實山查神麴莪朮香附一服立止後渾身發熱又以小柴胡一劑而安

一人臘月賭喫羊肉數斤被羊肉冷油凝結堵塞胸膈

不下脹悶而死諸醫束手診之六脉俱有乃用黃酒
一大罈煮熱入大缸內令患者坐其中衆手輕輕亂
拍胸腹背心令二人吹其鼻及將熱燒酒灌之次服
萬億丸遂得吐瀉而愈

陶節菴治一人患病因食羊肉涉水結於胸中門人請
曰此病下之不能吐之不出當用何法陶曰宜食砒
一錢門人未之信也乃以他藥試之百計不効卒依
陶語一服而吐遂愈門人問曰砒性殺人何能治病

陶曰羊血大能解砒毒羊肉得砒而吐而砒得羊肉

則不能殺人是以此知其可愈

杭州府志

唐守元治一婦人食羊聞呼未及吞而應逾月病發淹及兩年唐曰此必胸有宿物家人曰兩年不食矣曰試以我藥投之既而大吐痰塊中裹羊肉一臠遂愈

平湖縣志

王海藏治秦生好服三生茶及冷物成積而痼寒脉非浮非沈上下内外按舉極有力堅而不柔觸指突出

膚表往來不可以至數名縱橫不可以巨細壯此陰
症鼓擊脉也一身流行之火萃於胸中寒氣逼之故
搏大有力與真武四逆理中等湯丸佐以白芍茴香
使不僭上每日服百丸夜八十九至夜汗出而愈

孫文垣治董潯陽年六十七有脾胃疾以過啖瓜果胸
膈脹痛諸醫不愈脉之寸關弦緊曰病傷瓜果而為
寒濕淫勝經云寒淫所勝治以辛溫然瓜果非麝香
肉桂不能消以高良薑香附各一兩為君肉桂五錢

為臣麝香一錢為佐每服二錢酒調下藥下咽胸次
便寬再服知餓三服而中櫛交接賓客如未病者

馬二尹迪菴年五十五以過食鰻肉卷餅心腹脹痛醫
不知吐法遽以硝黃下之大便不行脹痛愈甚又用
木香檳榔丸繼又有下以大小便承氣者十餘日病
益加便既不行食亦不進小水僅點滴又服白餅子
五日備急丸三日脹痛遂不可當又服甘遂芫花大
戟牽牛之屬三日并小便之點滴亦無矣又灸中腕

三十餘壯亦無驗孫至視其色蒼黑神藏不露聲音
亮惟腹大如箕不能反側脉之兩手皆滑大尺猶有
力曰此病初時食在上膈法當用吐素問云在上者
因而越之是也乃誤下傷脾失其健運是以愈下愈
脹又以峻利益下之致展轉增劇今先用六君子湯
以醒其脾木香砂仁助其運動再用吐法吐出前藥
弗慮大便不行獨慮行之不止耳計所服藥硝黃五
斤巴豆白餅五兩又加諸標悍之劑幸而藥性未行

否則如瓶水底脫傾瀉無餘矣今傷在上中二焦下
元未損故兩尺尚有神色蒼氣固根本未動尚可為
也服藥後腹中大痛知藥力已至改用人參蘆防風
蘆升麻桔梗各三錢煎服少頃用鷲翎探之涌出前
藥約十餘碗病者曰目前光矣時已刻謂鷲翎探之
涌出宜備人參數斤以待至午刻進至寶丹一帖以
溫中氣未申間腹中濁氣下注覺少寬至晚大便行
一次小水畧通即用參朮各五錢炮薑三錢茯苓二

錢木香甘草各五分陳皮一錢煎服四鼓又行一次
小水亦行次日連瀉十餘次以理中為丸與煎劑兼
服脹全消食漸進凡瀉七十二日服參二斤

吳九宜每早晨腹痛泄瀉者半年糞色青腹膨脹咸謂
脾腎瀉為灸關元三十壯服補脾腎之藥皆不効自
亦知醫謂尺寸俱無脉惟兩關沉滑大以為憂疑久
瀉六脉皆絕也孫診之曰無恐此中焦食積痰瀉也
積膠於中故尺寸隱伏不見法當下反用補悞矣以

丹溪保和丸二錢加備急丸三粒五服之更下稠積
半桶脹痛隨愈次日六脉齊見再以東垣木香化滯
湯調理而安

汪氏婦腹大如箕堅如石時或作痛雜治月餘轉脹急
小水不通或用溫補下元之劑則脹急欲裂自經求
盡脉之兩關洪滑鼓指按之不下乃有餘之候也症
雖重可生其致病之由母家常令女奴袖熟雞牛舌
之類私授之因數食冷物積冷物積成脹滿悞作虛

治宜增劇也乃用積塊丸三下之而脹消積去以保和丸調理一月而愈

黃履素曰予在臨江時悞服厚朴傷中氣之後偶食犬肉一塊遂覺停滯時中氣正虛不敢加山查等藥考本草食犬肉不消煮蘆根汁飲之可消如法煎飲覺右脇下微痛次日大痛殊不可解自是日甚一日坐卧皆妨反側痛如刀右脇下按之有物如雞子方書言右脇痛屬食積痰積有謂須攻治者有謂不宜攻

必須助正以消邪者時有醫主攻治謂不治將成痞
塊子以為不然確守助正之說當痛極時不敢服藥
靜以守之俟痛小定氣雖痞即用六君子加木香等
行氣之藥以漸調之竟得痊可若悞信攻伐不知死
所矣

張景岳治一上舍年及三旬因午刻食水煮麵角將至
初更食及小腹下至右角間遂停積不行而堅突如
拳大如鶩卵其痛之劇莫可名狀察其明係麵積顯

而無疑然計其已入大腸此正通則不痛之症也乃與木香檳榔丸其痛如故因疑藥力之緩猶未及病及更投神授丸以瀉之又不妨因謂此藥性皆寒故滯而不行也再投備急丸雖連得大瀉而堅痛毫不為減斯時也張計窮矣因潛思其由不過因麩豈無所以制之今既逐之不及使非借氣以行之不可也且計麩毒非大蒜不殺氣滯非木香不行又其滯深道遠非精銳之嚮導不能達乃用火酒磨木香令其

嚼生蒜一大瓣而以香酒送之一服後覺痛稍減三四服後痛漸止而食漸進而小腹之塊仍在後至半年許始得消盡由是知欲消食滯即大黃巴豆猶有所不能及而推宜行氣為先也且知飲食下行之道乃必由小腹下右角間而後出於廣腸此自古無言及者

琇按就此觀之景岳平生臨症遺憾多矣夫麴角由胃入腸已至少腹之角豈能作痛如是而又如

拳如卵耶必其人素有疝病偶因麵食之濕熱發之或兼當日之房勞遂乃決張如是故推蕩之亦不應得木香火酒一派辛熱香竄而痛止耳至謂食由小腹下右角而後出廣腸謂自古無言及者更堪捧腹經謂大小腸皆盤屈十六曲則左旋右轉可知豈如筒如袋而直下乎嘻

張路玉治葉某停食感冒兩寸關俱瀆數糲糊兩尺皆沉弦按之益堅雖其人尚能行走而脉少冲和此必