

欽定四庫全書

子部
仁齋直指卷二



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

宋楊士瀛撰

明 朱崇正 附遺

證治是

得病有公辦安病之

九貴於問得病之因風
則重滯此受病之證然
傷於酒食或深居簡出

而受暑自非委曲尋問其因則以意治病豈不繆耶有
人喉間麻癢醫問其平日所嗜曰常喫鳩子乃知鳩食半
夏苗以生薑治之而愈有人痰熱昏迷不醒醫問其喜食
者何有曰酷好煎炙飛禽乃用紅圓子小七香圓和之而
入朱砂膏為小圓薄荷泡湯灌下須臾即甦有人暑月深
藏不出因客至于窻下忽爾倦怠怠力疲自作補湯得之反
劇醫問其由連進兩服香薷飲作效舉此為例其他可推
古云醫者意也苟不究其得病之因其何以為意會

治病當先救急

治病如奕碁當先救急急者何救其重而略其輕也假如病人發熱經日服通利之劑泄瀉不止嘔吐大作粥藥不入而熱猶未已治法略去發熱一節且以定嘔進食為先惟人參生薑入些炙甘草煎湯調藕合香圓嚥下養正丹斟酌圓數與之進劑以還嘔吐自定飲食漸進泄瀉亦自不作是元氣既正縱有微熱特假熱耳人參川芎柴胡甘草調理之

治病如操舟

操舟在手當風波震蕩之衝一有轉移則舟覆矣醫權藥衡主持在我不可偏徇病家所欲尤不可張皇使病人驚間有病家粗識皮膚辨難反覆萬物惑焉又有瘥後觸犯再復隱諱不言須詰問其由庶得對病施藥

用藥中病不必盡劑

治寒以溫治熱以涼但中病即止矯枉則過正也蓋涼藥頻施必至於嘔惡沈冷溫藥頻施必至於煩燥關熱

所貴酌量權度一毫無過用焉是為活法

經常用藥自有奇功

人有中年以上素挾風痰腹中時痛忽爾感冒雖已發散寒邪無復發熱頭疼之苦奈何風痰嘔吐俱作諸藥罔功但用茯苓二陳湯加南木香白豆蔻作劑入生薑烏梅同煎調蘇合香圓貳粒嚥下白圓子貳拾圓連續兩服嘔止痰消自然思食繼是以北參川芎橘皮白豆蔻炙甘草調之若通小便則於內加麥門冬若通大便

則於內加枳殼以嚙神保圓肆伍圓大小腑一通頓遂
勿藥之喜

論肝脾主病

經曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食蓋肝脈可以
知風寒之出入脾脈可以驗飲食之盈虧肝亦主血脾
亦主痰以其脈之虛實而益損之以其病之關係而對
治之君請擇斯二者

病人尺脈洪大

此病在下部也當踈利而出之脈洪大主熱多是大小便不通或小腹結急臍下蓄血或腎氣攻刺發作奔豚或下焦停水外腎虛腫或風邪攻腎脚痺腰疼或腎臟風毒身下瘡癢當隨證體認以對病之劑主之大槩通利為第一義臨診精思而熟審焉

水氣腎氣血氣風毒擒縱治法

此等證候先以青皮陳皮枳殼北梗半夏紫蘇生薑甘草解其寒邪調其衛氣然從斟酌用十棗湯吞養正丹

輕者却只用神保圓夾青木香圓以五靈脂入烏梅濃
蜜煎湯嚥下錢氏宣風散亦可以疎利風毒俟大便通
快流行其痛已減繼是二陳湯加當歸川芎木香縮砂
輩調理之

治痢要訣

痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積欲出氣滯而不
與之出所以下墜裏急乍起乍止日夜凡百餘度病家
所請莫不求其止孰知物積氣滯致有如是之證耶繼

人但見有上項證候不論色之赤白脈之大小壹皆以
通利行之物積用巴豆大黃輩氣滯用枳殼桔梗青皮
蓬朮輩二者兼濟必能收功其間佐以黃連阿膠圓效
驗尤著蓋痢疾多因傷暑伏熱酒麵炙煇醞釀而成其
阿膠尤大腸之要藥有熱毒留滯則能疎導無熱毒留
滯則能安平市肆或無圓子即以炒阿膠當歸青皮赤
茯苓黃連作劑入烏梅濃蜜同煎最能蕩滌惡穢積滯
既去遍數自疎嗣是却以木香茯苓縮砂白豆蔻陳皮

甘草調之自然喜食食則糟粕入於大腸然後真人養臟湯易簡斷下湯可止則止矣

簡徑治痢

諸熱痢血痢及痢後大腸裏痛用蘿蔔截碎研細濾清汁壹小盞蜜水相半壹盞同煎早午食前服日晡以米飲下黃連阿膠圓百粒無蘿蔔蘿蔔子代之○又法熱痢舊年白梅并好茶蜜水各半煎服冷痢生薑汁蜜水各半煎服仍兼木香生肉豆蔻為佐蜜最治痢

薑茶治痢法

薑能助陽茶能助陰二者皆能消散又且調平陰陽况於暑毒酒食毒皆能解之也不問赤白冷熱通用之老生薑切如豆許與茶葉等分用新水煎服東坡醫文潞公作效

禁口痢

下痢禁口不食雖曰脾虛盖亦熱氣閉隔心胸所致也俗用木香則失之溫用山藥則失之閉惟真料參苓白

朮散加石菖蒲末以道地粳米飲乘熱調下或用人參
茯苓石蓮子肉入些菖蒲與之胃次一開自然思食

瘡痢用常山罌粟殼

常山治瘡罌粟殼治痢人皆薄之固也然下痢日久腹
中無痛當澁腸則豈容不澁瘡以痰水作恙法當吐痰
逐水又豈容不為之吐下於斯時也不有罌粟殼關

以為對治乎但中間有藥輔之耳

治瘡要訣

凡瘡皆因腹中傳蓄黃水惟水不行所以寒熱不歇此瘡家受病之處也治法暑瘡純熱以香薷散加青皮北大黃兩箇烏梅同煎侵晨溫服寒瘡多寒以二陳湯加青皮良薑多用薑同煎侵晨吞神保圓五粒並欲取下毒水則去其病根寒熱自解

發瘡嘔吐勿用常山

有中年人臟腑久虛大便常滑忽得瘡疾嘔吐異常惟專用人參為能止嘔其他瘡劑並不可施遂以茯苓二

陳湯加人參縮砂而倍用白豆蔻進一二服病人自覺
氣脈頗消於是寒熱不作蓋白豆蔻能消能磨流行三
焦榮衛一轉寒熱自平繼今遇有嘔吐發瘧之證或其
人素嘔而發瘧謹勿用常山惟以生蘿蔔生薑各研自
然汁半盞入蜜三四匙烏梅兩箇同煎吞局方雄黃圓
三四粒候其利下惡血痰水即以人參川芎茯苓半夏
縮砂甘草調之萬一嘔不止而熱不退却用真料小柴
胡湯多加生薑主治其或嘔吐大作而又發熱且先與

治瘧生熟飲嘔定以小柴胡湯繼之

瘧有水有血

水即水飲也血即瘀血也惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以增寒熱常山逐水利飲固也苟無行血藥品佐助其間何以收十全之效耶繼自今瘧家或衄血或唾血或大便血絲或月候適來適去皆是血證當以常山草果檳榔青皮烏梅甘草作劑於內加五靈脂桃仁為佐入生薑濃蜜同煎以主治之