

瑞 士
汽巴—嘉基公司

药 品 手 册

CIBA-GEIGY

Switzerland

瑞士汽巴—嘉基公司

药 品 手 册

CIBA-GEIGY

Switzerland

江苏工业学院图书馆
藏书章

香港办事处

香港都爹利街11号帝纳大厦1201室

电话：5—265475

电传：HX 39815

图文传真：5—8106095

电挂：CIBAGEIGY Hong Kong

香港邮政总局信箱285号

瑞士汽巴—嘉基公司

药 品 手 册

CIBA-GEIGY

Switzerland

香港办事处

香港都爹利街11号帝纳大厦1201室

电话：5-265475

电传：HX 39815

图文传真：5-8106095

电挂：CIBAGEIGY Hong Kong

香港邮政总局信箱285号

基嘉一巴汽

愿与世界各地医药行业人士合作
为人类的健康事业服务。

瑞士汽巴——嘉基有限公司

汽巴—嘉基是一个化工企业，总部设在瑞士巴塞尔。所属公司和代办处遍布五大洲一百八十多个国家，在世界各地拥有雇员八万余人，1986年总营业额已超过100亿美元。

汽巴—嘉基的药物部是一家跨国经营的企业机构，在1986年已成为世界上第二大药物制造企业，在世界市场上占有3%的份额。汽巴—嘉基西药部拥有22,900人，1986年销售额达35亿多美元。

汽巴—嘉基注重于优质、特种产品的研究和开发。她除在巴塞尔设有研究中心外，在美国、英国、法国、西德、印度和日本分别拥有自己的研究实验室。科研工作主要在以下几个方面：化学、生物化学、微生物、药理学和毒理学、临床研究、药剂学的研究等等。平均用于上述研究的费用相当于西药部年营业总额的12%—15%。

汽巴—嘉基致力于提高药品的质量，为确保质量，其从事各种质量控制工作的员工占药物生产人员的17%。由于汽巴—嘉基建立了一套完整的、科学的质量控制系统，使生产的药品质量达到世界卫生组织 (WHO) 之国际先进水平，并得到了世界各国医药行业的好评。

香港办事处

香港都爹利街11号帝纳大厦1201室

电话：5-265475

电传：HX 39815

图文传真：5-8106095

电挂：CIBAGEIGY Hong Kong

北京联络处：

北京建国门外大街19号

国际大厦19楼5室

电话：5003952/5003769

电传：22951 CIGYB CN

上海联络处：

上海市延安中路100号

联谊大厦710室

电话：280383

电传：33397 CGSLO CN

心血管药物

CARDIOVASCULAR DRUGS

爱达芬	Adelphane	11
爱达芬—溢水驱	Adelphane-Esidrex	12
安特灵	Anturan 200	13
阿普利素灵	Apresoline	15
缓释阿普利素灵	Apresoline SR 50	18
海固通	Hygroton	20
海固通—利血平	Hygroton-Reserpine	22
利普素	Nepresol	23
硝酸甘油膜	Nitroderm TTS	25
利其丁	Regitine	27
利血平	Serpasil	29
心得平	Trasicor	31
缓释心得平	Trasicor SR 80	34

精神科药物

PSYCHOTROPIC DRUGS

安拿芬尼	Anafranil	39
路滴美	Ludiomil	42
利他灵	Ritalin	45
痛可灵	Tegretol	47

抗风湿药物

ANTI-RHEUMATIC DRUGS

灵加消	Rengasil	53
服他灵	Voltaren	55
缓释服他灵	Voltaren SR 100	58

抗菌素药物 ANTIBIOTICS

先锋七号	Celospor	61
利福平	Rimactane	65

外用皮肤药物 EXTERNAL DERMATOLOGICAL PREPARATIONS

优力斯	Eurax	71
优力斯-氢化皮质酮	Eurax-Hydrocortisone	73
乐沙灵	Locasalen	74
适确得	Sicorten	75
复方适确得	Sicorten Plus	77

其他 OTHERS

敌胺	Antistine	81
除铁灵	Desferal	82
理本灵	Lamprene	84
力奥来素	Lioresal	86
奥美定	Orimetene	88
使保定	Scopoderm TTS	91
超能特灵	Triolandren	93

注意：

在怀孕的首三月期内，如非必要时，不应使用药物治疗。

在使用任何催眠或镇静药物时，如对负责驾驶工作的病人尤应特别注意。

有关其它产品未入此列者， 请向汽巴-嘉基（香港）有限公司查询。

® = 注册商标

英文索引

INDEX	Page
Adelphane	11
Adelphane-Esidrex	12
Anafranil	39
Antistine	81
Anturan 200	13
Apresoline	15
Apresoline SR 50	18
Celospor	61
Desferal	82
Eurax	71
Eurax-Hydrocortisone	73
Hygroton	20
Hygroton-Reserpine	22
Lamprene	84
Lioresal	86
Locasalen	74
Ludiomil	42
Nepresol	23
Nitroderm TTS	25
Orimetene	88
Regitine	27
Rengasil	53
Rimactane	65
Ritalin	45
Scopoderm TTS	91
Serpasil	29
Sicorten	75
Sicorten plus	77
Tegretol	47
Trasicor	31
Trasicor SR 80	34
Triolandren	93
Voltaren	55
Voltaren SR 100	58

心血管药物

CARDIOVASCULAR DRUGS

爱达芬

® Adelphane

抗高血压药

成份

每片含利血平 (Reserpine) 0.1毫克和硫酸双肼苯哒嗪 (Dihydralazine Sulphate) (即利普素, Nepresol活性物) 10毫克。

特性

爱达芬对升高的血压具有逐渐而持久的下降作用。该药所含两种成份的降压效应有互补作用。除降压外,其内的利血平有镇静和松弛作用,而双肼苯哒嗪则有显著改善脑、肾血流作用。

适应症

用于轻度至中度高血压。

剂量

平均剂量为每次1片,每日3次。如病情需要,可暂时增至2片,每日3次。

副作用

偶有疲乏感和鼻充血。

注意

如病人有抑郁表现,应改用其他降压药(如Trasitensin),如应用爱达芬过程出现抑郁,亦应改用其他降压药。

类似其他有镇静作用药物,本剂可能影响病人反应,如驾驶汽车。

禁忌症

对双肼苯哒嗪过敏者忌用。

包装

片剂.....250片。

爱达芬—溢水驱

® Adelphane—Esidrex

抗高血压药

成份

每片含利血平 (Reserpine) 0.1毫克；硫酸双肼苯哒嗪 (Dihydralazine sulphate) 10毫克和氢氯噻嗪 (Hydrochlorothiazide) 10毫克。

特性

爱达芬—溢水驱是一种易为人们耐受的降压药，对高血压具有逐渐而持续的下降作用，其内含有的三种成份具有不同的作用点。

利血平作用在间脑中枢，对病人有镇静和松弛作用，可使其心血管系统免受周围环境各种刺激，诱发的不良影响。双肼苯哒嗪除降压作用外，可增加脑、肾血流。氢氯噻嗪的利尿作用可对抗病理性钠潴留作用，从而有可能使许多病例在饮食上放松对食盐的限制。

适应症

用于各期原发性和肾性高血压。

剂量

每次1片，每日3次；如病情需要，可单次暂时增至每次2片，维持量每日1~2片。

副作用

请参看爱达芬。氢氯噻嗪可引至潜伏性痛风和糖尿病发作。

注意

应参看爱达芬。尽量多吃含钾丰富的食物，对需要加用钾盐治疗的病例，可使用 Adelphane—Esidrex-K（每粒糖衣片加有600毫克氯化钾）。

禁忌症

严重肝功能不全和对双肼苯哒嗪过敏者忌用。

包装

片剂.....100, 500片。

安特灵 200

® Anturan 200

血小板功能调节药

成份

活性物质：1,2-二苯基-3,5-二氧-4-(2-苯亚磺酰乙基)-保泰松(苯磺唑酮)

。(Sulphinpyrazone)

糖衣片每片200毫克。

特性

在某些类型的血管病，血小板的生理学特性发生变化，引起粘附性增加和聚集的倾向。这种典型的病理学状态常常是同时有血小板存活时间缩短和血小板转换加速。经与形成血栓的刺激物接触，例如血管壁损伤，血小板附着于内皮下，然后释放一些因子，进一步促进血小板粘附，导致血栓形成。

安特灵通过使病理性地缩短的血小板存活时间延长，并使异常升高的血小板转换力降低，对血小板功能紊乱有调节作用。安特灵 200 的活性物质，(苯磺唑酮)降低血小板的粘附和聚集，并抑制血小板释放反应。此外，安特灵 200 降低血小板合成前列腺素的速度。灵长类动物实验证明，安特灵 200 对血管内皮起保护作用。因此，安特灵 200 对许多与血栓—栓塞性疾病发病学有关的重要因子均有影响。

适应症

减低急性心肌梗塞后心源性死亡的发生率。

防止由于血管修复术、人工心脏瓣膜和正在作透析治疗病人的动静脉分流引起的血栓—栓塞性合并症。

由于血栓形成引起的脑血管意外后状态。

暂时性黑蒙症(由于脑缺血引起的暂时性视盲)。

剂量

用于减低梗塞后死亡率：每次1片(200毫克)，每日4次。应于急性梗塞后大约4周开始治疗。

其他适应症：每次1片(200毫克)，每日3~4次。

宜于进餐时服药或用牛奶送服。

由于安特灵有强力的促尿酸作用，在治疗的头几天宜保持恰当的食物摄入量，并加用碳酸氢钠。如血浆尿酸浓度升高，可逐渐增加剂量。

副作用

安特灵 200 的耐受性好，并可用于长期治疗。偶然，少数病例可有暂时性胃肠道

副作用，一般较轻。个别病例发生胃肠道出血和药物疹。极少见者有贫血、白细胞减少、血小板减少或粒细胞缺乏症。

注意

对于胃敏感性高的病人，应慎用安特灵 200（对有消化性溃疡病史的病人，应予以关注）。对于有肾结石或肾绞痛病史的病人，应检测血浆尿酸浓度。虽然有报告偶然发生肾功能衰竭，但未能确定显著的病因学关系。与其他长期用药一样，对于原有显著肾功能损害的病例应定期验肾功能。

个别病例发生皮肤过敏反应—或如果白细胞、血小板数减少—应停用安特灵 200。

妊娠：苯磺唑酮，安特灵 200 的活性物质已广泛应用多年，无证据表明对妊娠妇女的胚胎或胎儿有任何影响，尽管如此，在妊娠期间，在未衡量该药对母、婴的利弊之前，不宜滥用安特灵 200。

相互作用

接受安特灵 200 治疗的病人，若与乙酰水杨酸或其他影响止血的药物（如非甾体抗风湿药）同用时，如有任何异常出血表现，应立即随诊。

由于安特灵可同时加强口服抗凝剂的作用，后者的剂量应按凝血酶之时间加以调整。对于正在接受口服抗凝剂治疗的病人，在开始应用或停用安特灵时，应作为期数天的每天测量凝血酶时间。

安特灵 200 也能延长或加强其他药物的作用，对于同时用口服降糖药、青霉素或磺胺治疗的病人，应特别注意。

禁忌症

胃、肠溃疡，对安特灵或其他吡唑啉酮衍生物过敏和严重肝实质性害。

包装

糖衣片 200 毫克…………… 50 片。

阿普利素灵

® Apresoline

周围血管扩张剂，抗高血压药

成份

活性物质：1-盐酸肼苯哒嗪（盐酸肼酞嗪）。（Hydralazine Hydrochloride）
糖衣片每片10、25毫克。

特性

通过直接降低血管（尤其小动脉）管壁的张力，阿普利素灵使周围血管扩张，从而使升高的血压下降。由于它亦能降低肾血管阻力，在抗高血压药物中有特殊地位，在长期治疗时可维持肾血液供应良好。阿普利素灵宜与其他降压药合用，在多数病例可保持用相对小的剂量。阿普利素灵与 β 受体阻滞剂联用是最受欢迎的组合。因为 β 受体阻滞剂不仅可加强降压效果，并可抵销肼苯哒嗪引起的反射性心动过速作用。这种治疗方案的降压效果还可通过加用利尿药而进一步加强。在慢性充血性心力衰竭，阿普利素灵通过在动脉端突出的血管扩张活性而降低体循环的血管阻力，并减少左心室的负荷。心搏出量和心输出量因此而增加，充盈压仅轻度降低。对心力衰竭病人，与高血压相反，阿普利素灵几乎不影响动脉血压和心率。心输出量增加同样可改善肾血流量和肾功能。

药物动力学

阿普利素灵的活性物质（肼酞嗪），口服可迅速、完全吸收。在血浆中主要与丙酮酸形成可水解的偶合物。口服肼苯哒嗪是剂量依赖肝脏首过作用（全身可用性26~55%）。口服1次血浆浓度高峰可保持 $\frac{1}{2}$ 至 $1\frac{1}{2}$ 小时。血浆半衰期平均2~3小时。而在肾功能损害病人则会延长（例如当肌氨酸酐清除率 <20 毫升/分，则可延长至16小时）。肼苯哒嗪迅速分布全身，并对血管壁有显著亲和力。肼苯哒嗪与血浆蛋白结合，达90%。这一点可解释该药的降压作用常较其半衰期为长。口服一次后在24小时内约有77%在尿液发现。大部分以乙酰化和羟化代谢物形式排出，部分与葡萄糖醛酸结合。约7%以原形排出。代谢物的形式有赖于病人的乙酰化作用类型。

适应症

1. 高血压

口服：治疗各种类型高血压性疾病包括晚期妊娠的高血压性合并症。

注射：用于高血压急症，尤其发生于晚期妊娠的类型（先兆子痫、子痫）和有肾损害者。

2. 慢性充血性心力衰竭

慢性左心室性心力衰竭对传统治疗（如洋地黄、利尿药）疗效不佳，如心排出量低，左心室充盈压正常或轻度升高者，本药可作为辅助药物治疗。对左心室充盈压高的病人，宜将本药与硝酸盐合用。