

良改  
嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

○中身部

○肩臂分

肩下曰膊。膊下對腋處曰臑。臑盡處為肘。肘當臂腕肘以下為臂。臂掌交接處為腕。腕以上大指節後肥魚隆起處統謂之魚。

手大指屬肺。肺脈自腋入臑。至大指出其端。肺筋即起於大指端少商穴之次穴。在大指內側。去爪甲如韭葉循手掌直上大指本節後有魚際穴。為肺繫掌後橫紋頭有大淵穴。為肺俞。大淵後有經渠穴。為肺經手腕後一寸五分有列缺穴。為肺絡臂。腕曲中有曲澤穴。為肺合。循內側上臑入腋。其散筋復自腋上肩。結於肩端骨罅名鸛骨之前。曰前髃。其筋脈所到邪氣盛亦痛。正氣虛亦痛。

食指屬大腸。大腸筋脈皆起於食指端商陽穴之次穴。去爪如韭葉。為大腸井。留於本節前內側。名二間穴。為大腸繫注於本節後三間穴。為大腸俞。過於合谷穴。為大腸原。上側腕中有陽谿穴。為大腸經。腕後三寸有偏歷穴。為大腸絡。肘曲紋頭盡處有曲池穴。為大腸合。由是歷三里肘膠五里三穴直上結於骨之前髃。

中指屬包絡。包絡之脈自腋循臑入肘臂。至中中指出其端。其筋即起於中指內廉之末。中衝穴之次穴。去爪甲如韭葉。為心井。心為天君。其井俞等俱在包絡屈中指無名指兩者之間。取勞宮穴。為心繫。掌後兩筋之間有大陵穴。為心俞。去腕二寸兩筋間有內關穴。為心主之絡。去腕三寸有間使穴。為心經。上至肘曲中央。陷中有曲澤穴。為心合。上循天泉穴之次。結腋下。

無名指屬三焦。三焦筋脈俱起無名指外廉。關衝穴之次穴。去爪甲如韭葉。為三焦井。留於小指次指本

節前陷中為液門穴。為三焦繫。注於液下一寸。名中渚穴。為三焦俞。結於手腕陷中之陽池穴。為三焦原。直上腕後二寸。名外關穴。為三焦絡。腕後三寸。名支溝穴。為三焦經。結於肘外大骨上陷中。名天井穴。為三焦合。上膈至肩膠穴。包絡脈之次別掌中。循無名指出其端。

小指內側屬心。外側屬小腸。心脈循臑下肘。出小指之端。心筋起小指之端。內側少衝穴之次。穴去爪甲如韭葉。直上入掌內後廉。應神門穴。在掌後兌骨中。又應通里穴。為心絡。在腕後一寸陷中。又應少海穴。在肘後大骨外。去肘端五分。屈肘回頭得之。又應極泉穴。在臂內腋下筋間。小腸筋脈俱起小指外側少澤穴之次。穴去爪甲一分。為小腸井。留於小指外側本節前陷中。名前谷穴。為小腸繫。注於小指外側本節後。名後谿穴。為小腸俞。直上至於腕起骨陷中。有腕骨穴。為小腸原。踝下有陽谷穴。為小腸經。腕後五寸有支正穴。為小腸絡。肘下兌骨之後。有小海穴。為小腸合。從是上膈。歷肩解。肩脾交肩

上。  
肩大小腸三焦筋脈俱至肩。肺筋結前臑。膽脈至肩上。肩井穴屬膽。膀胱筋結骨臑。

### ○肩臂分病論

手病掌中熱。屬心與包絡。

手熱赤瘡。兩掌皮厚皸裂。皆肝脾血燥。加味道遙散。加鈎藤煎地。

手足心腫風也。花椒鹽醋和敷之。

手足抽掣動搖弄舌吐沫。不可遠作風火痰治。其脈沉弱。即是脾虛生風之症。宜大補歸脾湯最妙。

手足麻木脾肺氣虛。補中益氣湯。加半夏茯苓桑條。外用桑枝葉湯洗。

臂痛人謂風寒襲臂則痛。不知邪之所湊。其氣必虛。分別宜細。果係風寒。蠲痺湯可用。當歸赤芍黃耆薑

黃羌活防風甘草生薑煎。

血燥筋攣遇寒則劇肝氣虛弱風寒客經絡脈必緊細舒筋湯薑黃甘草羌活白朮海桐皮當歸赤芍然  
以加味道遙散為主

臂發熱秦艽地黃湯四物加秦艽丹皮白芍茯苓鈎藤甘草柴胡○亦有怒動肝火小柴胡加川芎當歸  
亦可用加味道遙散

臂痛不能舉或痛無定處由脾虛邪氣相搏脈必沉細補中益氣加桂枝桑枝薑黃威靈仙  
臂連肩背酸痛兩手軟痺由痰飲流入四肢二陳加南星木香薑黃生薑若腎水虧筋骨失養以致痿痺

六味丸

肩痛在肩前屬大腸蓋肩端兩骨及前膊皆大腸脈所經風熱乘肺肺氣鬱甚肺先病當瀉風熱通肺氣  
羌活防風陳皮白朮羌活升麻桑皮貝母若面白氣短必用參耆  
痛在背後屬小腸中風熱氣鬱不行羌活防風蒼朮蔓荊木通心血虛養血

○肩臂分備用諸方

手指腫痛烏梅魚鮓二味搗爛封之

臂痠痛手軟麻是痰導痰湯見肋

因提重物傷痛人參甘草黃耆當歸白芍熟地阿膠紫苑各六分薑黃五分

血虛瘦弱臂痛是血不榮筋當歸半錢赤芍七分黃芪各七羌活七分甘草三分白芍七分

川芎六分熟地七分

臂痛不能舉疑滯薑黃錢七赤芍各一錢當歸各一錢海桐各一錢白朮各一錢羌活各一錢甘草各一錢沉香麝少許○

坐卧傷溼痛是溼○睡手在被外是寒白芷茯苓半夏各六分當歸各一錢川芎各一錢甘草各一錢肉桂各一錢白芍各一錢

各六枳殼麻黃陳皮各一錢桔梗四分厚樸各八分蒼朮四分薑黃五分

舒經湯  
回稍散

中身部

肩臂分

二

蠟痺湯  
養湯

防風牛蒡湯

六味地黃丸  
加味逍遙散

手腫痛或指掌連臂膊痛謂之手氣

當歸 赤芍 黃耆 薑黃 羌活各一錢

甘草 薄荷 桂枝各五分

手足生紫斑白點枯厚破裂

白礬 皂礬各四兩

兜茶五錢 栢葉半斤

先用桐油搽患處以桐油煎

紙燃着以煙向患處熏之

方將前湯乘滾注盆內用布蓋手入湯內熏之勿令泄氣候溫洗之良久

一次愈 七日忌下湯水

輕者不宜重者神效

手足忽如火燃起紫白黃泡

治法用針挑破太乙膏蓋之○挑破又生

防風 牛蒡 山梔 石膏

黃芩 蒼朮 甘草 木通

水煎服

○一切手痛病不可灼艾及發表

搗則有搗 擊者筋擊常病

搗內外熱屬肝心火

膽草 青黛

羌活 防風 梔子 生地 黃芩 黃連 木通

加大黃甘草

○素弱者 柴胡 鉤藤

當歸 川芎

羌活 防風 白朮 茯苓 梔子

炒 生地 木通

生草 炙草

搗目動口瞤面腫

此胃中有風

白芷一錢二分

升麻二錢

乾葛一錢

蒼朮二錢

蔓荊

歸身各一錢

炙草

柴

胡

藁本

羌活

黃柏各五分

草薢

麻黃各五分

薑棗煎

羌活

甘草各一錢

沉香少許

搗臂筋痛屬傷手寒

薑黃二錢

赤芍

當歸

海桐

白朮各一錢五分

羌活

甘草

川芎

甘草

熟地

遠

搗覺虛弱或見虛症

防風

獨活

當歸

人參

細辛

乾葛

白芍

川芎

甘草

熟地

志

荊芥

半夏各七

肉桂一錢

汗多加牡蠣

搗愈欲絕其根

六味地黃丸

當歸

川芎

白芍

梔子

丹皮

鉤藤

兩

間服 炙草

當歸

白芍

茯苓

白朮

柴胡

丹皮

梔子

鉤藤

○手足厥諸病論

厥 手足冷厥曰因氣血兩虛而成有陽厥陰厥尸厥痰厥氣厥食厥暴厥七種

陽厥即熱厥四肢厥逆身熱面赤煩渴小便短澀大便燥結不省人事脈滑數此陰氣衰於下大忌升發

燥熱宜補陰黃芩黃連山梔知母石膏童便亦可用大黃芒硝下之。○如婦人熱入血室因而厥者童便為君如赤芍生地牛膝丹皮桃仁。○亦有陽厥身冷反見陰症者正為熱極而然俗醫云謂變成陰症急用熱藥助其陽氣十無一生。

陰厥即寒厥四肢厥逆身冷面青腹痛不渴小便自利大便溏不省人事脈遲緩此陽氣衰於下急補陽附子肉桂乾薑吳萸酌用。

尸厥手足冷肌膚栗起頭面青黑錯言妄語不知人事此因吊死登塚飛尸鬼擊致陰氣上盛下部空虛使然。

痰厥寒痰迷心四肢厥冷咽作聲口吐沫氣喘脈弦。

氣厥暴怒傷陰四肢冰冷口中冷氣卒然而仆傷血為薄厥。

食厥醉飽後感風寒或着腦飲食填塞胃氣不行變為異常急暴之症。○治四厥宜降痰順氣溫中二陳

枳殼桔梗尸厥加蒼术木香檀香沉香乳香雄黃藿蒲遠志一味金銀花葉煎膏絕妙。痰厥加南星薑

汁氣厥加烏藥木香香附青皮砂仁食厥宜吐不吐加厚朴枳實山查麥芽蒼术薄厥蒲黃一兩炒褐

色清酒十杯沃之溫服然卒遇厥症先用薑汁調蘇合丸灌醒然後察脈用藥冷過臂膝唇指甲青黑

皆不治。

○一切厥病諸方脈沉微不數是寒沉伏數是熱細是氣虛大如蔥

手足寒者為寒厥有氣虛者人參黃耆白术各一錢五分五味麥冬陳皮炙草炮附各一錢薑

棗煎服。○若表熱裏寒下利食入口即吐手足冷脈沉伏炙草二錢炮薑一錢生附子一錢。○寒厥

手足冷甚人參炙草白术炮薑炮附各等分

獨指夫冷是陰厥人參白术炮薑炙草

四逆湯  
附子理中  
湯中湯

升陽散火湯  
大柴胡湯

白虎湯  
瓜蒂湯

導痰湯

八味順氣散  
續命湯

二陳湯

四七湯

手足獨熱者為熱厥如手足熱而游赤 柴胡 升麻 葛根 獨活 羌活各一錢 防風五分 生草 炙草各四分  
人參 白芍各一錢 如熱厥大便秘 柴胡一錢 黃芩 白芍各六分 半夏一錢 生薑一錢 枳實

分大黃六分 棗三個

熱厥譫語身冷遺溺自汗 知母一錢 石膏二錢 甘草四分 粳米一撮  
暴不知人類於卒中但未卒仆非諸中喉中痰潮如曳鋸聲是疾厥 先用瓜蒂炒 赤小豆煮等 溫漿下探吐其痰 隨用

半夏錢四 南星錢一

枳實 赤苓 橘紅各一錢 炙草五分 竹瀝一錢 薑汁三茶匙

若熱症煩渴燥妄失 而手足冷甚但不過肘者是陽極似陰 宜服白虎湯 烏藥 人參各一錢 炙草五分

暴怒氣逆昏暈是氣厥 白木 茯苓 青皮 白芷 陳皮各一錢 防已 官桂各一錢 防風一錢

手足搐搦為風厥 麻黃 人參 黃芩 白芍 甘草 川芎各錢 杏仁 防已 官桂各一錢 防風一錢

分五 炮附五分 薑煎

因酒而得是酒厥 半夏 陳皮 茯苓 甘草 乾葛 青皮

骨枯爪痛是骨厥 半夏一錢 茯苓二錢 蘇葉六分 厚朴八分 薑棗煎

身立如橡是肝厥 服四七湯

喘而強是陽明厥 服四七湯 三者俱是氣逆

身脈不動形體無知狀是尸厥 硃砂 雄黃 生玳瑁 白芥子 麝香各二分 安息香和為丸養豆大

每服五丸 當隨其臟氣以治寒則熱之熱則寒之閉則通之 大黃一錢 當歸三分 枳實三分 後用

腳氣頑麻腫痛是痛厥初發身痛 羌活 獨活各一錢 防風二分 大黃一錢 當歸三分 枳實三分 後用

羌活 炙草 酒芩 茵陳 酒炒各一錢 人參 苦參 升麻 葛根 蒼朮 當歸各四分 知母 澤

瀉猪苓 防風各六分 白木七錢

血虛厥 當歸 川芎 白芍

各一錢五分

熟地 酒栢 知母

各一錢

枸杞 麥冬

各八分

甘草

五分

○脊背分

脊督脈主脊。大腸筋挾脊。心脈與春裏細脈相連貫。脾筋着脊。腎筋脈貫脊。房欲過度。脊空則痛。膀胱筋脈挾脊。分左右上項賊風乘虛入。偃強不能屈伸。其分左右也。從脊開一寸五分為第二行。對第三椎曰肺俞。對第五椎曰心俞。對第七椎曰膈俞。對第九椎曰肝俞。對第十椎曰胆俞。對第十一椎曰脾俞。對第十二椎曰胃俞。對第十三椎曰三焦俞。對第十四椎曰腎俞。對第十六椎曰大腸俞。對第十八椎曰小腸俞。對第十九椎曰膀胱俞。○從脊開三寸為第三行。魄門對肺俞。故肺藏魄。神堂對心俞。故心藏神。魂門對肝俞。故肝藏魂。意舍對脾俞。故脾藏意。志室對腎俞。故腎藏志。膏肓對第四椎。

腎脊兩旁曰腎。膀胱脈循腎。腎脈循腎。

肩解 背上兩角為肩解。小腸脈出肩解。

肩胛 肩解下成片肉為肩胛。大小腸筋脈俱繞肩胛。

○脊背分諸病論

背惡寒背為陽。腹為陰。陽不足。則背惡寒。陽衰陰必盛。陰盛口中必和。附子湯。人參白朮白苓附子白芍。背微惡寒。渴燥心煩。乃陽氣內陷。裏實熱也。人參白虎湯。

○脊背分備用方

肩背痛小便數少

是風熱

柴胡 升麻 黃耆

各一錢

防風 羌活 陳皮 人參 甘草

各五分

蒼朮

青皮

各三分

黃栢

分五

白朮

分二

氣虛人勿服

肩背沉重痛

是濕熱

羌活 甘草

黃芩 茵陳

各一錢

人參

分四

苦參 升麻

各一錢

乾葛 蒼朮

各一錢

當歸

各一錢

當歸

各一錢

當歸

各一錢

當歸

各一錢

當歸

各一錢

當歸

各一錢

當歸

各一錢

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

湯

當歸

痛

各四澤瀉分猪苓各六分

防風分六

知母分六

白朮分三

素有痰肩背痛導痰湯見

先背脊痛後及肩是腎氣上逆

乾薑分一

乾薑錢一

熟大黃錢一

枳殼分

桔梗

蒼朮

升麻各二分

白

芍七分

陳皮

甘草各五分

當歸

半夏

白芷

茯苓

小茴各四分

川椒各五分

升麻

柴胡各三分

當歸

川芎

補中益氣湯

久坐脊背痛黃耆錢一

人參

白朮

陳皮

炙草

當歸分六

升麻

柴胡

炙草

當歸

川芎

白芍

熟地各等分

肉桂

羌活勝濕湯

脊痛項強沖頭痛羌活

獨活

秦本

防風錢各一

蔓荊子分三

川芎分二

炙草分五

黃柏分五

麻黃分三

地龍分四

蘇木分六

歸尾錢一

背心一點痛

麻黃

陳皮

烏藥各一錢

殭蠶

炮薑各三分

川芎

枳殼

桔梗

白芷

炙草各五分

烏鵲順氣湯

腰脊酸削齒痛手足煩疼不能行動

皮骨

具通炙取黃焦汁盡碎如雀腦糯米三斗用麴釀酒封五

十日開飲之

呵欠伸背舒腰神疲勞倦數欠

陽虛不勝陰

補中益氣

升陽益胃

但呵欠不疲倦

是將欲卧不須藥

○胸肋分

膺胸上兩旁高處曰膺

胃脈到膺

膈筋繫膺

胸結喉下曰缺盆

缺盆下曰胸

在膺之下

胸下曰膈

肝乃蔽心之骨

心位在此

心痛在岐骨陷處

胸痛在

膺胸上兩旁高處曰膺

胃脈到膺

膈筋繫膺

胸結喉下曰缺盆

缺盆下曰胸

在膺之下

胸下曰膈

肝乃蔽心之骨

心位在此

心痛在岐骨陷處

胸痛在

心之上為胸肺家之分野。肺脈布胸中肺筋。胸中。心經結胸中。脾筋脈皆散胸中。肝脈上

至胸。膽脈下胸中。腎脈入肺注胸中。胞絡脈起胸中筋散胸中。腋肩下曰臑。臑下曰�。�對腋。肺筋脈入腋。心小腸結腋。膽經走腋。包絡脈抵腋。

肢腋下為肢。

脇肢下為脇。肝膽脈布脇。胞絡筋脈挾脇。

肋脇後為肋。脾筋結肋。肝脈布肋。

季脇脇之下為季脇。肺筋抵季脇。膽筋脈乘季脇。

肘季脇之下為肘。膽筋乘肘。

乳乳房屬胃。乳頭屬肝。

### ○胸肋分諸病論

胸痛善太息胸者。肺之分。肺心脾肝膽腎胞絡七經筋。脈俱至胸。而胸痛多屬肝。餘經能令胸滿短氣而不痛。肝虛胸痛引脇背。宜補腎六味丸。加牛膝首烏。肝實胸痛不能轉側。善太息。宜舒肝用寬胸飲。葉胡鬱金香附降香川芎陳皮玄胡當歸甘草砂仁。

胸滿短氣陽實喘促不卧。茯苓杏仁陳皮蘇子桑皮。○虛則當補脾以益肺。補中益氣。去升麻柴胡。加茯苓五味。

杜胸肺熱脹滿。有痰成之。忌破氣發散。肺虛也。亦忌收澀。宜降氣消痰。蘇子枇杷葉貝母桑皮花粉沙參。百合薄荷射干前胡。

脇肋痛有氣血痰食四種。而怒氣瘀血居多。治者先分左右。再審虛實。左痛多留血。或大怒傷血。或跌撲鬪毆傷血。致死血阻滯。或肋下有塊。皆作痛。○右痛肝邪入肺。惱怒鬱結不伸。雖無瘀血亦痛。是為氣

痛。○痰痛亦在左右兩肋走注痛而有聲。○食痛亦在左右肋下有一條扛起。此以左右分氣血也。○亦左痛不端屬血。右痛不端屬氣。氣血從何辨。蓋痰血按之痛。不按亦痛。痛無時息。而不膨氣痛時止而膨。暖即寬。旋復痛。以此辨氣血更快。○脇痛大半是實。陳皮生薑細辛補肝能令肝脹。治實。大忌柴胡青皮川芎。柴胡必用暴怒傷血。加當歸香附山梔甘草。○死血阻滯。必日輕夜重。午後發熱。加桃仁紅花沒藥香附赤芍。意以根有塊。再加牡蠣。○氣痛和脇飲枳殼青皮薑黃香附甘草。有痰加蒼朮半夏白芥。食積加砂仁枳實吳萸沙川黃連。兩肋俱痛。於前藥斟酌加減。痛甚加醋少許。此皆治實之法。亦有痛時目眈眈無所見耳。無所聞。善恐。如人將捕之。脈虛不可作實治。須看大便。大便通和。喘咳肝火侮肺金。小柴胡加山梔橘葉。○若連胸腹脹痛。大便不通。為痰血停滯。歸尾紅花香附玄胡蘇木橘葉大黃通之。隨將加味道遙歸脾參用。又有酒色太過。脇下一點痛不止。名乾脇痛。甚危。惟大補氣血而已。

季肋痛。肋下名季肋。在肝下膽之位。痛甚小腹亦是死血。治不外肋痛。治痰血法。痛不甚。止於一處。痰也。二陳加柴胡青皮白芥烏藥。

乳癰因忿怒鬱悶。或厚味致厥陰之氣不行。竅不得通。陽明之血沸騰於內。熱甚化膿。亦或所乳之子口氣煖熱。含乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。須忍痛揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成癰節。治法青皮疎肝滯石膏清胃熱。甘草節行汚濁之血。瓜萸實消腫導毒。再加沒藥橘葉皂角刺金銀花當歸。以少酒佐之。此治實之法也。若因虛而氣血壅滯。不宜克伐。致傷脾胃。先用托裏八物去芎甘。加黃耆陳皮。後則補中益氣。歸脾湯參用。若膿出反痛。惡寒惡熱。宜補氣血八珍湯。神效。瓜萸散參用。瓜萸一個。甘草當歸各五錢。乳香沒藥各一錢。

乳巖乳根結成隱核如大棋子。不疼不癢。肉色不變。其人內熱夜熱。五心煩熱。皆由憂怒鬱悶。朝夕積累。

肝氣橫逆脾氣消阻而熱積數年後方成瘡陷以其瘡形散四似巖穴之狀故名巖熱至此則不可治矣須於初起時即知其為肝脾虧損而成勿用攻伐之藥加味道遙歸脾益氣養榮等湯酌用鹿角膠一味消巖聖藥隔蒜炙亦可愈

○胸肋分備用諸方

胸痛常欲踞蹠壓其胸先未痛但欲飲熱是肝旋覆花 枇杷葉 川芎 細辛 赤苓各一錢 前胡五分

胸痛短氣是水 蒼朮 茯苓 豬苓 澤瀉 官桂

胸痛痞氣是 陳皮 半夏 茯苓 生薑 鹽 甘草 水煎服

胸痛不氣是 白菴 炙草 木香 厚朴 砂仁 丁香 青皮 陳皮 各一錢 香

附錢 薑鹽煎 又方 牛黃 狗寶 麝香 五厘 硃砂 沉香 各五分 赤脂 松香 水浸三次

錢一 棗肉丸 每丸重四釐 冷茶下三丸

右肋痛是痰積 薑黃 枳殼 桂心 甘草 陳皮 木香 青皮 穿甲 片四

左肋痛 枳實 枳殼 川芎 柴胡 陳皮 白芍 香附 炙草 各一錢 炙草 五分

肋痛走注有聲是痰 半夏 南星 枳實 赤苓 橘紅 炙草 白芥 各一錢 川芎 當歸 各六

左肋痛不移處是死 桃仁 桂枝 芒硝 炙草 大黃 龍甲 青皮 柴胡 川芎 當歸 各六

跌撲肋痛亦是死 柴胡 花粉 當歸 紅花 甘草 山甲 大黃 桃仁 各二十

水酒煎 肋痛有塊是食 山查 半夏 橘紅 神麴 麥芽 茯苓 萊服 連翹 黃連 各五

怒氣肋痛 香附 川芎 當歸 柴胡 青皮 山藥 黃耆 川芎 木瓜 各一錢 熟地

胸膈隱隱微痛是腎虛不納氣 山黃 當歸 五味 山藥 黃耆 川芎 木瓜 各一錢 熟地

補肝散 香附湯 保和丸 推氣散 七紅丸 寬中散 二陳湯 五苓散 旋覆湯

中身部 胸肋分

沉香專氣

牛蒡湯

解湯  
鹿角散

萬應藥生書

白木分各三 獨活錢一 棗仁錢一

肋下一點痛不止口乾肋痛是酒 亦用上方

肋痞塞 沉香分五 人參錢一 檳榔分五 白木

訶皮錢一 香附錢三 薑黃 橘紅 甘草分各八 三棱 莪術錢各四 益智錢四 紅花錢八 為末每服錢二

腋癰肋癰 初起並用柴胡清肝散見耳 已潰照潰瘍治法

婦人產後乳不通見婦人部

乳腫痛 陳皮 牛蒡 山梔 忍冬 甘草 薏仁 黃芩 花粉 連翹 角針錢各一 柴胡 青

皮分各五 水酒煎服

乳腫硬不痛後漸痛 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附分各八 青皮 遠志 茯神

貝母 蘇葉分各六 桔梗分六 甘草 山梔 木通分各四 薑煎 又方 鹿角尖為末 熟酒調

服二服消

乳腫灸法 碗一個用燈草四根十字排碗內頭各露寸許再又用紙條一寸五分濶用水溼了蓋碗內

燈草上紙與碗口齊將碗覆於患上留燈草頭在外艾一大團放碗底火燒之艾盡再添至碗內流水

氣內痛覺止方位甚者次日再灸一次必消

吹乳雜方 髮灰礬灰陳香櫟灰酒下○又方梳垢灰髮灰鼠糞灰酒調下○又方雄羊糞每粒改作三

丸麵為衣晒乾每服四十九丸煮酒下盡醉綿被蓋睡○外治萱花根搗爛塗○又蒲公英搗爛塗俱

神效

○臍腹分 隔人心下有膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍着脊所以遮隔濁氣不使上熏心肺十二經脈惟膀胱脈

不貫膈餘皆能令膈痛

三焦膈下為胃上口。在膈上五寸。上腕穴分。即上焦。膈下四寸為中腕。即中焦。肺脈起中焦。在此膈上二寸。為下腕。即胃下口。屬下焦。三焦虛有腹寒少氣短氣之症。忌破氣。忌降。忌升發。宜補中益氣。如黃耆人參白朮益智五味之類。三焦實燥熱則有喉痺頭面赤熱赤白遊風等症。忌補斂。昇升。宜清熱調氣。如玄參山梔蘇子生甘黃芩之類。如板滯室塞。當宜調氣。木香白朮香附蒼朮蘇梗砂仁必用。

腹膈下為胃上口。曰賁門。在膈上五寸。膈上二寸。為胃下口。曰幽門。傳入小腸。舊說分三部正分。此上中下三腕。今乃曰中腕。屬脾。當膈痛屬腎。小腹痛屬肝。肝脾是矣。當膈何以屬腎。心脾筋結膈。胃筋脈挾膈。當膈間屬脾胃。其腎之筋脈從腰脊脊。並不及膈。當膈痛用腎經藥大誤。

### ○膈腹分諸病論

腹痛先分寒熱虛實。再詳食積血蟲。治法備矣。痛多寒。亦有熱痛。寒痛脈沉遲。或伏。絛。痛無增減。或得寒則痛。得熱則緩。寒痛飲乾薑肉桂吳萸草蔻木香厚朴陳皮甘草附白芍酒炒。熱痛脈洪數。時痛時止。口乾舌燥。小便赤澀。肛門如燒。白芍黃芩黃連山梔甘草滑石木通陳皮。辨虛實法不一。而可按屬虛。不可按屬實。尤其最顯者。人但知諸痛屬實。宜破滯疏利。枳實青皮檳榔大黃。用得宜亦驗。虛痛遇之愈甚。治虛分氣血。痛時常覺虛豁似飢。非飢。呼吸無力。屬氣虛。六君子加木香最妙。若假作痛。如細筋抽引不甯。又如芒刺牽引。屬血虛。四物加陳皮甘草木香。食痛脈必弦。食得寒則凝。得熱則行。宜溫散。平胃散加枳實草蔻半夏為聖藥。面黃腹痛。宿食不消。吞酸腹痛。痰滯傷食。俱用前藥。痰痛脈必滑。小便必不利。飽則暫止。飢則又痛。宜導痰解鬱。二陳加蒼朮香附川芎枳實薑汁。死血作痛。脈必扎澹。痛有定處。消血飲。玄胡歸尾五靈蘇木桃仁紅花沒藥赤芍。蟲痛者。不吐不瀉。心腹懊懣。往來上下。痛有休止。或腹中塊起。按之不見。五更心嘈惡心吐清水。腹熱善渴。食厚味或飽則止。面色青白赤。

不定。蛇蟲攻咬。面必黃。殺蟲丸。苦棟根。鸛虱雷丸。蕪荑。史君子。檳榔。烏梅。肉搗丸。又方。雄黃。白礬。飯丸。亦可。

○臍腹分備用諸方

痛絲絲無增減喜熱是寒脈必遲 白芷 茯苓 半夏 當歸各六分 川芎 炙草 肉桂 白芍各六分

枳殼 陳皮各二錢 桔梗 厚朴 乾薑各八分 蒼朮二錢 虛人 香砂 人參 白朮 陳皮

青皮 炮薑 茯苓 炙草 ○若不效宜微利之 腹皮 白芷 茯苓 紫蘇 藿香 厚朴

白朮 陳皮 桔梗 炙草 加官桂 木香 枳殼各五分 更下木香 胡椒各二分 巴豆一粒

乾蝎一個 為丸利之 ○又方 治寒 乾薑 肉桂 良薑各七分 枳殼 陳皮 砂仁各一錢 吳萸

厚朴各一錢 香附一錢 木香五分 甘草三分 玄胡五分 小茴香五分 乳香五分

時痛時止是熱 半夏 陳皮 炒梔 蒼朮 厚朴 酒苓 酒連 甘草 便秘加 大黃 白芍

當歸 甘草 或常覺熱痛是積熱 大黃二錢 炙草一錢 芒硝四錢

傷暑痛或吐利虛脈必 香需 人參 白朮 黃耆 扁豆 炙草 厚朴 木瓜 茯苓 陳皮冷服

吐加 藿香 砂仁 腹痛小便秘大便溏是濕 蒼朮 厚朴 炙草 赤苓 猪苓 澤瀉 官桂 陳皮

腹痛下白積或時眩喜熱湯是痰脈必滑 南星 半夏各一錢五分 滑石 香附 枳殼 青皮 木香 蒼

朮 砂仁 炒梔 茯苓 橘紅各一錢 甘草五分

痛欲便稍減是食脈必弦 半夏 茯苓 陳皮 炙草 蒼朮 厚朴 山查 神麴 麥芽 砂仁 草

果 枳實 壯人木香 檳榔 青皮 義朮 枳殼 黃連 大黃 牽牛 香附各一兩 當歸一兩

二陳平胃 散 木香檳榔 丸 五苓散 湯 星半安中 湯 散 神保丸 散 薑桂湯 散 四順清涼 散 二陳平胃 散 調胃承氣 湯 十味香需 散

錢五 水為丸每服八十丸。

酒積腹痛 木香 檳榔 陳皮 義木 枳殼 黃連 黃栢 大黃 牽牛 香附各八分 當歸錢一

田螺殼錢二 茵陳分 一切腹痛 蘆巴 石菖蒲各四錢 皂角去皮強二錢 麪糊丸每服一錢五分。

腹痛大脹是氣滯必沉 木香 香附 檳榔 青皮 陳皮各一錢 厚朴 蒼木 枳殼 砂仁各二錢 炙

草分五 虛痞刺痛 木香 紫蘇各五分 檳榔分七 陳皮 半夏各三分 香附 青皮各一錢 乳香 沒藥 甘

草各三 薑煎服。痛有常處不移是死血 桃仁十五個 桂枝 芒硝 炙草各一兩 大黃四兩 作三服。一日服。○虛者加歸

地蜜丸服。緩以除之。○或用歸尾 赤芍 桃仁 丹皮 玄胡 烏藥 香附 枳殼各一錢 紅花

官桂各五分 木香 川芎各六分 甘草二分 和之。絞痛妨食有發止發即欲死 半夏錢三 桂心不見大 玄胡二錢半 人參 乳香 甘草各一錢

痛有塊硬起吐清水是蟲 黑丑頭末 大黃 檳榔各八錢 雷丸醋煮 木香各一錢 沉香五分 以大皂角苦

棟皮各四錢 煎汁入丑黃榔三味為丸以雷木沉三末為衣雞汁下。○虛人烏梅三個 細辛 炮附 桂

枝 人參 黃栢各六分 乾薑 黃連 當歸 川椒各一錢 米飯丸椒湯下四十丸。攪腸沙腹痛甚四肢冷是乾霍亂 急用樟木煎湯大吐之。或用白礬末一錢湯服探吐之。○甚者面青昏倒

不省人事 急以鼠屎一合研末滾湯調澄清通口服。或刺委中並十指出血并用霍香正氣散加香

附砂仁。○轉筋理中湯 又馬蘭根葉細嚼嚙汁立安。疝氣腹痛明是病氣不在此例 人參 茯苓 黃耆 白木各一錢 炮附子一錢半 沉香 木瓜各一錢 羌活

治血湯 七氣湯 萬應丸 此下虫方 烏梅丸 此安蟲方 樟木煎 白礬末 鼠屎末 針刺治

和氣湯 桃仁承氣湯 黑神丸 木香順氣散

高聖尊生書 卷七 中身部 臍腹分

八

大黃湯

濕精湯

四聖丹

四物湯

盜氣湯

腎氣湯

五苓散

和血湯

川芎 紫蘇 甘草各七

腸内生癰腹痛小便數似淋身甲錯腹皮急急按之濡如腫狀或連臍生瘡宜急下之

大黃 朴硝各一錢 丹皮 白芥 桃仁各二錢 空

心溫服下後以參耆補之

小腹痛喜按是虛 人參 白朮 當歸 川芎 白芍 熟地黃各一錢 肉桂四分 木香三分 小茴分

玄胡 香附各四分

陰症腹痛或攪腸痧痛欲死 五靈脂炒出烟為度 桃仁 草烏湯泡去皮 青黛各一錢 酒糊丸梧子大艾

湯下十五丸

失血後腹痛或小腹痛是血 當歸 川芎各一錢 白芍二錢 熟地一錢 炮薑五分

小腹痛不可按是實 青皮 香附各一錢 小茴 川楝子 玄胡 木香 檳榔 木通各八分

小腹按之內痛若沃以湯小便澀上為清涕是胞痺 麥冬 五加皮 犀角各一錢五分 杜仲 桔梗 赤

芍 木通各一錢 桑螵蛸一個 羊腎少 煎服

小便不利小腹痛 蒼朮 赤苓 猪苓 澤瀉 木通 官桂少 甚者加 大黃 滑石

小腹脹急痛小便不利是死 桃仁 紅花 歸尾 赤芍 生地黃 青皮 香附

○臍腹分積聚癥瘕痞癖病論

積停蓄之總名積在臟聚在腑積屬陰聚屬陽積脈細而附骨聚脈浮動帶結積之始發有常處上下左右各有終始其痛不離其部聚之始發無根上下左右無所留止其痛無常處壯盛之人無積大抵正

氣不足邪氣留之然日進補湯無益必攻伐數日補中益氣數日是正治深者衰其大半即止俟脾土

健運破殘之餘不攻自走治塊宜丸不宜煎煎藥是過路之水徒耗元氣無損於塊氣不能作塊有形

之物成於痰食死血大法鹹以軟之化以削之化積丸三稜義木海石礞石瓦礮阿魏香附雄黃檳榔