

這是一本用彩圖和文字介紹中國野生和馴化的草藥書籍

# 常見草藥

第一冊 Vol. 1



本書是一本用彩圖和文字介紹中國野生和馴化的草藥書籍

# 常見草藥

第一冊 Vol. 1

# 目 錄

編輯說明	2	15. 土人參	21	34. 崗 梅	40				
<b>卷柏科</b>									
1. 石上柏	7	16. 馬齒莧	22	35. 枸 骨	41				
2. 翠雲草	8	<b>防己科</b>							
<b>裏白科</b>									
3. 芒箕骨	9	17. 寬筋藤	23	36. 急性子	42				
<b>鐵線蕨科</b>									
4. 鐵線草	10	18. 膜葉槌果藤	24	37. 布渣葉	43				
<b>水龍骨科</b>									
5. 抱樹蓮	11	19. 蕉 菜	25	38. 木 棉	44				
<b>松 科</b>									
6. 馬尾松	12	20. 常 山	26	39. 山芝蘚	45				
<b>三白草科</b>									
7. 魚腥草	13	21. 虎耳草	27	<b>藤黃科</b>					
<b>胡椒科</b>									
8. 假 薑	14	22. 桃 仁	28	40. 黃牛茶	46				
<b>金粟蘭科</b>									
9. 九節茶	15	23. 茅 莓	29	41. 茸伏草	47				
<b>桑 科</b>									
10. 薜 荔	16	24. 亮葉鷄血藤	30	42. 裂葉秋海棠	48				
11. 桑 樹	17	25. 排錢草	31	<b>仙人掌科</b>					
<b>蓼 科</b>									
12. 何首烏	18	26. 小葉雙眼龍	32	43. 仙人掌	49				
13. 火炭母	19	27. 算盤子	33	<b>瑞香科</b>					
<b>商陸科</b>									
14. 商 陸	20	28. 丢了棒	34	44. 了哥王	50				
<b>馬齒莧科</b>									
15. 土人參	21	29. 巴 豆	35	45. 土沉香	51				
16. 馬齒莧	22	30. 漆大姑	36	<b>珙桐科</b>					
17. 寬筋藤	23	31. 葉下珠	37	46. 喜 樹	52				
18. 膜葉槌果藤	24	32. 蔓 麻	38	<b>使君子科</b>					
19. 急性子	25	33. 黑面神	39	47. 使君子	53				
<b>冬青科</b>									
20. 崗 梅	40	48. 崗 松	54						

49 嶺 稔	55	70 穿心蓮	76	93 百 合	99			
<b>野牡丹科</b>			<b>茜草科</b>					
50 地 稔	56	71.白骨馬	77	94.土茯苓	100			
51 野牡丹	57	72.牛白藤	78	95.紅葉鐵樹	101			
52 毛 稔	58	73.水梅梅	79	<b>石蒜科</b>				
53 天香蘆	59	74.龍船花	80	96.仙 茅	102			
<b>傘形科</b>			75.鷄眼藤	81	<b>薑尾科</b>			
54.崩大碗	60	<b>忍冬科</b>			97.射 干	103		
55 沙 參	61	76.走馬箭	82	<b>薑 科</b>				
<b>紫金牛科</b>			77.半邊蓮	83	98.樟柳頭	104		
56 朱砂眼	62	<b>桔梗科</b>			99.莪 莖	105		
<b>藍雪科</b>			78.蒼 耳	84	<b>美人蕉科</b>			
57.補血草	63	79.夜香半	85	100.美人蕉	106			
58.白花丹	64	80.千里光	86	<b>石松科</b>				
<b>蘿藦科</b>			81.天名精	87	101.鋪地蜈蚣	107		
59.卵葉娃兒藤	65	82.大 薊	88	<b>卷柏科</b>				
60.徐長卿	66	83.一點紅	89	102.卷 柏	108			
<b>馬鞭草科</b>			84.旱蓮草	90	<b>木賊科</b>			
61.牡 荊	67	85.廣東土牛膝	91	103.纖弱木賊	109			
62.長葉紫珠	68	86.白花草	92	<b>海金沙科</b>				
63.裸花紫珠	69	<b>禾木科</b>			104.海金沙藤	110		
64.杜虹花	70	87.否 茅	93	<b>鱗始蕨科</b>				
65.尖尾楓	71	88.玉蜀黍	94	105.金花草	111			
66.五色梅	72	89.白茅根	95	<b>骨碎補科</b>				
<b>唇形科</b>			<b>天南星科</b>			106.石黃皮	112	
67.血見愁	73	90.石柑子	96	<b>鳳尾蕨科</b>				
<b>茄 科</b>			91.石菖蒲	97	107.鳳尾草	113		
68.野茄樹	74	<b>百合科</b>			108.半邊旗	114		
<b>爵牀科</b>			92.七葉一枝花	98	<b>蘇鐵科</b>			
69.老鼠簕	75				109.蘇 鐵	115		
						<b>柏 科</b>		

110.側柏	116	130.山小橘	136	<b>西番蓮科</b>	
<b>檀香科</b>		131.臭草	137	149.龍珠果	155
111.寄生藤	117	132.黃皮	138	<b>八角楓科</b>	
<b>桑寄生科</b>		133.東風橘	139	150.八角楓	156
112.槲寄生	118	<b>苦木科</b>		<b>桃金娘科</b>	
<b>石竹科</b>		134.鴉胆子	140	151.水翁	157
113.荷蓮豆草	119	<b>大戟科</b>		152.番石榴	158
<b>樟科</b>		135.白背葉	141	<b>傘形科</b>	
114.無根藤	120	136.油甘子	142	153.假芫茜	159
<b>十字花科</b>		137.越南葉下珠	143	<b>杜鵑花科</b>	
115.蕪菜	121	138.龍刷葉	144	154.杜鵑花	160
<b>金縷梅科</b>		<b>冬青科</b>		<b>龍胆科</b>	
116.楓樹	122	139.毛冬青	145	155.廣地丁	161
<b>薔薇科</b>		<b>無患子科</b>		<b>夾竹桃科</b>	
117.蛇莓	123	140.無患子	146	156.蘿芙木	162
<b>豆科</b>		141.倒地鈴	147	<b>蘿藦科</b>	
118.望江南	124	<b>鼠李科</b>		157.瓜子金	163
119.決明子	125	142.鐵包金	148	<b>馬鞭草科</b>	
120.含羞草	126	<b>葡萄科</b>		158.大青木	164
121.千斤拔	127	143.扁藤	149	159.山香	165
122.大葉千斤拔	128	<b>椴樹科</b>		160.蔓荆子	166
123.牛大力	129	144.刺蒴麻	150	<b>唇形科</b>	
124.鷄骨草	130	<b>錦葵科</b>		161.山香	167
125.毛相思子	131	145.磨盤草	151	162.涼粉草	168
126.相思子	132	<b>梧桐科</b>		163.半枝蓮	169
127.豬仔笠	133	146.半楓荷	152	164.韓信草	170
<b>酢漿草科</b>		<b>五極果科</b>		165.廣防風	171
128.酢漿草	134	147.錫葉藤	153	166.貓鬚草	172
<b>芸香科</b>		<b>藤黃科</b>		筆劃索引	173
129.三棱苦	135	148.田基黃	154		

本書是一本用彩圖和文字介紹中國野生和馴化的草藥書籍

# 常見草藥

第一冊 Vol. 1

# 編輯說明

根據我們的調查統計，到目前為止，中國常見的草藥有 500 種以上，我們計畫把這些常見的草藥彩色印刷，輯冊出版。每種草藥均按正名、學名、別名、生長環境、採集加工、性味功能、主治用法、方例、中國成藥、主要成分、附註、形態特徵等項編寫。茲分別說明於後：

1. 攝影：本書照片全部皆實地拍攝，大部分當草藥開花結果時攝於郊野，故形態比較逼真。但在攝影草藥時碰到一些技術上的困難：例如在拍攝喬木、灌木的時候，如果全棵拍攝，由於距離較遠，則照片中花、果、枝、葉很細小，使人難於分辨，故本書大部分草藥只拍攝有代表性的局部，用局部的花、果、枝、葉去表現全體；在拍攝細小的草藥時，要用微距鏡頭，雖然主體清晰了，但看起來又會較原株草藥為大。故看圖片時，宜參閱形態特徵的詳細描述。

2. 形態特徵：本書形態特徵編排在彩色圖下，方便省闊，介紹形態時，以植物學術語和通俗形象描寫相結合。

3. 正名：一般選用全國性草藥書籍最常用者為正名，以求名稱逐步統一。

4. 學名：每種草藥附加一個常用學名（拉丁名）。

5. 別名：草藥別名繁多，本書只選錄其中幾個較常用的別名。

6. 生長環境：只列出草藥的生長環境，如生長在山上、水邊……等，沒有寫明生長在中國什麼地方，因為有些草藥在中國很多地方都有生長，不勝羅列。

7. 採集加工：寫明其藥用部分，什麼時候最適宜採集，和簡便泡製法。

8. 性味功能：根據中醫使用草藥的傳統經驗：四氣（寒、熱、溫、涼、平），五味（酸、苦、甘、辛、鹹），加以闡釋。在使用的時候，還要參照中醫的基本診斷方法：四診（望、聞、問、切），八綱（陰、陽、表、裏、寒、熱、虛、實），辨證施治，才會收到理想的效果。

9. 主治用法：列出每種草藥的治療病症。本書草藥使用分量除註明鮮品者外，一律指乾品而言（鮮用加倍），按 1 斤等於 16 兩計算。大部分草藥均是用水煎服，水的用量，以剛浸過藥面為度。普通每兩藥用水一碗煎服，3 兩藥用水 3 碗左右，煎成一碗服。

10. 方例：草藥除少數可單味使用外，多配入複方使用，本書所輯方例，大部分是近年我國各地使用的臨床經驗方，小部分是我們自己的經驗。中西病名均予採用。所列使用分量，只供參考，尚要根據患者的體質強弱、病情輕重、年齡大小等具體情況，加減靈活運用。

11 中國成藥：所列中國成藥，有些是全部以該種草藥為原料製成的，如「穿心蓮片」等；有些是以該種草藥為主要成分製成者，如桑樹文內的「桑菊飲片」等。

12 主要成分：草藥所含成分很複雜，只列出其部分主要成分，有些因篇幅關係，沒有編入。

13 附註：有關該種草藥的類似品種，中毒的解救方法，抗菌試驗……等，凡屬於上述各項者，均列入附註項內。

# 目 錄

編輯說明	2	15. 土人參	21	31. 崗 梅	40
<b>卷柏科</b>		16. 馬齒莧	22	35. 柚 骨	41
1. 石上柏	7	<b>防己科</b>		<b>鳳仙花科</b>	
2. 翠雲草	8	17. 寬筋藤	23	36. 急性子	42
<b>裏白科</b>		<b>白花菜科</b>		<b>椴樹科</b>	
3. 芒箕骨	9	18. 膜葉梔果藤	24	37. 布渣葉	43
<b>鐵線蕨科</b>		<b>十字花科</b>		<b>木棉科</b>	
4. 鐵線草	10	19. 莼 菜	25	38. 木 棉	44
<b>水龍骨科</b>		<b>虎耳草科</b>		<b>梧桐科</b>	
5. 抱樹蓮	11	20. 常 山	26	39. 山芝蘚	45
<b>松 科</b>		21. 虎耳草	27	<b>藤黃科</b>	
6. 馬尾松	12	22. 桃 仁	28	40. 黃牛茶	46
<b>三白草科</b>		23. 茅 莓	29	<b>薑菜科</b>	
7. 魚腥草	13	<b>薔薇科</b>		41. 菖伏草	47
<b>胡椒科</b>		<b>豆 科</b>		<b>秋海棠科</b>	
8. 假 薺	14	24. 亮葉鷄血藤	30	42. 裂葉秋海棠	48
<b>金粟蘭科</b>		25. 排錢草	31	<b>仙人掌科</b>	
9. 九節茶	15	<b>大戟科</b>		43. 仙人掌	49
<b>桑 科</b>		26. 小葉雙眼龍	32	<b>瑞香科</b>	
10. 薜 荔	16	27. 算盤子	33	44. 了哥王	50
11. 桑 樹	17	28. 丢了棒	34	45. 土沉香	51
<b>蓼 科</b>		29. 巴 豆	35	<b>珙桐科</b>	
12. 何首烏	18	30. 漆大姑	36	46. 喜 樹	52
13. 火炭母	19	31. 葉下珠	37	<b>使君子科</b>	
<b>商陸科</b>		32. 蔓 麻	38	47. 使君子	53
14. 商 陸	20	33. 黑面神	39	<b>桃金娘科</b>	
<b>馬齒莧科</b>		<b>冬青科</b>		48. 崗 松	54

49 嶺 稔	55	70 穿心蓮	76	93 百 合	99			
<b>野牡丹科</b>			<b>茜草科</b>					
50 地 稔	56	71.白骨馬	77	94.土茯苓	100			
51 野牡丹	57	72.牛白藤	78	95.紅葉鐵樹	101			
52 毛 稔	58	73.水梅梅	79	<b>石蒜科</b>				
53 天香蘆	59	74.龍船花	80	96.仙 茅	102			
<b>傘形科</b>			75.鷄眼藤	81	<b>薑尾科</b>			
54.崩大碗	60	<b>忍冬科</b>			97.射 干	103		
55 沙 參	61	76.走馬箭	82	<b>薑 科</b>				
<b>紫金牛科</b>			77.半邊蓮	83	98.樟柳頭	104		
56 朱砂眼	62	<b>桔梗科</b>			99.莪 莖	105		
<b>藍雪科</b>			78.蒼 耳	84	<b>美人蕉科</b>			
57.補血草	63	79.夜香半	85	100.美人蕉	106			
58.白花丹	64	80.千里光	86	<b>石松科</b>				
<b>蘿藦科</b>			81.天名精	87	101.鋪地蜈蚣	107		
59.卵葉娃兒藤	65	82.大 薊	88	<b>卷柏科</b>				
60.徐長卿	66	83.一點紅	89	102.卷 柏	108			
<b>馬鞭草科</b>			84.旱蓮草	90	<b>木賊科</b>			
61.牡 荊	67	85.廣東土牛膝	91	103.纖弱木賊	109			
62.長葉紫珠	68	86.白花草	92	<b>海金沙科</b>				
63.裸花紫珠	69	<b>禾木科</b>			104.海金沙藤	110		
64.杜虹花	70	87.否 茅	93	<b>鱗始蕨科</b>				
65.尖尾楓	71	88.玉蜀黍	94	105.金花草	111			
66.五色梅	72	89.白茅根	95	<b>骨碎補科</b>				
<b>唇形科</b>			<b>天南星科</b>			106.石黃皮	112	
67.血見愁	73	90.石柑子	96	<b>鳳尾蕨科</b>				
<b>茄 科</b>			91.石菖蒲	97	107.鳳尾草	113		
68.野茄樹	74	<b>百合科</b>			108.半邊旗	114		
<b>爵牀科</b>			92.七葉一枝花	98	<b>蘇鐵科</b>			
69.老鼠簕	75				109.蘇 鐵	115		
						<b>柏 科</b>		

110.側柏	116	130.山小橘	136	<b>西番蓮科</b>	
<b>檀香科</b>		131.臭草	137	149.龍珠果	155
111.寄生藤	117	132.黃皮	138	<b>八角楓科</b>	
<b>桑寄生科</b>		133.東風橘	139	150.八角楓	156
112.槲寄生	118	<b>苦木科</b>		<b>桃金娘科</b>	
<b>石竹科</b>		134.鴉胆子	140	151.水翁	157
113.荷蓮豆草	119	<b>大戟科</b>		152.番石榴	158
<b>樟科</b>		135.白背葉	141	<b>傘形科</b>	
114.無根藤	120	136.油甘子	142	153.假芫茜	159
<b>十字花科</b>		137.越南葉下珠	143	<b>杜鵑花科</b>	
115.蕪菜	121	138.龍刷葉	144	154.杜鵑花	160
<b>金縷梅科</b>		<b>冬青科</b>		<b>龍胆科</b>	
116.楓樹	122	139.毛冬青	145	155.廣地丁	161
<b>薔薇科</b>		<b>無患子科</b>		<b>夾竹桃科</b>	
117.蛇莓	123	140.無患子	146	156.蘿芙木	162
<b>豆科</b>		141.倒地鈴	147	<b>蘿藦科</b>	
118.望江南	124	<b>鼠李科</b>		157.瓜子金	163
119.決明子	125	142.鐵包金	148	<b>馬鞭草科</b>	
120.含羞草	126	<b>葡萄科</b>		158.大青木	164
121.千斤拔	127	143.扁藤	149	159.山香	165
122.大葉千斤拔	128	<b>椴樹科</b>		160.蔓荆子	166
123.牛大力	129	144.刺蒴麻	150	<b>唇形科</b>	
124.鷄骨草	130	<b>錦葵科</b>		161.山香	167
125.毛相思子	131	145.磨盤草	151	162.涼粉草	168
126.相思子	132	<b>梧桐科</b>		163.半枝蓮	169
127.豬仔笠	133	146.半楓荷	152	164.韓信草	170
<b>酢漿草科</b>		<b>五極果科</b>		165.廣防風	171
128.酢漿草	134	147.錫葉藤	153	166.貓鬚草	172
<b>芸香科</b>		<b>藤黃科</b>		筆劃索引	173
129.三棱苦	135	148.田基黃	154		

# 石上柏

*Selaginella doederleinii* Hieron

別名 深綠卷柏、多德卷柏、爬柏、梭羅草。

生長環境 多生於山谷，林下陰濕地上。

採集加工 藥用全草，採集曬乾備用。


性味功能 味甘，性平。清熱解毒，抗癌，止血。

主治用法 1. 常用於滋養葉腫瘤（絨毛膜上皮癌，惡性葡萄胎等），鼻咽癌，肺癌，肝癌等\*；2. 肺熱咳嗽，咽喉腫痛，瘡癧；3. 上呼吸道炎，氣管炎，肺炎，急性扁桃腺炎；4. 黃疸型肝炎，膽囊炎，肝硬化腹水，急性泌尿系感染。每用5錢至1兩，水煎服。治癌可用2至4兩，宜久煎3—4小時。

方例 1. 癌症，肝硬化：石上柏2兩，瘦肉1至2兩或紅棗數個，水煎服。

2. 肺炎，急性扁桃體炎，眼結膜炎：石上柏1兩，加瘦肉1兩，水煎服。

中國成藥 治癌片。



主要成分 本品含生物碱、植物甾醇和皂甙等。

圖釋 石上柏為卷柏科多年生蕨類植物，植株高15至35厘米。主莖禾稈色，有棱，常在分枝處生出支撐根，側枝密，多回分枝。營養葉上面深綠色，下面灰綠色，二形，背腹各二列，腹葉（中葉）矩圓形，龍骨狀，具短刺頭，邊緣有細齒，交互並列指向枝頭；背葉（側葉）卵狀矩圓形，鈍頭，上緣有微齒，下緣全緣，向枝的兩側斜展，連枝寬5至7毫米。孢子囊穗四棱形，生於枝頂；孢子葉卵狀三角形，漸尖頭，邊緣有細齒，四列，交互覆瓦狀排列，孢子圓形。孢子二形。

# 翠雲草

*Selaginella uncinata(Desv.)Spring*

**別名** 龍鱗草、綠絨草、藍地柏、伸脚草、劍柏。

**生長環境** 生於山谷岩石上或陰濕的地方。

**採集加工** 藥用全草，全年可採，鮮用或陰乾備用。


**性味功能** 味微苦，性寒。清熱利濕，止血止咳。

**主治用法** 1.急性黃疸型肝炎，胆囊炎，腎炎水腫；2.腸炎，痢疾；3.肺結核，咳血；4.燒傷，刀傷，蛇傷，膿泡瘡。每用5錢至1兩；燙火傷用全草曬乾研末，麻油調敷。

**方例** 1.胆石症：翠雲草、虎杖、蒲公英、黃芩、黃柏、木香、枳殼、茵陳、鳳尾草、柴胡各1斤，大黃、鬱金各8兩，赭石5兩，將上藥共煮3次，約15,000毫升，再濃縮成8,000毫升，以500毫升裝一瓶高壓消毒後備用。成人每次口服20至30毫升，1日3次，小孩減半。（利胆排石湯）

2.黃疸：翠雲草1兩，菝葜秋海棠根1錢，水煎服。

3.急、慢性腎炎：翠雲草1兩，功水適量煎至300毫升，每服150毫升，每日2次。



**圖釋** 翠雲草為卷柏科植物，植株長30至60厘米。莖纖細，橫走，禾稈色，有棱，分枝處常生不定根。營養葉二形，背腹各二列，腹葉（中葉）長卵形，漸尖頭，全緣，交互疏生，指向枝頭，背葉（側葉）矩圓形，短尖頭，全緣，向兩側平展，葉下面深綠色，上面帶碧藍色，莖生的葉疏離，頂端尖。孢子囊穗四棱形，孢子葉卵狀三角形，龍骨狀，長漸尖頭，全緣，四列，覆瓦狀排列，孢子囊卵形，孢子二形。

# 芒 箕 骨

*Dicranopteris dichotoma*(Thunb.) Bernh.

別名 芒箕、山芒。

生長環境 山野間。

採集加工 藥用根、莖心，四季均可採集，洗淨鮮用或曬乾備用。

性味功能 味甘，性平。清熱利尿，祛痰止血。

主治用法 1. 尿道感染；2. 婦女白帶，血崩；3. 急性氣管炎；4. 跌打損傷，骨折，燙火傷。每用鮮根、莖心1至2兩。

方例 1. 尿道小便澀痛：芒箕莖心1兩，水煎服。

2. 婦女白帶：芒箕莖心4至5錢，桂圓肉1兩，水煎服。

3. 婦女血崩：芒箕根、莖心1兩，燒灰研末，酒送服。

4. 急性氣管炎：芒箕鮮根1至2兩，水煎服。

5. 跌打損傷：芒箕鮮根1至2兩，水煎，新傷加白酒，宿傷加白糖服。

6. 骨折整復固定後：嫩莖搗爛包敷患處。



圖釋 芒箕為蕨類裏山科植物，植株高45—90厘米，直立或蔓生。根狀莖細長而橫走。葉疏生，紙質，下面多少呈灰白色或灰藍色，幼時沿羽軸及葉脈有锈黃色毛，老時逐漸脫落，葉柄長24—56厘米，葉軸一至二回或多回分叉，各回分叉的腋間有1個休眠芽，密被絨毛，並有1對葉狀苞片，其基部兩側有1對羽狀深裂的闊披針形羽片（末回分叉除外）；末回羽片長16—23.5厘米，寬4—5.5厘米，披針形，寬齒狀羽裂幾達羽軸；裂片條狀披針形，鈍頭，頂端常微凹，全緣，側脈每組有小脈3—4（—5）條。孢子囊羣著生於每組側脈的上側小脈的中部，在主脈兩側各排1行。

# 鐵線草

*Adiantum flabellulatum* Linn.

別名 烏腳槍、鐵線蕨、黑腳蕨、過壇龍。

生長環境 生於山溝或林下潮濕之地。

採集加工 藥用全草，全年可採，洗淨切段曬乾備用。

性味功能 味淡苦，性微涼。清熱利濕，祛瘀消腫。

主治用法 1. 流感發熱，傳染性肝炎；2. 腸炎，痢疾，尿路結石；3. 跌打內傷，骨折；4. 疥毒，蛇傷，水火傷，癰疽。每用1至2兩。

方例 1. 腸炎，菌痢：鐵線草、鳳尾草、火炭母各1兩，水煎服。

2. 泌尿系結石：鐵線草、海金沙、金錢草各1兩，水煎服。

3. 急性黃疸型傳染性肝炎：鐵線草、紅糖各2兩，水煎服。

主要成分 含揮發油、黃酮類、糖類、鞣質等。



圖釋 鐵線草為鐵線蕨科多年生植物，高約20至50厘米。根狀莖直立，有密的亮棕色披針形鱗片。葉簇生，近革質，無毛，但葉軸和羽軸上面密生紅棕色短剛毛，葉柄長10至25厘米，亮紫黑色，堅韌，基部有少數茸毛，向上無毛，葉片扇形，長10至25厘米，寬8至22厘米，二至三回不對稱的二叉分枝，羽片條狀披針形，通常中央的較長，向兩側的較短，小葉扇形或斜方形，互生，長約1厘米，外緣或上緣淺裂，下部部分具細鋸齒，葉脈扇形分叉。孢子囊羣生於葉背上緣及外緣，褐色。

## 抱樹蓮

*Drymoglossum piloselloides*(L.)Presl.

別名 飛蓮草。

生長環境 附生於陰濕的石壁或樹幹上。

採集加工 藥用全草，全年可採，洗淨曬乾備用。

性味功能 味甘淡，性微涼。消炎解毒，祛風止咳。

主治用法 1.黃疸；2.咳嗽咳血；3.乳癌；4.腮腺炎，淋巴腺結核；5.風濕骨痛。每用5錢至1兩；外用適量鮮草搗爛敷患處。

方例 1.肺結核咳嗽咯血：抱樹蓮、蛇根草、杏香兔耳風各五錢，水煎服，每日一劑。

2.淋巴結炎：抱樹蓮、鳳尾草各5錢，水煎服。

附註 同科植物另有一種叫抱石蓮（*Lepidogrammitis drymoglossoides* (Baker.) Ching）外形與本種相似，主要區別在它的孢子囊羣是圓的，且被有盾狀鱗片。其藥用性能與本種相同。



圖釋 抱樹蓮為水龍骨科多年生蕨類植物，附生於樹上或石上。根狀莖細長，橫走，密被細小的近圓形或卵形的鱗片。葉疏生，有能育葉和不育葉兩個類型，不育葉近圓形，直徑約1厘米，或闊橢圓形，長5至6厘米，寬2厘米，肉質，疏被緊貼的星狀毛，能育葉線形，長8至13厘米，寬5至8毫米，厚革質。孢子囊羣沿葉緣連續或狹帶狀分佈，棕褐色。

# 馬 尾 松

*Pinus massoniana* Lamb.

別 名 松樹、山松、青松。


生長環境 喜生於陽光充足的山地。

採集加工 藥用松針、松香、松節、松花粉、松樹皮、松樹梢、松子仁；松花粉春季開花時採下雄花穗，曬乾過篩即得。

性味功能 松針：味苦澀、性溫，祛風活血，明目安神，解毒止癢。松香：味苦、甘，性溫，有小毒，燥濕祛風，生肌止痛。松節：味苦，性溫，祛風除濕，活絡止痛。松花粉：味甘，性溫，收斂止血。松樹皮：味苦澀，性溫，收斂生肌。松樹梢，味苦、澀，性溫，解毒。松子仁：味甘，性溫，潤肺，滑腸。

主治用法 松針：流行性感冒，風濕關節痛，跌打腫痛，夜盲症，高血壓病，神經衰弱，每用鮮品1至2兩，外用治凍瘡。松香：外用治癰癧瘍瘍，外傷出血，燒燙傷，外用適量入膏藥或研末敷患處。松節：風濕性關節痛，腰腿痛，大骨節病，跌打腫痛，每用5錢

至1兩。松花粉：胃、十二指腸潰瘍，咳血；外用治黃水瘡，外傷出血，每用1至2錢。松樹皮：外用治燒燙傷，小兒濕疹，研粉香油調擦，或煎水洗患處。松樹梢：木薯、斷腸草中毒，用鮮松梢（去葉）1至2兩。松子仁：肺燥咳嗽，慢性便秘。每用2至5錢，水煎服。



圖釋 馬尾松為松科常綠喬木，高可達二、三十米。樹皮紅褐色或灰褐色，易剝落。葉針形，深綠色，每二針一束，長10至20厘米，花單性，雄花序黃花聚生於幼枝的基部，雌花序淡紫色，單生或2至3個聚生於枝端。球果長卵圓形，由許多鱗片組成，熟時褐色而開裂。種子長卵形，長4至6毫米，種翅長1.6至2厘米。