

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫治準繩

卷一

醫治準繩

王肯堂 撰

百從三焦論之上焦在

中焦在中脘上通天氣

下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從于氣氣者天之陽也其脈浮而洪其症食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮而弦其證或先痛而後吐或先吐而後痛法當以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脈大而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法宜

毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之
不令大腑秘結而自愈也 此事難知問嘔吐噦胃所

主各有經乎答曰胃者總司也內有太陽陽明少陽三
經之別以其氣血多少而為聲物有無之不同即吐屬
太陽有物無聲乃血病也有食入即吐食已則吐食久
則吐之別嘔屬陽明有物有聲氣血俱病也仲景云嘔
多雖有陽明證不可下噦屬少陽無物有聲乃氣病也

此以乾嘔
為噦也

醫家大法食時則吐謂之嘔生薑半夏湯

食入則吐謂之暴吐生薑橘皮湯 食已則吐謂之
嘔吐橘皮半夏湯 食久則吐謂之反胃水煮金花丸
食再則吐謂之翻胃易老紫沉丸 旦食不能暮食
則吐食不下脈實而滑半夏生薑大黃湯下之 潔古
論吐分三焦其說蓋本於黃帝所謂氣為上膈食飲入
而還出為下膈食晬時乃反出之其上焦食已暴吐者
今世謂之嘔吐也中下二焦食久而吐食再而吐者今
世謂之膈氣反胃也分嘔吐膈氣為二門 趙以德云

夫陰陽氣血隨處有定分獨脾胃得之則法天地人而三才之道備故胃有上中下三脘上脘法天為陽下脘法地為陰中脘法氣交之分陽清而陰濁故陽所司者氣陰所司者血然陽中亦有陰陰中亦有陽於是上脘氣多血少則體乾道之變化動也下脘血多氣少則體坤道之資生靜也中脘氣血相半故運上下動靜升降之氣行由是物之入胃各從其類聚水飲者物之清穀食者物之濁然清中有濁濁中有清故飲之清者必先

上輸于司氣之肺而後四布為津為液清中之濁者則下輸膀胱為便溺出焉食之清者亦必先淫精于司血之心肝以養筋骨經脈更化榮衛流注百骸濁中之濁者則自下脘變糟粕傳送下大腸出焉若邪在上脘之陽則氣停氣停則水積故飲之清濁混亂則為痰為飲為涎為唾變而成嘔邪在下脘之陰則血滯血滯則穀不消故食之清濁不分而為噎塞為痞滿為痛為脹變而成吐邪在中脘之氣交者盡有二脘之病是故嘔從

氣病法天之陽動而有聲與飲俱出猶雷震必雨注也
吐從血病法地之陰靜而無聲與食俱也人迎者結喉
兩旁之脈動處也乃取天容人迎二穴補之也

診 魚際絡青短者少氣也 脾脈搏堅而長

缺二字

黃

當病少氣 一呼脈一動一吸脈一動曰少氣 尺堅

大脈小甚少氣惋有加立死

謂尺內堅而脈反小而少氣惋加也

嘔吐

漏氣 嘔苦

走哺 吐酸吞酸

吐食

乾嘔 嘔清水

惡心 吐涎沫

吐虵

東垣曰夫嘔吐噦者皆屬于胃胃者總司也以其氣血多少為異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明症甚不可下孫真人曰嘔家多服生薑乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生薑為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏為主故朱奉議治嘔吐噦以生薑半

夏陳皮之類是也究三者之源皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃加之飲食所傷而致也宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之若但有內傷而有此疾宜察其虛實使內消之痰飲者必下之當分其經對證用藥不可亂也 金匱方諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之又云嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之用半夏一斤生薑半斤水七升煮取一升半分溫再服又云卒嘔吐心下痞有水眩悸者小

半夏加茯苓湯主之即前方加茯苓四兩也然則生薑
半夏固通治嘔吐之正劑矣然東垣云辛藥生薑之類
治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸
中閉塞而嘔者唯宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用
辛藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此
仲景心法也 寒而嘔吐則喜熱惡寒四肢淒清或先
覺噯酸脈弱小而滑因胃虛傷寒飲食或傷寒汗下過
多胃中虛冷所致當以剛壯溫之宜二陳湯加丁香十

粒或理中湯加枳實半錢或丁香吳茱萸湯藿香安胃散鐵刷湯不效則溫中湯甚則附子理中湯或治中湯加丁香並須冷服蓋冷遇冷則相入庶不吐出

羅謙甫云諸藥

不愈者紅豆丸神效

曾有患人用附子理中湯四逆湯加丁香到

口即吐後去乾薑只參附加丁香木二香煎熟更磨入沈香立吐出象萬物之吐出于地也氣血俱病法陰陽之氣交則嘔吐並作飲食皆出然在上脘非不吐食也設陽中之陰亦病則食入即吐不得納于胃也非若中脘

之食已而後吐下脘之食久而方出其下脘非不嘔也
設陰中之陽亦病則吐與嘔齊作然嘔少于吐不若上
脘之嘔多于吐也

定益虛寒痰氣凝結丁附既溫佐以沉香則通乾薑
白朮則泥耳 熱嘔食少則出喜冷惡熱煩躁引飲脈
數而洪宜二陳湯加黃連炒梔子枇杷葉竹茹乾薑生
薑入蘆根汁服 金匱方嘔而發熱者小柴胡湯主之
潔古用小柴胡湯加青黛以薑汁打糊丸名清鎮丸治

嘔吐脈弦頭痛蓋本諸此 胃熱而吐者聞穀氣即嘔
藥下亦嘔或傷寒未解胸中有熱關脈洪者是也並用
蘆根汁 金匱方嘔吐而病在膈上後思水解急與之
思水者猪苓散主之 嘔而胸滿者吳茱萸湯主之
嘔而渴者枇杷葉汁飲之 嘔而腸鳴心下痞者半夏
瀉心湯主之 氣嘔吐胸滿膈脹關格不通不食常飽
食則常氣逆而吐此因盛怒中飲食而然宜二陳湯加
枳實木香各半錢或吳茱萸湯不效則丁沉透膈湯及

五膈寬中湯 食嘔吐多因七情而得有外感邪氣併
飲食不節而生大概治以理中為先二陳湯加枳實一
錢或加南星七分沉香木香各四分亦好或只服枳南
湯或導痰湯 又有中脘伏痰遇冷即發俗謂之冷癰
或服新法半夏湯或搗脾湯 有痰飲粥藥到咽即吐
人皆謂其翻胃非也此乃痰氣結在咽膈之間宜先以
薑蘇湯下靈砂丹俟藥可進則以順氣之藥繼之 外
有吐瀉及痢疾或腹冷痛進熱藥太驟以致嘔逆宜二

陳湯加砂仁白芷蔻各半錢沉香少許 嘔吐諸藥不
效當借鎮重之藥以墜其逆氣宜薑蘇湯下靈砂丹百
粒俟藥得止却以養正丹半硫丸導之嘔吐津液既去
其口必渴不可因渴而遽以為熱 若陰虛邪氣逆上
窒塞嘔噦不足之病此地道不通也正當用生地黃當
歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘草以補其氣
微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔噦
自不見矣 復有胸中虛熱穀氣久虛發而為嘔噦者