

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十一

明周王朱橚撰

諸氣門

總論

夫陰陽雖大本屬呼吸相通天下一氣爾人生其間大
事毘於陽大怒毘於陰一吐納一動靜何所逃哉與氣
流通而已故氣平則寧氣不平則病內經曰百病生於
氣者則氣緩悲則氣消寒則氣收熱則氣泄恐則氣下

憂則氣亂勞則氣耗思則氣結怒則氣逆蓋榮衛通利則氣舒而不迫此喜所以氣緩也神情慘悴則氣虧而不全此悲所以氣消也經絡凝澁則氣塞而不散此塞所以氣收也腠理開通則氣升而汗出此熱所以氣泄也精却上閉氣還下行此恐所以氣下也心多愁慮則氣散而無歸此憂所以氣亂也內外煩動則氣喘而且汗此勞所以氣耗也心有所止則氣滯而不行此思所以氣結也嗔恚傷甚則氣上而嘔血涎此怒所以氣逆也此九

氣者證雖不同大概診寸口脉伏腦中逆氣是諸氣上衝腦中故上氣面浮腫脹怠其脉浮大不治上氣脉躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗而愈脉洪則為氣上騰虛寧伏匿者生牢强者死喘息低仰其脉滑手足溫者生濇而四末寒者死類者亦死謂形損也人有七情病生七氣七氣者寒熱怒恚喜憂愁或以為喜怒哀憂思悲驚恐皆通也然則均調是氣將何所先氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏為主治

而官桂佐之蓋良法也況夫冷則生氣調氣雖為豁痰亦不可無溫中之劑其間用桂又所以溫中也不然七氣相干痰涎凝結如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之間咯不出嚥不下或中滿艱食或上氣喘急曰氣滯曰氣秘曰氣中以至五積六聚疝癖癥瘕心傷塊痛發即欲絕殆無往而不至矣冷氣者生冷必傷脾風冷入胃或血海虛冷冷則氣生用和劑七氣治中湯沈香降氣湯大沈香丸痰結者三因七氣湯指迷七氣湯易間二

陳湯中滿者痞滿不食水氣腫脹面目俱浮枳殼散加
南木香大流氣飲指迷七氣湯順氣木香散三和散五
皮散加半夏茯苓上氣者氣逆上呼吸喘促分氣紫蘇
湯蘇子降氣湯或嚼蘇合香丸以秘傳降氣湯送下氣
膈者陰陽不和中脘窒塞五膈吐噎食不能下五膈寬
中散和劑七氣湯加木香縮砂間以紅丸子佐之氣滯
者滯於腦膈則脹滿滯於手足則浮腫滯於腰間則墜
痛脹滿用異香散調氣散沉香降氣湯仍與神保丸或

少加蓬朮煎湯利之浮腫用三和散夾生料五苓散或五皮散加桂苓青木香丸局方流氣飲加赤茯苓枳殼腰痛俞山人降氣湯局方七氣湯加橘核或辣桂煎湯調氣散吞青娥丸氣秘者停縮不消腸胃留滯大便不通蘇合香丸夾和感應丸或楊氏麝香丸局方麻仁丸並用枳殼丸送下氣傷之人多有氣不歸元遂成中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰此為氣中不得誤用風藥及通關利腠等症先以薑汁泡湯調蘇合香丸次

用七氣大氣飲加石菖蒲繼之氣順而甦即以治中湯
木香以和其中使氣歸當道若更不能調則氣逆而厥
又有變證喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣擊憂
傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者
其氣急恐傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣亂七證
雖殊無踰於氣又有體虛者外為風冷乘之入於腹中
遂諸疝發則小腹痛痛或繞臍或逆搶心甚則手足厥
冷自汗嘔逆或大小便秘澁也人有血氣心知之性而

無哀樂喜怒之常一種婦人平時任氣易為七情所傷
適月事經季不行一身百病胸臆氣填嘔惡全不入食
則吐痰或一塊如核窒塞膈喉而痛或一塊如卵築觸
心下而痛或腹中塊物動而作痛攻刺腰背時發熱四
肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋漓日就瘦弱
全似虛勞然而穀雖不如果子雜物常喜食之却只是
有孕諺所謂孕婦做得百病者此也用藥但以二陳湯
加縮砂桔梗姜棗烏梅同煎半夏理氣消痰縮砂安胎

順氣此梗以開嚥喉之隔服之自然安平若妄以剛劑
溫胃胎必損病無由愈白濁一節謹勻燥澁二陳湯加
白茯苓以下白丸子可也若夫七情所發逆氣填胸不
惟核膜上氣塞咽喉甚者攻擊滿悶欲絕產後尤多有
之故曰產前安胎產後調氣男女或有嚥喉間核作恙
者觸事勿怒飲食勿冷

一切氣 附論

夫內經云百病所生生於五臟肺之所主獨於氣不足

有飲蓋由虛實故病不同其證亦異怒則氣逆甚則嘔
血及食故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則
心系欲絕肺葉齊舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故
氣消情怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故
氣不行而聚也寒則膚腠閉拒氣道不行氣收而不散
也熱則腠理開榮衛不通故汗大泄也驚則心無所倚
神無所歸慮無所定故氣亂勞則喘且汗外內皆泄故
氣耗思則心有所止氣留不行故氣結

方

七氣丸

出千金方

治七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂

氣愁氣此之為病皆因積聚堅牢心腹絞痛不能飲
食時去時來發則欲死有如禍祟凡寒氣狀吐逆心
滿熱氣狀恍惚眩胃失精怒氣狀上氣不可當熱痛
急盪心氣欲絕不得安息恚氣狀積聚心滿不思食飲
喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席
愁氣狀無故喜怒置物忽忘四方搜索不知其處四

肢腫不得舉止亦治產後中風餘疾

大黃

二兩半

人參

半夏

吳茱萸

柴胡

乾薑

細辛

桔梗

菖蒲

各二分

茯苓

芎藭

甘草

蜀椒

一用桂心

石膏

桃仁

各三分

右為末蜜丸如梧子大每服酒下三丸日三服漸加

至十丸又一方無茯苓芎藭甘草石膏桃仁

七氣丸

一名烏頭丸
出千金方

治七氣積聚不散在於脇腹結

如杯胃中氣隔吐逆不能下食腹脇疼痛喜怒不常

呼吸短氣四肢不舉

烏頭

大黃

各七分

紫苑

半夏

細辛

丹參

茯苓

芎藭

桃仁

石膏

桔梗

菖蒲

一升

桂心

人參

甘草

吳茱萸

防葵

乾薑

蜀椒

各半兩

前胡

右為末蜜丸如梧子大酒服三九日三加至十九一

方去半夏加甘遂三分無丹參甘草

七氣湯

出千金方

治寒氣熱氣憂氣喜氣恚氣怒氣結於膈

中不思飲食五臟不調氣衰力少

乾薑

黃芩

厚樸

一作桂心

半夏

桔萎

一作橘皮

粉甘草

乾地黄

芍藥

各三分

蜀椒

三兩一作桔梗

枳實

五枚

人參

一兩

淨吳茱萸

五合

右咀呋以水一斗煮取三升分三服三日

四七湯

一名大七氣湯出三因方

治喜怒哀思憂恐驚之氣結成

痰涎狀如破絮或如梅核咽喉之間咯不出嚥不下

此七氣所為也中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上

氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 婦人
情性執着不能寬解多被七氣所傷遂致氣填胸臆
或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證
宜服此劑間以香附子藥久取效切不可謂紫蘇耗
氣且新產氣血俱虛不肯多服用之效驗不可殫述

半夏

五兩

茯苓

四兩

紫蘇葉

一兩

厚朴

三兩

右呖咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一個煎至
六分去滓熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不和

清濁相干小便白濁用此藥最為切當婦人惡阻間以紅圓子尤宜服之名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生薑煎服大治七氣并心腹絞痛藥味大甜恐未必能止疼順氣一方治七情所傷腕中不快氣不升降腹肋脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草二兩煎服尤妙切不可謂香附子耗氣此藥大能資血養氣或入煨木香半夏人參一兩