

病  
症  
檢  
錄

馬培之評

痧症指似

光緒戊申年仲春

清江金聲堂發兌

每部實洋壹角貳分

序

人得天地之氣以生故周身一天地也正氣流行邪氣無自而入故清升濁降六氣和平如天地陰陽寒暑之得其正已正氣不足則邪氣乘之清不升濁不降六氣乖舛如冬雷夏雪山崩水竭之失其正已此理之常夫人而知之也獨怪夫感之暫發之暴可以死人者莫甚於痧證而治痧者不診脉不服藥手擦針刺輕者應手立痊重則數日可愈余甚異焉而未敢輕以為信也丁亥春仲男元監初患傷風既似瘧疾續成傷寒兼痢湯藥罔效飲食不沾舌硬唇焦眼光直視醫者皆袖手適

友人金兆行來問疾云得母痧證乎甥某壯年強健霎時昏暈面赤身僵醫者不下藥有奚佳棟者視之微笑曰痧也鍼刺錢刮而愈鄰某亦霎時頭眩眼昏身不蒸熱僵臥不語已至七日醫稱陰痧難療佳棟鍼之而愈因囑余延奚余不可強請視之奚至曰此亦痧證也其始雖不由腹痛然痧固不必盡由於腹痛也幸感冒輕微本原尚固錯投藥餌閉塞邪氣故備見凶象而未有害隨用鍼刺流出黯血睛轉舌軟而脉起矣始食陳米粥幾匙三四日後漸進飲食調息一月而愈余於是而知有痧也知有治痧之法也深叩之謂傳自天台老僧

普淨辨論精微條分縷析經絡不同重輕或異非可襍  
然施治今之視疾者概為感冒風寒表邪發汗薑葱妄  
投何異拯溺者之不援以手而投之石也有識痧者不  
診脉不用藥不耗原氣不費厚資追索病根按穴鍼刮  
刻時平復真有起死回生之功理宜德之尊之而每輕  
之薄之何也服藥者靡費千百而不痊治痧者不費分  
文而即愈雖云小技生死存亡繫焉而輕之薄之是何  
視醫藥甚重而視性命反輕也宜乎醫者不屑為為之  
者多畦丁里媪也苟能醫者為之燭其腠理佐以湯劑  
活人之功可勝道哉嗚呼余非敢附會因其屢治屢驗

且觀書之所自傳言之合乎理乃贅一言以為序庶幾  
福田之一端亦醫者之一助云爾

此序不知作於何人亦不識歲月書孫邱天序輯詳  
叙普淨佳棟殆即出於輯者之手與較之痧脹玉衡  
雖方藥簡略而鍼刮之法實足以補其不逮因并錄  
之道光二年壬午仲春月上浣孫玘識

痧證指微目錄

上部 十六條

中部 十一條

下部 十三條

重證 二十三條

危證 三可治

復發 三不治

經穴圖 三

頭面部 十四穴

胸腹部 九穴 ○ 附穴 一

背部 三十五穴

手部 二十六穴 ○ 附穴二

足部 十二穴

方中引用藥性考

痧證指微

天台山僧普淨著

毘陵 奚佳棟述

逸士 邱天序輯

太倉 玘訂

上部

顛折第一

雙丸第二

蟹眼第三

頭風第四

蛇舌第五

羊舌第六

耳震第七

腦後第八

黑眼第九

白眼第十

黑齒第十一

黑舌第十二

鎖喉第十三

鶴頂第十四

櫻桃第十五

黑疱第十六

鼻準第十七

天頂第十八

顛折

頭搖痛如打折。面帶麻木顛搖。係感外邪。如久

不治。邪走心經。并舌麻木。舌尖吐出。宜用錢蘸香油

刮腦戶穴。

下刮法  
皆同

用針刺風府穴。方用

砂仁

廣藿香

檳榔

木通

蘆粟梗

各等分

河水井水各一碗。燈心二十寸。煎八分服。

凡用鍼只宜淺而橫。不可深而直。恐刺筋骨傷人。又

高粱埽帚即蘆粟梗也。用之亦佳。

雙丸 兩太陽痛。或左太陽痛。或右太陽痛。此係身受寒邪。如久不治。邪走歸經。心肺俱脹。滿身麻木。兩眼酸痛。飲食不思。口吐酸水。宜刮兩懸釐穴。

蠟眼 兩眼睛定。凸出作痛。此感受外邪。并頭眼脹。先用大拇指抵住兩眼眶上。少頃微針印堂穴。又法以指頭兩箇。捏出紅癍。或紫癍。用針淺刺出血為妙。

頭風 頭腦疼痛。係感外邪。先用兩手指捻印堂穴。再針兩絲竹空穴。

蛇舌 舌吐出如蛇舌伸縮不止。係心經觸受外邪。嘔

吐酸水涎痰。先刮兩肩井穴。用針刺舌共上。如久不治。則善笑。笑後心偏而成顛證矣。

羊舌 舌斜伸左邊。則眼亦偏左邊。舌斜伸右邊。則眼亦偏右邊。此係肺經受邪。因脫衣時先脫左。左受邪。先脫右。右受邪。初起心膈閃痛。延久不治。則風氣下降。滿身脹緊多笑。而成癡呆矣。用針刺舌。再刺肩井穴。若斜左。刺左。斜右。刺右。

耳震 耳內響如鐘鳴。鳴即聾。此係腎經受邪。氣脉不順。用針刺風府穴。刮懸釐穴。

腦後

此係腦門受邪。故腦痛。如誤用發表藥。則死。宜

針風府穴刮兩肩井穴

黑眼 眼白變為黑色係受外邪用葦荻艸皮硝各一錢陰陽水煎湯洗二三次即愈若日久不治則邪傳腎經兩目昏暗迎風下淚怕日羞明漸成外障宜刮兩懸釐穴針手小骨空穴

白眼 眼珠白膜遮睛此腎經受邪用前方煎湯洗三五次即愈若延久不治倘遇惱怒傷肝身體發熱眼成內障若將黑珠內外水煎乾則失明矣治法同上  
黑齒 牙齒變為黑色此係腎經受邪日久不治則毒氣入骨大寒大熱而難治宜針水溝穴刮兩臂臑穴

黑舌 舌上變為黑色此係心經受邪日久不治則舌  
焦而硬為不治之證矣宜針舌上中間出並刮兩臂  
臑穴

鎖喉 耳上頸項脹痛此係外皮受邪因卧枕漏風喉  
下脹痛難進湯物針顱息穴可刮可灸左痛刮左灸  
左右痛刮右灸右

鶴頂 眉心紅絕刺刺作痛此係心經邪熱上衝如凸  
起變為黑色者不治微刺印堂穴

舌上生紫癩此係心經受邪刺破出血而愈

黑疱 舌上生黑疱此係心經受邪甚重毒氣衝膈經

刺破血出而愈。稍遲不救。

鼻準

有左鼻塞右鼻塞有兩孔俱塞。此係外皮受傷

用燈心取嚏再刺水溝穴

天頂

頭心脹痛。此係外皮受邪。延久不治。或誤用藥

餌。必成搖頭痲疾。刮前頂穴不愈。用蒜瓣墊穴上以

艾灸七壯

以上諸證用藥與顛折同



心土諸症用藥與顛非同

艾灸六共

胎必如針頭能透時前更次不愈用蒜瓣壁穴心  
天更 更以針刺此針使受罪致久不能透用藥  
用針心更囊再陳水刺穴

鼻準 育衣鼻塞衣鼻塞育兩耳則塞此針使受罰

陳如血出而愈蘇致不效