

叢書集成新編 第四七冊目錄

應用科學類

醫方

活法機要一卷	元 朱震亨著	濟生	一
怪疴單一卷	元 朱震亨著	夷門	七
醫學發明一卷	元 朱震亨著	醫統	一〇
局方發揮一卷	元 朱震亨撰	醫統	二六
雜類名方一卷	元 撰人不詳	濟生	三三
證治要訣類方四卷	明 戴元禮輯	醫統	三八
服鹽藥法一卷	清 孫星衍錄	岱南	六五
治蠱新方一卷	清 路順德纂	藝海	六七
素女方一卷	撰人不詳	平津	七八
鍼灸			
鍼灸甲乙經十二卷	晉 皇甫謐撰	醫統	八〇
鍼經摘英集一卷	元 撰人不詳	濟生	一六三
鍼經節要一卷	元 撰人不詳	濟生	一六七
法醫學			
宋提刑洗冤集錄五卷	宋 宋慈編	岱南	一七一
生理學			
全體新論十卷	泰西合信著	海山	一九二
衛生			

延壽第一神言一卷

攝生消息論一卷

食色神言一卷

農業

齊民要術十卷附雜說、提要

農書三卷

耕織圖詩一卷附附錄

農桑輯要七卷附四庫提要

農桑衣食撮要二卷附四庫提要

農書三十六卷附四庫提要、補正

農說一卷

沈氏農書一卷

農具

耒耜經一卷附四庫提要

農作物

理生玉鏡稻品一卷

種芋法一卷

木棉譜一卷

植樹

宋 愚谷老人編

元 丘處機著

明 龍遵敘撰

後魏 賈思勰撰

宋 陳敷撰

宋 樓璘撰

元 司農司撰

元 魯明善撰

元 王楙撰

明 馬一龍輯

清 錢爾復訂正

唐 陸龜蒙撰

明 黃省曾撰

明 黃省曾著

清 褚華纂

漸西 二三五

知不足 三二三

知不足 三三一

聚珍 三二四

聚珍 三六二

聚珍 三七一

寶顏 四八三

學海 四八七

夷門 四九三

百陵 四九五

百陵 四九六

藝海 四九八

種樹書二卷附農桑撮要	唐 郭橐駝著	夷門 五〇二	山家清供二卷	宋 林洪著	夷門 五八二
種樹書一卷	元 俞宗本著	漸西 五一〇	飲食須知八卷	元 賈銘著	學海 五八八
果 木			易牙遺意二卷附四庫提要	明 韓奕編次	夷門 六〇八
荔枝譜一卷	宋 蔡襄述	百川 五二五	醒園錄二卷	清 李化楠手抄	函海 六二〇
嶺南荔枝譜六卷	清 吳應逵撰	嶺南 五一七	養小錄三卷	清 顧仲撰	學海 六三四
橘錄三卷	宋 韓彥直撰	百川 五二七	烹 飪		
園 藝			饌史一卷	元 撰人不詳	學海 六四九
梅品一卷	宋 張功甫撰	夷門 五三一	飲 料		
老圃良言一卷	明 巢鳴盛述	學海 五三二	煎茶水記一卷	唐 張又新撰	百川 六五二
菊譜一卷	明 周履靖編正	夷門 五三三	水品全秩二卷附四庫提要	明 徐獻忠著	夷門 六五五
蘭譜奧法一卷	明 周履靖校正	夷門 五三七	湯品一卷附四庫提要	明 周履靖梓	夷門 六六三
蠶 桑			羹泉小品一卷	明 田藝衡撰	寶顏 六六五
蠶書一卷	宋 秦觀著	知不足 五三九	酒		
蠶經一卷	明 黃省曾撰	百陵 五四一	酒經三卷附四庫提要、補、補正、補辨	宋 朱翼中著	知不足 六七〇
廣蠶桑說輯補二卷	清 沈公練著	漸西 五四三	酒譜一卷附四庫提要、辨證	宋 寶萃撰	百川 六八二
蠶桑說一卷	清 仲昂庭輯補	漸西 五六一	酒類補三卷	明 陳繼儒采輯	海山 六八四
蠶事要略一卷	清 趙敬如撰	漸西 五六六	酒史二卷	明 馮時化編	寶顏 六九六
養魚經一卷	清 張行孚綴	百陵 五七一	糖		
害蟲驅除	明 黃省曾撰		糖霜譜一卷	宋 王灼撰	學津 七一一
捕蝗考一卷附四庫提要	清 陳芳生纂	學海 五七三	茶		
捕蝗集要一卷	清 俞森集	守山 五七七	茶經二卷附四庫提要	唐 陸羽著	百川 七二三
伐蛟說一卷	清 魏廷珍撰	借月 五七九	宣和北苑貢茶錄一卷附四庫提要、補正	宋 熊蕃撰	讀畫 七一九
本心齋蔬食譜一卷	宋 陳達叟著	百川 五八〇			

茶品要錄一卷附四庫提要

補辨

宋 黃 儒著 夷門 七二六

茶錄一卷

宋 蔡 襄撰 百川 七二九

東溪試茶錄一卷

宋 宋子安集 百川 七三一

北苑別錄一卷

宋 趙汝礪撰 讀畫 七三三

茶疏一卷

明 許次紆著 寶顏 七三七

茶寮記一卷附附錄

明 陸樹聲著 夷門 七四二

茶董補二卷

明 陳繼儒采輯 海山 七四四

香

香譜二卷附四庫提要

宋 洪 芻撰 學津 七五一

鼻 煙


勇盧閒話一卷

清 趙之謙撰 仰視 七六二

織 物

蜀錦譜一卷

元 費 著撰 墨海 七六八



活法機要

朱靈亨 著

活法機要 東垣與家珍及劉守真病機保命大同而小異

活法機要 東垣與家珍及劉守真病機保命大同而小異

者 大黃一兩
右劉細好酒一大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用
將酒分一服頓服之如未止再服以利為度復服芍藥湯和
之劑止再服黃芩芍藥湯和之以微其毒也
右劉細好酒一大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用
將酒分一服頓服之如未止再服以利為度復服芍藥湯和
之劑止再服黃芩芍藥湯和之以微其毒也
右劉細好酒一大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用
將酒分一服頓服之如未止再服以利為度復服芍藥湯和
之劑止再服黃芩芍藥湯和之以微其毒也

木香 橫痃各壹分
右為末每服五錢水煎
如感胃氣方在室內油煎條下
地榆湯治油煎條下
右為末每服五錢水煎
如感胃氣方在室內油煎條下
地榆湯治油煎條下
右為末每服五錢水煎
如感胃氣方在室內油煎條下
地榆湯治油煎條下

害故破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證治人知有發表不知有攻裏和解此汗下和三法也諸證不差察傷風肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能分入於裏為破傷風之候者瘡上及皮膚者白如瘡口閉塞氣難通並破傷風易為瘡結熱甚則生風也故表脈浮而無力太陽也在表宜汗脈長而有力陽明也在裏宜下脈浮而弦小者少陽也在表宜汗脈在裏宜和若明此三法而治不中病者未之有也

治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎 藁本 當歸

右為細末每服五錢水煎量腹加減用之熱則加大黃二兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過熱甚更加黃芩二兩

白朮 黃耆 防風 二兩 右為細末每服五錢水煎

破傷風初起小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用黃芩湯三服後用大黃黃芩湯下之

右為細末水煎 川芎 防風 羌活 黃芩 大黃 各一兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

子大同左龍九一敷每服加一九漸加服至利為度若利後更服後藥若指瘡不已亦宜服後藥羌活湯也

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末水煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

知母 一分 黃耆 五分 半夏 二分 右為細末每服半兩生薑薑同煎

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

右為細末每服半兩生薑薑同煎 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白朮 黃耆 防風 二兩

如熱厥頭痛加白芷三兩石膏二兩知母一兩半
如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎
四物湯治諸虛 方已載元戎方中
紅花散治婦人產後血暈無脈月事不調逐年乾血氣皆治之
乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花 蒲黃 炒各等分
右為細末每服半兩酒煎和滓溫服
如衣不下別末榆白皮煎湯調下半兩立効
當歸 羌活 炒 右為細末酒調二錢
又一方好醋醋滓末之小便酒調下
治胎衣不下蛇退皮炒焦細末酒調下如胎衣在腹另破榆白
皮末同煎服立下
生地黃 諸見血無寒則血下吐血而血虛屬於熱
生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬
黃耆 考藥 甘草 黃芩 已上各等分
右為細末每服一兩水煎服身涼風每一兩加桂半錢
麥門冬 生地黃 各等分
右到每服一兩水煎 又明血先朱砂粉 次木香黃連
大便結下之大黃芒硝甘草生地黃
清軟梔子黃芩黃連可選而用之
帶下證
赤者熱入小腸白者熱入大腸其本濕熱結于脉不散故為
赤白帶下也寬也結也也而病熱不散先以十稔湯下
之後服苦練九六玄胡散調下之熱去濕除病自愈也
月事不來先服降心火之劑後服烏方中五補丸後以衛生
湯治脾養血氣可也
苦練 伴酒 黃香 妙 當歸 各等分
右為細末酒調九如桐子大每服五十九空心酒下
白芍藥 當歸 各二黃香 三兩甘草 一兩
右為細末水煎空心 如虛者加人參一兩
大頭風證
夫大頭風證者陽明邪熱太甚實少陽相火而為之也
在小腸或在陽明或在太陽其腫勢在何部分隨經取之
濕熱為腫木聲為痛此邪見於頭多在前後先出治之太不
活法機要

宜藥速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此
病是自外而之內者是血病況頭部分受邪見於無形迹之
部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上者無形之部分既著
無形無所不至若用重劑速下過其病難已難無緣藥若急
服之或食前或飯後服皆失緩則藥不能得除病當徐徐浸
清無形之邪也或藥性味形勢變要不能離緩是也
且後急者謂緩劑已滿邪氣入於中是到陰部染於有形質
之所若不速去則損陰也此終始知為客邪當急去之是治
客以急也 且治玉當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急治
之不能解紛而益亂也 治客以急者謂陽分受陰邪除分
受陽邪此客氣急除去之也
假令少陽陽明為病少陽為邪出於耳前後也陽明為邪者
首大腫也先以黃芩黃連甘草湯通炒過煎少少不住服
或刺耳再用煨桑葉煎子新瓦上炒香同大黃煎成去滓內芒
硝俱多等分亦不時時之無令飲食在前得微利及邪氣已
只服前藥如不已再同前次服之服大便利邪氣則止
如陽明湯者加石膏 如少陽湯者加黃芩
陽明行經升麻方藥者根甘草
太陽行經羌活防風之類
大陽行經羌活防風之類
治大頭風如神 方在後集內附
瘧證
夏傷於暑秋必病瘧瘧傷而瘧者近而暴傷之重者遠而疾瘧
瘧者久瘧也是知夏傷於暑暑熱閉藏而不能發出于外邪
氣內行至秋而發為瘧也何經受之隨其動而取之有中三
陽者有中三陰者經中邪氣其證各殊同傷寒論之也五藏
皆有瘧其治各異在太陽經謂之風瘧治多汗之在陽明經
謂之熱瘧治多下之在少陽經謂之風瘧治多汗之在陰
經則不分三經按謂之濕瘧當從大陰經論之
治瘧疾起前發頭痛項強肢冷汗惡寒有汗者宜用桂枝湯
桂枝 羌活 防風 甘草 各半兩
右為細末水煎 如吐者加半夏等分
治瘧病頭痛項強肢冷汗惡風無汗者宜用麻黃湯
麻黃 羌活 防風 甘草 各半兩
右為細末水煎 如吐者加半夏等分
治瘧疾如前證而多汗者宜用白虎湯
麻黃 一兩 炙甘草 二兩 石膏 五兩 知母 三兩
右為細末水煎 如吐者加半夏等分
三

右為末水煎桃仁散血凝肝夜發乃陰經有邪此湯散血中
風寒也
治瘧疾寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜用
白虎湯和之
半夏 四分 柴胡 一兩 石膏 二兩 知母 各四兩
右為細末水煎
從卯至午時發者宜大柴胡湯下之
從午至酉時發者知其邪氣在內也宜大承氣湯下之
從酉至子時發者或至寅時者知其邪氣在血也宜桃仁承
氣湯下之微利後更以小柴胡湯制其邪氣可也
熱證
有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴發而為熱
者乃久不宣通而致也有服溫藥而為熱者有惡寒戰慄而
熱者蓋諸熱之屬心火之象也治法小熱之氣涼以和之大
熱之氣寒以取之其熱之氣則汗發之發之不足則逆制之
制之不足求其屬以衰之若者以治五藏五藏屬陰而居於
內者以治六府六府屬陽而在於外故內者下之外者發
之又宜養血益陰其熱自愈
如煩渴熱瘧瘧疾病心服地黃丸食後服防風黃連散
朱胡 人參 黃芩 甘草 各一兩 滑石 三兩
大黃 當歸 芍藥 防風 各半兩
右為細末生薑同煎 如瘧實咳嗽加半夏
治大瘧黃米穀完出驚悸溺淋閉數血衄血自汗頭
痛積熱肺痿
黃連 黃芩 山梔子仁 各一兩
右為細末滴水為丸桐子大溫水下
如大便結實加大黃自利不用大黃
如中外有熱者作散對服名解毒湯
如腹滿嘔吐欲利者解毒湯內加半夏茯苓厚朴各三錢
生薑同煎 如白膿下痢後重者加大黃三錢
治瘧方在難知內附 加減于后
若咽噤不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荆芥穗半兩
若欬而嘔者加半夏半兩生薑煎
若鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩
若淋瀝者加滑石四兩茯苓一兩

治熱攻上不利於下陽狂奔走罵詈不避親疎
大黃 當歸 甘草 牛黃 朱砂 麝香 雄黃 硫黃 礞石 硝石 芒硝 枳實 厚朴 木香 丁香 沉香 乳香 沒藥 蘇合 安息 阿膠 龜板 虎骨 狗寶 猴棗 熊膽 蛇膽 蜈蚣 蟾蜍 麝香 牛黃 朱砂 麝香 雄黃 硫黃 礞石 硝石 芒硝 枳實 厚朴 木香 丁香 沉香 乳香 沒藥 蘇合 安息 阿膠 龜板 虎骨 狗寶 猴棗 熊膽 蛇膽 蜈蚣 蟾蜍

右為細末煉蜜為丸如皂子大新水化下
治表熱惡寒而渴陽明證白虎湯也
若熱如火燒而熱以手取之不甚熱為肺熱也目睛赤煩燥
或引飲渴者一味主之

右兩脇下肌熱脈浮者柴胡飲子主之
若脇肋熱或一身盡熱者或日晡肌熱者皆為熱也四順
飲子主之

若夜發熱主行陰力血熱也四順飲子桃仁承氣湯而用之
若晝則明夜則暗語四順飲子證
若發熱雖無脈熱亦為柴胡證
晝則行陽二十五度藥也夜則行陰二十五度藥也

夜則行陰二十五度藥也夜則行陽二十五度藥也
治眼之病在府則為表當除風散熱在臟則為裏宜養血安神
暴發者為表而治之安病者在裏而難愈除風散熱者為裏
九主之養血安神者定志丸婦人則乾地黃丸主之

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各一兩

右吹咀水煎食後溫服
如大便秘澀加大黃一兩
如煩甚者加當歸地黃各一兩
如煩燥不得眠睡加梔子一兩

治眼久病皆因發而久不愈者
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

右為細末水煎
治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

治眼暴赤赤腫眼痛
防風 羌活 黃芩 黃連 已上各等分 地黃

消渴之疾三焦受病也有上消有中有消有下消者肺也
飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜
滋潤其燥
消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中
焦也宜下之
消腎者初發為淋淋瀝下如膏油之狀至病成而面色黃
黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以肅清分其
清濁而自愈也

黃連末壹斤生地黃自然汁白蓮花藕汁牛乳汁各壹斤
右將汁熬成膏子刻黃連末為丸如桐子大每服二十九少呷
溫水送下日進十服渴病立止

治消渴方在發明內附

五臟六腑皆有經脈云平治權衡去宛便閉開胃健脾府平
治權衡者察脈之浮沉也去宛便閉者疏滯胃也開胃健脾
者發汗也察脈者利小便也蓋脈之病治以藥藥之病治以
服水服之病當開胃健脾利小便也

治水腫蠱結去頭至與胃同研露七日曝乾為末淡酒調
下暑月用佳

又方藥一斗鍋內入水上有四指用大戟并根煎盡之通盜令
之煮熟為度去大戟不用旋旋吸無時不寒決愈神効

瘡瘍證
瘡瘍者人之病分內外以治其本若其脈沉實當先疏其內
以絕其源也其脈浮太當先托裏邪氣入內也有內外之
中者邪氣至盛過絕經絡故發癰腫此因失托裏及失疏導
又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疏導行榮衛之三法
內之外者其脈沉實發熱煩躁外無癰亦痛深於內其邪氣
深矣故先疏導疏導以絕其源外之內者其脈浮數癰腫在
外形發外顯邪氣極而內行故先托裏也內外之中者外
無癰惡之氣內亦脈沉實通知其邪在經當和榮衛也用此三
法之後雖未差必無變證亦可使邪氣極而內行也

肉不變色根緊深大痛遠在內臟肺秘結當急疏利之
黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

黃連 山梔子 芍藥 當歸 枳實 木香 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

甘草已上各一兩
右為末水煎先喫一服次後加大黃一錢每服加一錢以
利為度

如有熱證止服黃連湯大便秘澀則加大黃
如無熱證止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃
秘澀止服黃連湯大便秘澀則加大黃

金銀花 赤芍藥各半兩 大黃 七分半 芩實 大者
當歸 甘草 枳實 各三分
右為鹿尾水酒各半煎
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
消石四兩 乳香 輕粉 各一兩 小豆粉 一分 寒水石 三兩
一方改小豆粉為定粉一兩
右為細末乾貼
治火燒火爛大痛
寒水石 生肌散 補硝 青黛 各一兩 輕粉 一分
右為細末新水或油調塗立止
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
乳香 沒藥 各三兩 當歸 半兩
右為細末每服五錢溫酒調下
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
乳香 黃連 黃芩 黃蘗 大黃
右為細末新水調成膏用紙綿吊上攤貼
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
死胎衣不下至死者以童子小便調下 錢取下惡物神効
硫黃 明礬 各四兩 花蕊石 一斤
右一味拌勻用紙筋和膠泥固着童子一個入藥內密泥
封口了焙乾安在四方磚上 磚上書八卦五行字 用炭一秤
圍燒自己午時從下生火直至經宿火灰又經宿後冷取研
極細磁盒內盛
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
黃連 白朮 白芨 丹各一兩 輕粉 一分
龍腦 麝香 各半兩 另研 蜜化僧 一兩
右為細末和勻乾粉或紙上以膏貼之
定粉 蜜化僧 白朮 乾胭脂 各半兩
右為細末乾粉用之
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
蜜化僧 花蕊石 二兩 同煎末 白龍骨 各一兩
乳香 另研 輕粉 各一兩 黃連 各二分半
右為細末和勻乾粉
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
活法機要

銅礬 各兩 硃砂 各半兩 當歸 各半兩
右為細末燒飯和作麥糰子每用刺不覺痛者須刺血出
方始藥在內以膏貼之
用藥加減
如發背丁腫膿潰前後虛而頭痛於托裏藥內加五味子
恍惚不寧加人參茯苓神 虛而發熱者加地黃括萎根
潮熱者加柴胡地骨皮 渴不止者加知母亦小豆
虛煩者加拘杞天門冬 自利者加厚朴
腫多者加當歸川芎 痛甚者加芍藥乳香
肌肉生者加白欬官桂 有風邪者加獨活防風
心驚悸者加丹砂 口目瞤動者加羌活細辛
喉痛者加丁香薑黃桑葉 痰多者加半夏陳皮
金銀花 連翹 黃芩 甘草 各半兩
右咬咀用酒一升同入甕瓶內閉口重湯內煮三兩時辰取
出去滓頓服之
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
雄黃 硃砂 各半兩 不去皮研末去皮半兩
右一味再同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻細少上惡
肉自去矣
瘰癧證
大瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頰
或在頸下連及喉嚨謂之瘰癧或在背脊之側或在兩脇
皆謂之馬刀手足少陽主之
治瘰癧前後耳有之或耳下頰下有之皆瘰癧也桑椹二錢
熟黑色者以布裂取自然汁不犯銅鐵以文武火慢熬作薄
膏子每日白沸湯點一匙食後日三服
連翹 雙料花 各半兩 大黃 各兩 甘草 各半兩
右咬咀水煎服後十餘日可於臨臥穴灸二七壯服五六
日方効在他經者又方加大黃木通五兩知母 母五兩雄
黃七分攪半兩減甘草不用同煎藥為細末熟水調下三
五錢服之
連翹 雙料花 各半兩 大黃 各兩 甘草 各半兩
右為細末水煎服此藥無効多不能連服宜待歲月之
久除也

咳嗽證
咳嗽無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾動
而為痰也咳嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而致動於脾
濕因於脾而為痰也治咳嗽者治痰為先治痰者下氣為上
以兩星半夏勝其痰而嗽自息也枳殼陳皮利其氣而痰
自下也痰而能食者大氣清微下之痰而不能食者厚朴
湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽嗽小柴胡湯四兩加石
膏兩知母半兩用之冬月嗽而發熱者謂之寒嗽小青龍
加杏仁服之寒嗽生薑湯寒嗽加橘皮湯寒生薑胡桃治無
痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之
治一切瘡毒生肌定血辟風邪
郁李仁 青皮 去白陳皮 去白檳榔 木香
杏仁 去皮馬兜鈴 炒人參 廣茂 當歸
澤瀉 茯苓 苦參 各半兩 防己 五兩
牽牛 取頭刺查兩半
右為細末生薑汁調糊為丸桐子大生薑湯下
治咳嗽諸方在家珍內并寶鑑內者更宜選用而用之
虛損證
虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則增陽虛感熱則陰虛故損則
自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損
陰虛則陽盛故損則自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾
則不可治也自上而損者一損於肺故皮聚而毛落一損損
於心故血脈虛弱不能榮於臟腑婦人則月水不通三損損
於胃故飲食不為肌膚也自下而損者一損損於腎故骨痿
不能起於床二損損於肝故筋緩不能自收持三損損於脾
故飲食不能消也故心脾損則色萎肝腎損則形瘦脾胃
損則穀不化也
治肺損皮聚而毛落宜益氣四逆散方在難知內附
治心脾損皮聚而毛落血脈虛弱婦人月水不調宜益氣和
血四逆散方在難知內附
治肺損及胃損飲食不為肌膚宜益氣和血調飲食四逆散
方在前元戎內附
治腎損骨痿不能起於床宜益氣和血調飲食四逆散
牛膝 酒浸車前 杜仲 剉炒 桑寄生 黃芩 綠子

活法機要

防風 諸虛百損 破故紙 沙苑白茯苓
右等分爲細末酒煮腰子爲丸每服五十九丸空心溫酒
下如腰痛不起者服之甚効
治陽虛陰虛肝腎不足室虛損形瘦無力面多黃而無常
色宜早服之

右爲細末酒煮腰子爲丸每服五十九丸至百丸諸飲
下若加五味子爲腎氣丸述類象形神品藥也
如陽虛陰虛心肝不足及男子婦人面無血色食少嗜卧肢
體困倦宜八味丸
如形骸瘦弱無力多困未如陰陽先損夏月宜地黃丸春秋
宜腎氣丸冬月宜八味丸

治病久虛弱不能食
吐證 吐證有二氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣
主內而不出中焦在中脘上通於天氣下通於地氣主腐熟水穀
下焦在臍下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於
氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐渴飲飲水大
便結燥氣上衝而胃脘痛其治當降氣和中中焦吐者皆從
於積有陰有陽食與氣相搏爲積而痛其脈浮而洪其證或
先痛而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積積去
木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脈沉而遲其證
朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便溏而不通治法當以毒
藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大
便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和中
桔梗 白木 各半 半夏 乾薑 陳皮 白茯苓
枳實 厚朴 各半 麥冬 各半 各宜用
右咳吐血前取清調木香散二錢隔夜空腹服之後氣漸下
吐漸止然後去木香散加芍藥二兩麥冬兩半每一料中叩
算加之
如大便燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利再服
前藥補之
如大便復結依前再微下之
木香 檳榔 各等分
右爲細末前藥調服

治中焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和中
桔梗 白木 各半 半夏 乾薑 陳皮 白茯苓
枳實 厚朴 各半 麥冬 各半 各宜用
右咳吐血前取清調木香散二錢隔夜空腹服之後氣漸下
吐漸止然後去木香散加芍藥二兩麥冬兩半每一料中叩
算加之
如大便燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利再服
前藥補之
如大便復結依前再微下之
木香 檳榔 各等分
右爲細末前藥調服

活法機要

治心胃氣痛吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即
與前病藥同方在元氣方內附 其加減于后
春夏再加黃連 秋冬再加厚朴 或兩
如治風於春秋所加黃連厚朴外更加黃連茯苓各一兩半
如治風瀉不愈者依春秋加減外更加人參黃連茯苓各一
兩半 如失精者加黃連白茯苓各爲輔
如肝之積加柴胡蜀椒爲輔
如心之積加黃連人參爲輔
如脾之積加黃連人參爲輔
如腎之積加黃連茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
心痛證
諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛
甚則煩燥而吐額自汗出知爲熱也其脈浮大而洪當灸大
谿及足陽明表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗
通身而出者愈也若單服金鈴子散則愈痛止服枳木丸去
其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘
久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以黃連九利之
利後以藥水湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷
汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以不附湯溫
之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒
暴病非熱也

治心胃氣痛吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即
與前病藥同方在元氣方內附 其加減于后
春夏再加黃連 秋冬再加厚朴 或兩
如治風於春秋所加黃連厚朴外更加黃連茯苓各一兩半
如治風瀉不愈者依春秋加減外更加人參黃連茯苓各一
兩半 如失精者加黃連白茯苓各爲輔
如肝之積加柴胡蜀椒爲輔
如心之積加黃連人參爲輔
如脾之積加黃連人參爲輔
如腎之積加黃連茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
心痛證
諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛
甚則煩燥而吐額自汗出知爲熱也其脈浮大而洪當灸大
谿及足陽明表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗
通身而出者愈也若單服金鈴子散則愈痛止服枳木丸去
其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘
久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以黃連九利之
利後以藥水湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷
汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以不附湯溫
之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒
暴病非熱也

治心胃氣痛吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即
與前病藥同方在元氣方內附 其加減于后
春夏再加黃連 秋冬再加厚朴 或兩
如治風於春秋所加黃連厚朴外更加黃連茯苓各一兩半
如治風瀉不愈者依春秋加減外更加人參黃連茯苓各一
兩半 如失精者加黃連白茯苓各爲輔
如肝之積加柴胡蜀椒爲輔
如心之積加黃連人參爲輔
如脾之積加黃連人參爲輔
如腎之積加黃連茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
心痛證
諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛
甚則煩燥而吐額自汗出知爲熱也其脈浮大而洪當灸大
谿及足陽明表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗
通身而出者愈也若單服金鈴子散則愈痛止服枳木丸去
其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘
久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以黃連九利之
利後以藥水湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷
汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以不附湯溫
之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒
暴病非熱也

治心胃氣痛吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即
與前病藥同方在元氣方內附 其加減于后
春夏再加黃連 秋冬再加厚朴 或兩
如治風於春秋所加黃連厚朴外更加黃連茯苓各一兩半
如治風瀉不愈者依春秋加減外更加人參黃連茯苓各一
兩半 如失精者加黃連白茯苓各爲輔
如肝之積加柴胡蜀椒爲輔
如心之積加黃連人參爲輔
如脾之積加黃連人參爲輔
如腎之積加黃連茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
心痛證
諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛
甚則煩燥而吐額自汗出知爲熱也其脈浮大而洪當灸大
谿及足陽明表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗
通身而出者愈也若單服金鈴子散則愈痛止服枳木丸去
其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘
久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以黃連九利之
利後以藥水湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷
汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以不附湯溫
之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒
暴病非熱也

治心胃氣痛吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即
與前病藥同方在元氣方內附 其加減于后
春夏再加黃連 秋冬再加厚朴 或兩
如治風於春秋所加黃連厚朴外更加黃連茯苓各一兩半
如治風瀉不愈者依春秋加減外更加人參黃連茯苓各一
兩半 如失精者加黃連白茯苓各爲輔
如肝之積加柴胡蜀椒爲輔
如心之積加黃連人參爲輔
如脾之積加黃連人參爲輔
如腎之積加黃連茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
心痛證
諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛
甚則煩燥而吐額自汗出知爲熱也其脈浮大而洪當灸大
谿及足陽明表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗
通身而出者愈也若單服金鈴子散則愈痛止服枳木丸去
其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘
久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以黃連九利之
利後以藥水湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷
汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以不附湯溫
之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒
暴病非熱也

活法機要


右同爲細末與前藥一匙拌勻酒糊爲丸每服三十九丸至
百九空心溫酒下凡氣帶下皆屬於風全蠲治風之聖藥
苗香若練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導爲用也
治寒厥及小腹痛不可忍者
苦練 苗香 各壹兩 黑附子 壹兩 炮炙 剉碎
右用酒二升煮酒盡爲度或乾或陰乾搗爲細末每一兩
藥末入 全蠲 拾捌个 玄胡 伍个 丁香 拾伍个
右共爲細末酒糊爲丸每服百九空心酒下如痛甚
煎當歸入酒下大効

右同爲細末與前藥一匙拌勻酒糊爲丸每服三十九丸至
百九空心溫酒下凡氣帶下皆屬於風全蠲治風之聖藥
苗香若練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導爲用也
治寒厥及小腹痛不可忍者
苦練 苗香 各壹兩 黑附子 壹兩 炮炙 剉碎
右用酒二升煮酒盡爲度或乾或陰乾搗爲細末每一兩
藥末入 全蠲 拾捌个 玄胡 伍个 丁香 拾伍个
右共爲細末酒糊爲丸每服百九空心酒下如痛甚
煎當歸入酒下大効

右同爲細末與前藥一匙拌勻酒糊爲丸每服三十九丸至
百九空心溫酒下凡氣帶下皆屬於風全蠲治風之聖藥
苗香若練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導爲用也
治寒厥及小腹痛不可忍者
苦練 苗香 各壹兩 黑附子 壹兩 炮炙 剉碎
右用酒二升煮酒盡爲度或乾或陰乾搗爲細末每一兩
藥末入 全蠲 拾捌个 玄胡 伍个 丁香 拾伍个
右共爲細末酒糊爲丸每服百九空心酒下如痛甚
煎當歸入酒下大効

右同爲細末與前藥一匙拌勻酒糊爲丸每服三十九丸至
百九空心溫酒下凡氣帶下皆屬於風全蠲治風之聖藥
苗香若練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導爲用也
治寒厥及小腹痛不可忍者
苦練 苗香 各壹兩 黑附子 壹兩 炮炙 剉碎
右用酒二升煮酒盡爲度或乾或陰乾搗爲細末每一兩
藥末入 全蠲 拾捌个 玄胡 伍个 丁香 拾伍个
右共爲細末酒糊爲丸每服百九空心酒下如痛甚
煎當歸入酒下大効

右同爲細末與前藥一匙拌勻酒糊爲丸每服三十九丸至
百九空心溫酒下凡氣帶下皆屬於風全蠲治風之聖藥
苗香若練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導爲用也
治寒厥及小腹痛不可忍者
苦練 苗香 各壹兩 黑附子 壹兩 炮炙 剉碎
右用酒二升煮酒盡爲度或乾或陰乾搗爲細末每一兩
藥末入 全蠲 拾捌个 玄胡 伍个 丁香 拾伍个
右共爲細末酒糊爲丸每服百九空心酒下如痛甚
煎當歸入酒下大効



怪病單

元朱丹溪著

明周履靖梓

治人鼻中毛出晝夜長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去更生此因食猪羊血過多而然也用礪砂乳香飯為丸水下十粒早晚各一服病去乃止

一人忽覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃離魂也用礪砂人參茯苓濃煎服真者氣爽而假者即化

治遺身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血癰用赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯數盞即愈

治人眼前常見禽蟲飛去捉之即無乃肝膽經為疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子各一兩為末每水煎二錢和滓服日三服

治人眼珠垂下至鼻大便血出名肝脹用羌活水煎數服即愈

怪病單

治人腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲服雷丸即愈

一人飲油五升方始快意乃髮入胃血變化為蟲也用雄黃五錢水調服

治人腹中有虫如蟹走於皮下作聲如兒啼為筋肉之化用雷丸雄黃等分為末搽猪肉上炙而食之即愈

一人因着艾灸訖火痴便落瘡內鮮血片片如胡蝶樣騰空飛去痛不可忍此是血肉俱熱用大黃芒硝等分為末水調下微利即愈

一人臨卧忽渾身虱出約五升血肉俱壞而舌尖血出不止用鹽醋湯飲十數次即愈

治人眼赤鼻張大喘渾身出斑髮如銅鐵絲硬乃目中熱毒氣結於下焦用白凡滑石各一兩水三碗煎至一碗半不住口飲盡乃效

一人卧於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病如說某物即以其肉與看與食之失他物望也睡中流出饒蟻病即愈

治人手十指斷壞唯有筋連無節肉內虫出如燈心長數寸遍身綠毛名血餘用茯苓胡黃連煎服即愈

一人遍身皮底渾渾如波浪聲痒不可忍抓之血出不能止名氣奔用人參苦枝青藍細辛各一兩水二碗煎十數沸飲盡便愈

治眼內白皆俱黑見物依舊毛髮直如鉄條不語如醉名血漬用五靈脂酒調下二錢愈

治人口鼻中氣出盤旋不散凝似黑蓋過十日

漸漸至肩與肉相連堅勝鉄石無由飲食多

因瘡後得之用澤蘭水煎日飲三盞五日愈治頭面發熱有光色他人手近如火炙用蒜汁半兩酒調下吐物如蛇遂安

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌肉不可治矣急用三稜莪朮各五兩為末分三服酒調下

治夜有醉者口渴誤吞水蛭腹痛黃瘦不進飲食用小死魚三四箇猪脂煎鎔攪勻入巴豆十粒碎爛和田中乾泥丸如菉豆大以田中冷水吞下一丸泄下為度

治人忽然氣上喘不能語口中涎流吐逆齒皆搖動氣出轉大即問絕名傷寒併熱霍亂用大黃人參各五錢水三盞煎一盞服

一人口內生肉毯有根線長五寸餘吐毯出方可飲食以手輕捏痛徹於心水調生射香一錢頻頻服之三日根化而愈

治人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜自愈

治人面上及遍身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血冬則近脛名白寒瘡多食魚雞茹非即愈

治人脅破腸出臭穢急以香油抹腸送入即不出又以人參枸杞子煎湯淋之皮自合喫猪腎粥十日愈

一人小便中出屎大便出尿名交腸用舊幘頭燒灰酒下五分愈

治玉莖硬不痿精流無歇時如針刺裡之則脫
乃為腎漏疾用韭子破故帛各一兩為末每
三錢水煎日三服即止
一人身及頭面肉腫如蛇狀用雨濕磚上青苔
一錢水調塗立消
治人大腸內虫出不斷斷之復生行坐不得用
鶴虱末水調服五錢自愈
治蚊龍瘻用寒食飯三升每食五合日三服吐
出蚊龍而愈
治鼻腥臭水流以碗盛而視之有如鉄色蝦魚
如米大走躍捉之即化為水此肉壞矣食雞
肉一日二次不過一月而愈
治兩足心凸如腫硬如釘脛骨生辟孔流髓身
發寒戰惟思飲酒此肝腎氣冷熱相吞用川
烏炮為末付之內煎韭菜湯服之愈
治四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用
黃蘆酒浸一宿焙乾為末酒調下二錢多服
即安
一人咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起有竅出
臭氣用臭橘葉煎服愈
有小兒身上發瘡初生如魚胞又如水晶碎則
水流用蜜陀僧羅極細粉之
一兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土坑卧一宿
即長皮又方白早米粉乾撲於上候生皮乃
止
治人項上生瘡如櫻桃有五色瘡破即頂皮斷
逐日飲牛乳自消

治人寒熱不止四肢如石擊之如鐘聲日漸消
瘦用萊菔木香等分水煎一二服即愈
一人大腸頭出寸餘候乾自退落又名截腸病
用芝麻油器盛坐之飲大麻子汁數升愈
治人腹中如鉄石臍中水出旋變作虫行之狀
連身匝皮痒痛不忍扒掃不盡濃煎蒼朮浴
之又以蒼朮加麝香水調服之
一人眉毛搖動目不能視喚之不應但能飲食
用蒜三兩取汁酒調下即愈
一人毛竅節次血出少間不出即皮脹如鼓口
鼻眼目俱脹合名脉溢用生薑汁并水各一
二盞服之即安
人面瘡 昔人患此于臂上滴酒瘡口中即面
赤與物食之即肉脹獨以貝母付之則飲眉
閉口若有苦楚之狀乃煎貝母湯以葦筒灌
之數日成甲而愈
一婦人年二十餘腰生一竅口中所款膿血與
竅相應而出此肺瘻也用人參黃芪當歸加
退熱排膿之劑而愈
治患蛇瘻乃蛇精及液沾菜上人候食之腹內
成蛇或食蛇亦有此証其人常飢食之即吐
用赤頭蜈蚣一條炙為末分二服酒下
蛇瘻痛有未止或食蛇即痛用雞屎一升炒黃
投酒中浸一宿焙為末元浸酒調下
雞瘻有病冷瘻者醫曰因食白淪雞過多故也
用蒜一枚裹服乃吐一物如升大瘻暴開視
之乃雞雞也再服吐十三雞而愈

治婦產後有傷胞破不能小便常漏濕不乾用
生絲綯一尺剪碎白牡丹根炒白芨各末一
錢水一碗煎至綯爛如錫空心頓服不得作
聲作聲即不効
一人心漏當胃數竅血液常流二十年用鹿茸
酥炙附子炮鹽花棗肉為丸每酒下三十九
半月而愈
治婦人產後忽兩乳細小下垂過小腹痛甚名
乳懸用川芎當歸各二斤內用半斤水煎服
餘用燒烟熏口鼻二料乃効
一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之
則痛欲絕先服失笑散數服次以帶皮姜三
斤研爛入清油二斤煎油乾為度用綯兜起
肉線屈曲于水道邊以前姜燻之冷則熨之
一日夜縮其大半二日即盡入再服失笑散
芎歸湯調理之如肉線斷則不可治矣
治人手指彎曲節間疼不可忍漸至斷落以革
麻子去殼二兩碎者不用黃連四兩貯瓶內
水二升浸之春夏三日秋冬五日每早面東
以此水吞下革麻子一粒漸加至四五粒微
泄無害忌食動風物屢驗
一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花腦搽舌
上應手而收重者用五錢方愈
張子和治一婦人木舌脹滿口諸藥罔効以鉗
針砭之五七度腫減三日方平血出盈斗
一婦產後忽生虫一對于地能行長寸餘自後
月生一對醫以苦參加打虫藥為丸服之又

生一對理于土中過數日發而視之暴大如拳名子母垂從此絕根

一婦眼中忽有血如射而出或綠鼻流下但出血多時即經不行乃陰虛相火之病遂用歸身尾生地紅芍加柴胡黃柏知母條芩側柏葉木通桃仁紅花水煎食前服數帖而愈

一婦妳頭裂用秋後嫩茄子絞開頭者陰乾燒為末水調服愈

治身被鬼擊有青痕作痛以金銀花煎酒服
一人患腦疽面目腫閉頭微如斗此勝脫濕熱所致以黃連消毒飲二劑次以槐花酒二碗頓退以指按下腫即復起此膿已成也於頸額肩頰各刺一孔膿並湧出口目始開更以托裏藥加金銀花連翹三十劑全愈

紅絲瘤東垣云李叔和問中年得一子一歲後身生紅絲瘤而死後四子皆然何也曰汝乃腎中伏火精內有紅絲故也俗名胎瘤汝試取精觀之果如其言遂以滋腎丸數服其妻服六味地黃丸乃受胎生子前證不復作矣蛇入人竅中急以手捻定以刀刮破尾以椒或辛辣等物置尾以綿繫之即自出不可拔

一婦人產後日食茶粥二十餘碗一月後遍身冰冷數塊以指按其冷處即冷從指下上應至心如是者二年諸治不効以八物湯去地黃加橘紅入姜汁竹瀝一酒鍾十服乃溫

一人頸項腫與頭相統按之堅硬用漏蘆湯一劑服下發痒頃刻消散

治婦盤腸產者臨產即子腸先出而後產子產子之後其腸不收以醋半盞冷水七分調勻噴婦面三噴則腸收盡此良法也

丹溪治一婦產戶下一物如帕有尖約重一斤却喜血不盡虛急與黃芪白水升麻各五分人參當歸各一錢水煎連服三劑即收上

夏月中寒一人暑月行百里渴而飲山水至晚以單蓆陰地上少睡頃間寒熱吐瀉身如刀刮而痛醫皆曰中暑也進黃連香薷飲不應予診其脉細緊而伏此中寒也衆皆笑曰六月中寒有是事乎予以附子理中湯治之六服乃瘳

冬天傷暑一婦冬月患酒惡寒翕翕發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫皆虛弱用滌痰二陳湯不効後請予治脉虛無力予曰類乎傷暑衆以為不然予究之婦曰昨因天寒令取綿套蓋之因得此症予曰誠哉傷暑也汝之綿套晒之盛暑熱收箱中必有暑氣今身虛得之易入故病如是婦曰然遂用黃連香薷飲進二服其病瘳矣噫冬天傷暑夏月中寒病亦鮮見醫家問切之功活變之法不可不知也

一人耳內有丁如棗核大痛不可動一待詔用火酒滴耳內令仰上半時以鉗取出絕根

一婦產後因于死經斷不行者半年一日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之而痛不禁衆醫不識青林曰此石瘕病也用四物加桃仁


大黃三稜檳榔玄胡索附子澤瀉血竭為湯二劑而愈

一人左手無名指爪角生一小瘡初起麻粒大用小刀挑開瘡頭血出如濁不止一日夜長出肉瘤如菌累指頂內開一孔如一眼目轉動此疔毒也以艾灸四十壯不知疼痒復烙之剪去肉瘤敷拔疔散外以膏藥貼之內服解毒湯七日全愈

一少年新婚欲交媾女子阻之乃逆其意遂陰痿不舉者五七日以禿筆頭燒灰酒調服一二錢頃即起

一人當額害楊梅瘡一箇數年不愈一方士治之先用藥爛去瘀肉見內有骨一片如錢大取而去之治仍不效復爛之又有骨一片再取去敷生肌散收口而愈

怪病單終



醫法 明學

醫學發明方目錄

吳茱萸丸	利膈丸
消痞丸	黃耆補中湯
木草十劑	傷元活血湯
乳香神應散	全當歸導滯散
紫金丹	聖靈丹
調中順氣丸	沉香導氣丸
木香順氣丸	沉香交泰丸
加減瀉白散	神祕湯

三奇湯	補中益氣湯
硃砂安神丸	用藥加減法
人參益肺散	通氣防風湯
草薢菴丸	白朮附子湯
丁香練質丸	天台烏藥散
茴香練質丸	川練子散
托裏榮衛湯	沉香海金沙丸
續隨子丸	海金沙散
木香塌氣丸	廣茂潰堅湯
導滯通經湯	赤茯苓丸
薑附湯	沉香桂附丸
十全大補湯	中滿分消丸
中滿分消湯	霍香安胃散
加減二陳湯	人參平肺散
參蘇溫肺湯	滋腎丸
清肺飲子	還少丹
補益腎肝丸	水芝丸
地黃丸	三才封髓丹
離珠丹	天真丹
八味丸	通幽湯
潤腸湯	當歸拈痛湯
羌活導滯湯	開結導飲丸
除溼丹	除風湯
枳實大黃湯	小續命湯
疎風湯	三化湯
大羌活愈風湯	大秦丸湯
半夏溫肺湯	丁香半夏丸

醫學發明目錄終

紫蘇飲子	巴戟丸
雙和散	附子溫中丸
五邪相干	

醫學發明卷一

江陰朱氏校刊本

元 丹溪朱震亨著

膈咽不通并四時換氣用藥法

黃帝鍼經云胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里夫咽者嚥物之門戶也膈者上焦胃中心肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生痰泄泄如糜米穀不化者是也濁氣在上則生脹腹中脹滿不得大便或大便難或先結後瀉皆是也濁氣在上當降而不降者乃腎肝吸人之陰氣不得下而反在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是陰火之邪上衝而吸人之氣不得入故食不下也此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在下則生痰泄者胃氣未病之日常上行心肺而營經也因飲食失節勞役形體心火乘於土位胃氣弱而下陷於陰中故米穀入而不得升反降而為痰泄也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脉上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也鍼經云清濁相干亂於胃中是為大悞悞者惑也氣不交通最為急證不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有噎有塞者五藏之所生陰也血也噎者六府之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今立四氣用藥并治法於後

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內

醫學發明

陰虛陽虛

清陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者善嚏鼻流涕涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡風寒小便數而欠或上飲下便色清而多大便不調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者

吳茱萸丸主之

吳茱萸

草豆蔻仁 各一錢

橘皮

益智仁

人參 黃耆

升麻 各八分

澤瀉

白礬 薑黃

柴胡 各四分

當歸身

炙甘草 各六分

青皮 三分

大麥蘖

炙甘草 各一錢

右件為細末湯浸蒸餅為丸如菴豆大細嚼三十丸白湯送下無時

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是

天助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有富愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗甚者前證俱作治法當從特利膈丸泄

肺火以黃耆補中湯送下如兩足痿厥行步惛然敬側欲倒臂膈如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃耆人參甘草白木蒼朮澤瀉猪苓

茯苓橘皮等作湯送下滋腎丸一百五十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不下以上件白木蒼朮等湯送

下消痞丸五七十丸更當審而用之

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香 七錢

檳榔 七分

厚樸 剉製

人參

藿香葉

枳實 炒

炙甘草

當歸 各二兩

大黃 酒浸焙

枳實 炒

炙甘草

當歸 各二兩

右為細末滴水丸或丸或少用蒸餅亦可如桐子大每服三五丸食後飲下

消痞丸 治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連

人參

黃芩

薑黃

白朮

人參

炙甘草

豬苓

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

枳實

橘皮

乾生薑

半夏

景謂膈之上屬上焦悉屬於表或有形質之物因而

越之則可若氣壅則不可越之者吐也破氣藥也

若陰虛穢氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不

通也止當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血

潤血兼用甘藥以補其氣微加大黃芒硝以通其閉

大便秘邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣復有胃中虛

熱穀氣久虛發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之

五穀皆屬陰或食或飲白湯皆止嘔噦則嘔噦自止且如小兒斑後餘

熱不退痲不收飲大便不行一謂血燥則當以陰藥

治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也

潔古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風微熱

之劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲語謬躁

狂不大便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所傷

以承氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此

見矣今製世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉火非甘

寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故諄諄及

此至如孫真人言生薑嘔家之聖藥謂上焦氣壅表

實而言之非以瀉氣而言之也

若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上胃中閉塞

惟益胃推揚穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣瀉血

藥下之下之則轉增閉塞疼痛或變作結胃復下其

膈由此致危者多矣鍼經說阿欠噦噦振寒噦噦譫

涕淚出太息涎下耳中鳴自齧舌頰唇視生病者補

之此十二邪者皆奇邪之走空竅者也凡邪之所在

皆為不足宜補而不宜瀉空竅者胃之清氣能通也

胃氣虛則穀氣不上行是氣路不利經云廉泉玉英

者津液之道路也津液不上胃中氣路不開亦令人

噦勿作外實幸藥生薑之類其壅滯蓋肺氣已

虛而反瀉之是重瀉其氣必胃中如刀割之痛與正

結胃無異亦聲聞于外用藥之際可不慎哉

通可以去滯通草防已之屬是也防已大苦寒能瀉血

中大熱之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者皆可

瀉血滯止防已而已通草甘淡能助西方秋氣下

降利小便專瀉氣滯也小便氣化若熱絕津液之源

於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕熱津液癰閉

約縮小便不通宜以此治之其脈右寸洪緩而數左

尺亦然其證胃中煩熱口燥舌乾咽噎亦乾大渴引

飲小便淋瀝或閉塞不通脛腠脚熱此通草主之凡

與通草同者茯苓澤瀉通草猪苓琥珀藟麥車前子

之類皆可以滲泄利其滯也此雖泄氣滯小便不利

於肺中有所未盡爾予昔寓長安有王善夫病小便

不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極脚腿堅脹

破裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦

不可名狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦

所服治中滿利小便之藥甚多細思素問云無陽者

陰無以生無陰者陽無以化膀胱津液之府氣化乃

能出矣此病小便癰閉是無陰陽氣不化者也凡利

小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥謂稟西方燥

金之化自天降地是陽中之陰非北方寒水陰中之

陰所化者也此蓋奉養太過膏粱積熱損北方之陰

腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆

上而為嘔噦非膈上所主也獨為關非格病也潔古

曰熱在下焦填塞不便便治關格之法今病者內關

外格之證悉具死在旦夕但治下焦乃可愈遂處以

粟北方之寒水所化大苦寒氣味者

黃藥

知母各二酒洗之以肉桂為之引用

所謂寒因熱用者也同為極細末煎熟水為丸如桐

子大焙乾空腹令以沸湯下二百九丸少時來報藥服

須臾如刀刺前陰火燒之痛溺如瀑泉湧出卧具盡

濕床下成流顧盼之間腫脹消散故因記之或曰防

已之性若何曰防已大苦寒能泄血中之濕熱通血

中之滯塞補陰瀉陽助秋冬瀉春夏藥也此之於人

則險而健者也險健之小人幸災樂禍遇風塵之警

則首為亂階然而見善亦喜逢惡亦怒如善用之亦

可以敵兇暴之人保險固之地此曉曉之藥聖人有

所存而不廢耳大抵聞其真則可惡下咽則令人身

心為之煩亂飲食為之減少至於十二經有濕熱壅

塞不通及治下注脚氣除膀胱積熱而庇其基本非

此藥不可真行經之仙藥無可代之者復有不可用

者數事若遇飲食勞倦陰虛生內熱元氣穀氣已虧

之病以防已泄大便則重亡其血此不可用一也如

人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜淡滲之此不

可用二也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以人

參葛根之甘溫用苦寒之劑則速危此不可用三也

若下焦有濕熱流入十二經致二陰不通然後可審

而用之耳

補可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘溫能補

氣之虛羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有有形之物也

能補有形肌肉之氣凡氣味與人參羊肉同者皆可

以補之故云屬也人參補氣羊肉補形氣者有無

之象也以大言之具天地兩儀者也以小言之則人

之陰陽氣血也。以之養生則莫重於斯。以天地物類論之。則形者坤土也。人之脾胃也。乃生長萬物也。地欲靜。靜則萬物安。坤元一正之土。亘古不遷者也。耕種之土。乃五行運用者也。動之有時。春耕是也。若冬時動之。令天氣閉藏者。泄地氣。凝聚者。散精氣。竭絕萬化不安。亦如人之勞役形體。則大病生焉。故曰。不妄作。勞則明。當靜之時。若勞役妄作。則百脈爭張。血脈沸騰。精氣竭絕。則九竅閉塞。衛氣散解。夫以人參甘草之類。治其已病。曷若救其未病。為拔本塞源之計哉。內經云。志閑少欲。飲食有節。起居有常。減其思慮。省其語言。氣庶幾於道。何病之有。如或不慎。病形已彰。若能調其脾胃。使榮氣旺。清氣上升。則四藏各得其所以氣論之。天地人三焦之氣。各異損其脾者。益其氣。損其脾胃。調其飲食。適其寒溫。黃耆之甘溫。能補皮毛之氣。人參之甘溫。能補肺之氣。甘草之甘溫。能補脾胃之氣。中經營之氣。肺主諸氣。氣旺則精自生。形自盛。血氣以平。故曰。陽生則陰長。此之謂也。血不自生。須得生陽氣之藥。血自旺矣。是陽主生也。若陰虛。單補血。血無由而生。無陽故也。仲景以人參為補血藥。其以此歟。乃補氣補血之大畧也。

洩可以去閉。葶藶大黃之屬是也。此二味皆大苦寒氣味俱厚。不減大黃又性過於諸藥。以洩陽分肺中之閉也。亦能洩大便為體輕象。陽故也。大黃之苦寒。能走而不守。洩血閉也。血閉者。謂胃中粗穢有形之物。閉塞者也。陽明病胃家實是也。日晡潮熱。大渴躁作。有形之熱。故洩其大便。使通和汗出而愈矣。一則治血病。洩大便。一則洩氣閉。利小便。若經絡中及皮毛

分肉間。但有疼痛。一藥用牽牛大黃下之。乖戾甚矣。通則不痛。痛則不通。痛隨利減。當通其經絡。則疼痛去矣。如輕可以去實。麻黃葛根之屬是也。謂如頭痛。當以細辛川芎之類。通之。則無所凝滯。即痛隨利減也。臂痛有六道經絡。究其痛在何經絡。之閉。以行本經。行其氣。血氣流通。則愈矣。若表上諸疼痛。便下之。則不可當詳細而辨之也。

輕可以去實。麻黃葛根之屬是也。夫六淫有餘之邪。客於陽分。皮毛之間。腠理閉拒。謂之實也。實者。榮衛氣血不行之謂也。宜以輕利開腠理。致津液。通氣也。皮毛經絡寒邪之實去矣。故二藥之體。輕清成象。象氣之輕浮也。寒邪為實。輕可以去之。然大同而小異。蓋麻黃微苦為陰。之陽可入足太陽寒水之經。其經循背下行。木寒而又受外寒。汗出乃愈。當以發之。葛根味甘溫。可以發足陽明燥火之經。身已前所受寒邪也。非正發汗之藥。謂陽明禁發汗。利小便。但解去經絡肌肉間寒邪。則氣和汗自出矣。麻黃專發汗去皮。毛氣分寒邪。葛根和解血分寒邪。乃一陰一陽。能瀉表實。不能瀉裏實。若飲食勞倦。雜病自汗。表虛之證。認作有餘。使用麻黃發之。汗大出。則表益虛。此蓋不知表虛宜補。其亡陽。閉其自汗。秋冬用桂枝。春夏用黃耆代之。黃耆者。能治虛勞。自汗。陽明擦病者也。陽明胃主自汗。小便數。若以人參甘草之補。補之。脾胃實。脾胃實。則衛氣行。衛氣行。則表自實。表既實。自汗何由而出。清氣上行。雖發泄亦止矣。此治其本也。葛根雖為和解之藥。亦不可用。用之則重虛。其表仲景所論。內外不足。自汗之證。大禁發汗。利小便。若已經

發寒汗寒邪未去。雖發汗數多。不可禁也。寒邪已云重發。其汗則脫。人元氣若多汗。小便赤澀。不得利。小便為汗。奪津液故也。汗家不得重發汗。小便多。不得發汗。汗多。不得利。小便多。不得重利。小便聖人所以切禁。此者。為津液乃氣血之基本也。一云亡陽。一云脫血。病人重發汗。重利。小便必脫。元氣七神無依。則必危困矣。因辨麻黃葛根之宜禁。故兼及之。

中風同從高隆下

夫從高隆下。惡血留於內。不分十二經絡。聖人俱作風中。肝經留於脇下。以中風療之。血者皆肝之所主。惡血必歸於肝。不問何經之傷。必留於脇下。蓋肝主血。故也。痛甚。則必有自汗。但人有汗。出皆為風。證諸痛。皆屬於肝。木既敗。血凝滯。從其屬入於肝也。從高隆下。逆其上行之血氣。非肝而何。非傷風無汗。既自汗。必是化也。以破血行經之藥治之。

傷元活血湯 治從高隆下。惡血留於脇下。及疼痛不可忍。

柴胡	半兩	黃根	當歸	各三錢	紅花	
甘草	山甲	炮各二錢	大黃	酒浸一兩		
桃仁	酒浸去皮尖研	如泥五十箇				

黃帝鍼經云。有所墮墜。惡血留內。若有所大怒。氣上而不下。於脇則傷肝。肝膽之經。俱行於脇下。經屬厥陰。少陽。宜以柴胡為引。用為君。以當歸和血。脈又急者。痛也。甘草緩其急。亦能生新血。甘生陽。生陰。長故也。為臣。川山甲。瓜。蔓。根。桃仁。紅花。破血。潤血。為之佐。大黃。酒製。以溫滌敗血。為之使。氣味和合。氣血各有所歸。痛自去矣。