

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷

十九
二十



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷十九

諸氣

錢塘魏之琇撰

鄧安人年五十忽然氣痛投神保丸愈不一二日再痛
再服神保丸六七十粒大腑不通其痰轉甚亦有要
用沈香木香薑桂等藥而不敢投痛甚則築心築背
築定兩脇似有兩柴十字揸定心脇叫聲徹天召良

甫診之六脉沈伏乍來乍去衆問胗脉吉凶何如答
曰凡久痛之脉不可準也但以症辨用藥觀其人質
肥偉問其脉數日不通曰實痛也其腹必脹但以人
按之痛甚手不可向近此大實也經曰大滿大實者

可下之用替針九五六百粒是夜即愈

俱醫說
續編

羅謙甫治趙運使夫人年五十八歲于至元甲戌三月
中病臍腹冷疼相引脇下痛不可忍反復悶亂不得

安卧以當歸四逆湯主之灸中庭穴

上

朱丹溪治一婦氣自小腹丹田冲上遂吐清水火氣上逆由丹田虛寒故也用白朮二兩白豆蔻五錢為末早飯後以白湯送下白朮補脾豆蔻溫肺此藥服之則金水相生其病自愈若在男子純陰無陽則為不治之症矣

陳三農治一人怒氣感寒小腹有塊氣送上行喘息不安衆用散氣降氣藥益甚曰此因汗下過多傷其胃氣胃虛為衝脉所逆并脇下少陽脉二道而反行病

多厥逆以調中益氣湯加炒黃柏炒青皮一劑而愈
一老人大怒氣自臍下上攻兩脇作痛喘息不卧此動
厥陽之火也兩脇肝膽部分怒氣傷肝而動龍雷之
火故逆上作痛耳用伏龍湯下左金丸愈

一貴人患氣從小腹上攻胸脇頭項遍身急脹而痛諸
治罔效曰此督脉為病也經曰督脉為病令人逆氣
而裏急以四物加炒黑黃柏醋炒青皮一劑而愈

朱丹溪治鄭仲游年二十三膈有一點相引痛吸氣皮

覺急滑石枳殼炒各一兩桃仁黃連炒各半兩炙甘草二錢為末每一錢半以蘿蔔自然汁研煎熟飲之

一日三五次

作淤
血治

鄭仲本年二十七因喫熱補藥又妄自學吐納以致氣亂血熱嗽血消瘦遂與行倒倉法今嗽血消瘦已除因喫炒豆米膈間有一點氣梗痛似有一條絲垂映在腰與小腹亦痛大率偏在左邊此肝部有惡血行未盡也滑石枳殼一兩柴胡黃連五分桃仁二兩黃

丹三錢生甘草二錢紅花一錢服法同前

繆仲淳治高存之壅滯生氣上逆每飯下一二口輒噯
氣數十口再飯再噯食頃三四作曰此氣不歸元中
焦不運也每劑須人參二錢不信服快氣藥愈甚逾
二三月曰今須參四錢矣不信又逾二三月曰今須
六錢矣不信又逾月飲食不下每嘔冷氣如團而出
上下氣不屬分必死存之坐其家迫令繆藥服首不
動再煎不動然亦不如他湯藥輒嘔也服三劑忽心

口下如爆一聲上則噯氣下則小遺無算上下洞然
即索粥頓食三四碗不上逆矣服五六劑減參二錢
噯逆復作仍用六錢而安一月後方減參二錢服半
年全愈人參六錢麥冬三錢五味二錢橘紅一錢砂
仁一錢白芍二錢沉香五分益智仁一錢五分萸肉
三錢蘇子二錢枇杷葉三大片水煎臨服加沉香汁
十五匙逆水蘆根汁一大盞又十倍為末山藥糊為

九空心白湯吞

廣筆
記

梁溪一婦人喉間如一物上下作梗前後板痛服仲淳
方二十劑愈降香通草蘇子橘紅枇杷葉人參炙草
石菖蒲麥冬甘菊白芍遠志白豆仁木瓜石斛加蘆
根汁一鍾同煎八分入姜汁二匙上全

哮

丹溪治一人哮十日一發此病在上焦不得汗洩正當
十月遂以麻黃黃芩各二錢入姜汁煎服臨卧進小
胃丹二十粒而安

聖濟治一人飲醋噎喉喘哮不止用粉甘草二兩去皮
破開以猪膽六七枚取汁浸三日炙乾為末蜜丸清
茶下三四十丸漸愈

王宇泰治一人鹽哮用白麵二錢沙糖搜和以糖餅灰
汁捏作餅子放在爐內煨乾剗出切作四塊以輕粉
四錢另炒摻在餅內食之吐痰而愈

以上俱
大還

龔子才治一人哮喘十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰
自汗四肢厥冷六脉沉細此氣虛脾弱與六君子加

黃芪五味二冬杏仁薑棗煎服而愈

一人自幼患哮喘之症每遇寒即發發則喘急咳喘痰涎上涌久不瘥已成痼疾與甘桔苓連瓜蒌貝母二冬清肺合六味補腎為方名清上補下丸服一料全愈

孫文垣治查少川夙有哮喘疾每發則遍身如燎上氣

短促喉中痰聲響若湯沸每經七晝夜汗出漸愈

七日來復

之居恒嗜飲縱欲不避風寒有教以石膏麻黃杏仁

義

枳殼細茶各一兩作大劑飲之名曰五虎湯喘至即
以此禦之隨飲而止屢發屢進應若桴鼓凡三年飲
五虎無算因而腹大如覆箕兩腿光腫如柱內外臃
瘡清水不竭腥氣逼人不能伏枕者五閱月診時長
至後一日也氣高而喘身熱而煩覆以棉被足納火
箱環列火盆絨帽貂套束之以帕鼻亦絨套籠之坐
重幔中猶凜凜畏寒今已十日其脉浮大無力其色
白中隱青蓋舊病由于氣虛中滿新病由寒在表而

然合先散之以紫蘇馬蹄辛甘草防風白豆仁蒼朮
陳皮人參羌活生薑一帖得微汗畏寒之狀已去獨
鼻尚寒用防風黃芪二兩煎湯令熏其鼻飯頃而止
日凡三熏次日亦愈嘔惡不止用人參溫脾湯加丁
香進之一帖旋已因欲利水自食鯉魚數斤夜脹極
以平胃散入椒欖肉一兩能解魚毒兩劑而定獨腹脹小
水不利不能伏枕為苦以附子理中湯加砂仁補骨
脂赤小豆桂心連進四劑小水略長繼以尊重九日三

服之每服五九五日後小水通利可以卧矣守此調理脹消而平

李士材治顧文學十年哮喘百藥無功診其兩寸數而瀉曰瀉者痰火風寒久久盤据根深蒂固矣須補養月餘行吐下之法半年之間凡吐下十次服補劑百餘遂愈更以補益氣為丸加雞子秋石服年許永不再發

施沛然治阮二華室患哮喘過用涼劑痰上壅面目浮

黃而腫每昏暈則形靜若死甦則鼾聒之聲聞于外
庭醫者望而却走診其六脉沈滑而弱兼緊病得之
冬傷于寒經云形寒飲則傷肺古人治此病必用麻
黃輕清辛散之劑若投以寒涼則邪氣蔽竅而不得
泄痰日膠結上焦之氣壅而不宣乃用通關散涌其
痰涎凡三涌而痰氣始清喘息始定後以三拗湯兼
導痰湯出入調理月餘而安

錢國賓治金陵青衿趙灝瀕母年六旬得痰症晝夜吼

鋸嘔痰數碗初尚能行後漸不起幸胃不病飲食如
常多醫罔效脉之六部浮滑右寸關更甚浮主肺氣
虛弱滑主脾經積痰乃痰吼症也用導痰加杏仁麻
黃廿劑病勢不減辭去又更二醫反重復求治曰吾
技盡矣容思之忽悟吼痰屬太陰肺經之症肺乃清
虛之藏六葉兩耳四垂如蓋今膠痰固于肺縫中呼
吸而作吼鋸之聲且胃主納受脾主運化今胃納而
脾不運停飲作痰涌出非劫劑不可也以三白丸方

示彼用白砒三分煨黃貝母桔梗各三分搗飯為丸
黍米大以冷茶睡下七丸七服痰止吼定服理脾清
肺藥痊大抵病危至此不用客却之味弗知此七方
十劑之意者也古人學力深今人學力淺再思能用
狼虎却奪之劑學力方到若迎奪却伏神兵奇正當
並用也奚王道可以盡岐黃之伎哉如果見真却劑
亦不妨暫用也

喘