

大便或祕或利

大經云春傷於風夏必飧泄蓋木氣刑土也土不能
滲泄則木氣勝故泄風氣行精液燥故祕卽不可轉
以祕燥爲風也余家中宗親張公度母氏年七十日
下利數十行百方治之不愈又苦腰脚拘攣公度以
茯苓酸棗仁治拘攣而利愈黃魯直母安康郡太夫
人苦祕結以公度藥授之而大便利故知祕與利皆出於
風公度潞人名騷世有令德承父醫學而克其家清
脩不妄取真有德君子今見於此 **薛**按前證若因
足三陰虧損發熱作渴胸膈不利飲食善消面帶陽

色脉洪而虛肢體倦怠者用補中益氣湯六味地黃丸脾肺氣虛補中益氣湯脾經鬱結用加味歸脾湯氣血俱虛者八珍加肉蓯蓉腎經津液不足者六味地黃丸胃火銷鑠津液竹葉黃芪湯肝木侮脾土小柴胡加山梔郁李仁枳殼膏粱積熱清胃散加山梔郁李仁枳殼若燥在直腸用豬膽導之

治風人脚氣人大便或祕或利虛人尤宜

皂角子

參百粒破作兩片慢火炒燥甚入酥壹棗大又炒至燥又入酥炒至焦黑爲度

右細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸煎蒺藜酸棗仁湯下空腹服兩時久未利再進一服漸加

至百丸不妨以通爲度

蒺藜湯方

用蒺藜不以多少炒至赤黑色白內以

木杵舂去刺揀簸淨每蒺藜叁兩以酥棗仁壹兩炒令香同杵爲麤末馬尾羅篩每叁錢水壹錢煎至柒分去滓溫服下前丸子

大五柔丸

主臟氣不調大便難通榮衛利九竅進

飲食

大黃

斗米上蒸切焙

枳殼

去瓢麤炒

白芍藥

葶藶

炒香別研

肉苳蓉

酒浸軟溫水洗切焙各壹兩

桃仁

壹百枚

杏仁

肆拾枚並去皮尖麤炒令黃別杵

牛脂

去筋膜熬成油與
葶藶杏仁等杵

右除有油藥並爲末入牛脂桃杏仁葶藶杵數千
下丸如梧桐子大米飲下參丸日三服腹稍空時
服未知稍增以知爲度

安康郡太苦風秘予爲處只可二仁丸

杏仁

去皮尖
麤炒黃

麻仁

別研各

枳殼

去穰
麤炒研

訶子

慢火炒
麤去核

右二物各壹兩爲細末同二仁杵煉蜜和杵丸如
梧桐子大溫水下貳參拾丸未知稍增 潞公在
北門日盛夏間苦大便秘不調公隨行醫官李琬本

衢州市戶公不獨終始涵容之又教以醫事公病泄利琬以言動搖之又求速效卽以赤石脂龍骨乾薑等藥饋公公服之不大便者累日其熱甚苦予方自共城來見公未坐定語及此事公又不喜服大黃藥予告曰此燥糞在直腸藥所不及請以蜜兌導之公爲然時七月中苦熱予搗汗爲公作蜜兌是夕三用藥下結糞四五十枚黑如橡栗公二三日間飲食已如故世有一種虛人不可服利藥今載其法

蜜兌法 好蜜四五兩銀石器中微火熬不住手以

匙攪候可丸見風硬卽以蛤粉塗手捏作人指狀
長三寸許坐廁上內之以手掩定候大便通卽放
手未快再作

已上四方
出初虞世

補遺通氣散 治婦人憂怒傷肺肺與大腸爲傳送
致令秘澀不通或服燥藥過多大便秘亦可用

陳皮

蘇葉

枳殼

木通

去皮節

右等分剉每服肆錢水煎溫服

皂角丸

蘇麻粥亦佳

見前

泄瀉

大泄瀉之證因腸胃虛冷而邪氣乘之經云春傷於風夏必飧泄蓋風傷肝肝木旺而尅脾土屬外因也若七情不平臟氣受傷屬內因也若飲食生冷傷脾屬不外內因也大法寒者溫之熱者涼之滑者澀之濕者燥之

薛前證若生冷所傷用六君木香砂仁辛熱所傷用二陳炒連山梔麵食所傷用六君神麴米食所傷用六君穀蘖飲食不時而傷用四君子湯飲食過多而傷用六君子湯飲食停滯人參養胃湯脾氣虛弱者六君升麻柴胡脾氣虛寒六君木香炮

薑肝木乘脾者六君柴胡芍藥肝火尅脾者六君芍
藥山梔中氣虛而下陷者補中益氣湯鬱結傷脾者
濟生歸脾湯腎氣虛者五味子散脾氣虛者二神丸
脾腎虛者四神丸命門火衰者八味丸真陽虛敗者
固真丸仍與滯下方參用 侍御沈東江之內停食
腹痛作瀉以六君加木香炮薑而愈後復作傳爲腎
泄用四神丸而安 侍御徐南湖子室瀉屬腎經不
信余言專主滲泄以致不起 一婦人年踰五十不
食夜飯五更作瀉二十年矣後患痢午前用香連丸
午後用二神丸各二服而痢止又以二神丸數服而

食夜飯不用而形體如故 吳江史元年母素有血
疾殆將二紀平居泄瀉飲食少思面黃中滿夏月尤
甚治血之藥無慮數百劑未嘗少減余以爲脾腎虛
損用補中益氣湯送二神丸復用十全大補湯煎送
前丸食進便實病勢頓退若泥中滿忌參朮痰痞忌
熟地便泄忌當歸皆致誤事

補遺治瀉風證則胃風湯不換金正氣散寒證則理
中湯四柱散大已寒丸暑則五苓散香薷散六和湯
濕則藿香正氣戊巳丸此大槩而論至於通治則有
諸方可檢隨證治療然男子婦人久瀉不止無逾固

腸丸之效驗

香朴丸 治腸胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣閉不

進飲食

大厚朴

伍兩

北藿香

白朮

陳皮

各叁兩

訶子

赤石脂

各壹兩半

右爲細末麵糊丸如梧桐子大空心米飲下伍拾丸如常服暖脾胃

桂香丸 治臟腑虛爲風濕寒所搏冷滑注下又治

老人虛人危篤累效

附子

肉豆蔻

並炮

白茯苓

各壹兩

桂心

木香炮

白薑炮各半兩

丁香

貳錢半

右爲細末米糊丸如梧桐子大空心米飲下伍拾丸

豆蔻分氣飲 治臟腑虛寒泄瀉無度瘦極及婦人

產後瀉洞泄危篤甚

藿香葉

草豆蔻仁炮

青橘皮各肆兩

甘草

丁香各半兩

烏梅伍拾箇

肉豆蔻

拾箇炮

右咬咀每服肆錢水貳盞糯米壹撮煎柒分去滓

溫服

豆蔻丸

治臟寒泄瀉不止服諸藥無效

亦可治男婦

肉豆蔻

麵裹煨香

不以多少碾細入陳米白飯搗令得

所丸如棗豆大空心煮粟米飲吞下百丸本家累

以此藥救人有效

人參豆蔻散

治久瀉不止服諸藥無效此藥屢效

人參

肉豆蔻

乾薑

厚朴

甘草

陳橘皮

各壹兩

川芎

桂心

訶子

北藿香

各半兩

右爲細末每服參錢水壹小盞薑參片棗壹枚煎至陸分服

木香散 治臟腑冷極及久冷傷脾口瘡下泄米穀不化飲食無味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛冷下泄及一切水瀉冷痢

木香

破故紙炒各壹兩

良薑

縮砂仁

厚朴製各柒錢

赤芍藥

橘紅

桂心

白朮各半兩

吳茱萸

湯泡柒次

胡椒各貳錢半

肉豆蔻肆枚

檳榔壹箇

右爲散每服參錢用不經水豬肝四兩許去筋膜
批爲薄片重重摻藥置一鼎中入漿水一碗醋一
茶脚許蓋覆煮肝熟入鹽壹錢葱白三莖細切生
薑彈子許拍破同煮水欲盡空心爲一服冷食之
初服微瀉不妨亦是逐下冷氣少時自止經年冷
痢滑瀉只是一服渴卽飲粥湯忌生冷油膩物如
不能食冷物卽添少漿暖服 嘉興謝醫得此方
病其繁只用漿水煮豬肝丸如梧桐子大粥飲下
五十丸亦效若暴瀉痢只是一服唯熱痢熱瀉不
宜服 趙府博宜人病泄瀉不止用附子木香訶

子肉豆蔻龍骨等藥及諸丹服之皆無效召余診之肝腎脉虛弱此肝腎虛也府博云其說見在何經余曰諸方論泄痢止是言脾胃病不過講風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遇腸虛則泄痢而不知肝腎氣虛亦能爲洩痢古書所載甚明不可不辨經曰洩痢前後不止腎虛也又曰諸厥固泄皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也門戶束要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故下焦不能禁固而泄痢腎爲胃關門戶不要故倉廩不藏也若病泄利其源或出於此而專以脾胃藥治之則

熱瀉
清之

香

埋丸

治痢疾并水瀉暑瀉腹痛不問赤白神效

黃連

淨貳拾兩

吳茱萸

去枝梗拾兩

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯頓一日同炒至黃連紫黃色去茱用連爲末每末四兩入木香末壹兩淡醋米飲爲丸桐子大每服貳參拾丸滾湯下久痢中氣下陷者用補中益氣下中氣虛者用四君子下中氣虛寒者加薑桂

如金丸

好川黃連壹斤分上中下三等揀開以生薑叁斤