

第二冊

卷二

治卒霍亂諸急方第十二

治傷寒時氣溫病方第十三

治時氣府起諸勞復方第十四

治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五

葛仙翁肘後備急方卷之二

治卒霍亂諸急方第十二

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜物以肥膩酒醢而當風履濕薄衣露坐或夜臥失覆之所致

初得之便務令煖以炭火布其所臥下大熱減之又並蒸被絮若衣絮自苞冷易熱者亦可燒地令熱水沃敷薄布席臥其上厚覆之亦可作

灼灼爾熱湯著甕中漬足令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之冷復易亦可以熨斗貯火著腹上如此而不淨者便急灸之但明案次第莫爲亂灸湏有其病乃隨病灸之未有病莫預灸灸之雖未卽愈要萬不復死矣莫以灸不卽愈而止灸霍亂艾丸若不大壯數亦不多本方言七壯爲可四五十無不便火下得活服舊方用理中丸及厚朴大豆豉通脈半夏湯先輩所用

藥皆難得今但疏良灸之法及單行數方用之
有效不減於貴藥已死未久者猶可灸

餘藥乃可難備而理中丸四順厚朴諸湯可不預
合每向秋月常買自隨

卒得霍亂先腹痛者灸臍上十四壯名太倉在心
厭下四寸更度之

先洞下者灸臍邊一寸男左女右十四壯甚者至
三十四壯名大腸募洞者宜瀉

佛急方 卷之二
先吐者灸心下二寸十四壯又并治下痢不止上
氣灸五十壯名巨闕正心厭尖頭下一寸是也
先手足逆冷者灸兩足內踝上一尖骨是也兩足
各七壯不愈加數名三陰交在內踝尖上三寸
是也

轉筋者灸蹠心當拇指大聚筋上六七壯名湧泉
又灸足大指下約中一壯神驗

又方灸大指上爪甲際七壯

轉筋入腹痛者令四人捉手足灸臍左二寸十四
灸股中大筋上去陰一寸

若哕者灸手腕第一約理中七壯名心主當中指
下利不止者灸足大指本節內側寸白肉際左右
各七壯名大都

乾嘔者灸手腕後三寸兩筋間是左右各七壯名
間使若正厥嘔絕灸之便通

小品方起死

吐且下利者灸兩乳連黑外近腹白肉際各七壯
亦可至二七壯

若吐止而利不止者灸臍一夫納中七壯又云臍
下一寸二七壯

若煩悶湊滿者灸心厭下三寸七壯名胃管
又方以鹽內臍中上灸二七壯

若遶臍痛急者灸臍下三寸三七壯名關元良

治霍亂神祕起死灸法以物橫度病人人中屈之

從心鳩尾飛度以下灸先灸中央畢更橫灸左
右也又灸脊上以物圍令正當心厭又夾脊左
右一寸各七壯是腹背各灸三處也

華佗治霍亂已死上屋喚魂又以諸治皆至而猶
不差者

捧病人腹臥之伸臂對以繩度兩頭肘尖頭依
繩下夾背脊大骨穴中去脊各一寸灸之百壯
不治者可灸肘椎已試數百人皆灸畢卽起坐

佗以此術傳子孫代代皆祕之

右此前並是灸法

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

鹽二升以水五升煮取二升頓服得吐愈

又方生薑若乾薑一二升咬咀以水六升煮三沸

頓服若不卽愈更可作無新藥煮滓亦得

又方飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升

又方溫酒一二升以蠟如彈丸一枚置酒中消乃

飲無蠟以鹽二方寸七代亦得

又方桂屑半升以煖飲二升和之盡服之

又方濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處

又方取楠若樟木大如掌者削之以水三升煮三沸去滓令灼之也

又方服乾薑屑三方寸七

又方取蓼若葉細切二升水五升煮三沸頓服之
煮乾蘇若生蘇汁卽亦佳

又方小蒜一升咬咀以水三升煮取一升頓服之
又方以煖湯漬小蒜五升許取汁服之亦可

又方以人血合丹服如梧子大二丸

又方用生薑一斤切以水七升煮取二升分爲三

服

又方取賣解家机上垢如雞子大溫酒服之差

又方飲竹瀝少許亦差

又方乾薑二兩甘草二兩附子一兩方三升煮取

一升內猪膽一合相和分爲三服

又方蘆薹葺一大把濃煮飲二升差

若轉筋方燒鐵令赤以灼踵白肉際上近後當縱
鐵以隨足爲留停令成瘡兩足皆爾須臾間熱
入腹不復轉筋便愈可脫刀燒蝦尾用之卽差
又方煮苦酒三沸以摩之合少粉尤佳以絮胎縛
從當膝下至足

又方燒梔子二七枚研末服之

又方桂半夏等分末方寸匕水一升和服之差

又方生太豆屑酒和服方寸匕

又方燒蜈蚣膏傅之卽差

若轉筋入腸中如欲轉者

取雞矢白一寸水六合煮三沸頓服之勿令病者知之

又方苦酒煮衣絮絮中令溫從轉筋處裹之

又方燒編薦索三撮仍酒服之卽差

又方釜底黑末酒服之差

若腹中已轉筋者

當倒擔病人頭在下勿使及地腹中平乃止

若兩臂脚及胷脇轉筋

取鹽一升半水一斗煮令熱灼灼爾漬手足在
胷脇者湯洗之轉筋入腹中倒擔病人令頭在
下腹中平乃止若極者手引陰陰縮必死猶在
倒擔之可活耳

若注痢不止而轉筋入腹欲死

生薑一兩累擘破以酒升半煮合三四沸頓服
之差

治霍亂吐下後心腹煩滿方

梔子十四枚水三升煮取二升內豉七合煮取
一升頓服之嘔者加橘皮二兩若煩悶加豉一
升甘草一兩蜜一升增水二升分爲三服

治霍亂煩躁臥不安穩方

蔥白二十莖大棗二十枚水三升煮取二升頓服之

治霍亂吐後大渴多飲則煞人方

以黃米五升水一斗煮之令得三升清澄稍稍飲之莫飲餘物也

崔氏云理中丸方

甘草三兩乾薑人參白朮各一兩搗下篩蜜丸如彈丸覺不住更服一枚須臾不差仍溫湯一