



增補醫林狀元壽世保元戊集卷五

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男 龔定國校

眩暈

脈風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩。風浮寒聚濕細暑虛涎竝而滑虛脉則無治眩暈法尤當審謗先理痰氣次隨症治。

眩者言其裏暈言其轉。言其昏眩暈之與冒眩其義一也。其狀目閉眼眩身轉耳聾如登舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也。風則有汗寒則掣。暑則熱。陽則重。帶此四氣乘虛而眩暈也。喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也。淫慾過度。腎家不能繼氣歸原使氣逆奔而上此眩暈之生於血虛也。又明矣。以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈豈可不推尋致病之因乎。治法隨機應敵其間以升降鎮導行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也。識者將有采薪之憂。

清暉化痰湯 主方治眩暈之總司也。陳皮去半夏姜汁白茯苓去皮各防風羌活各一錢甘草細枳實一錢川芎黃芩酒炒各白芷細辛南星各七分右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可。○氣虛加人參七分白朮去廬一錢。○血虛加當歸倍川芎。○有熱加黃連薑炒七分。

○一論頭眩眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭若裂身重如山四肢厥冷不得安卧此乃胃氣虛冷停痰而致也。

半夏白术天麻湯 方見頭疾。

○一論勞役之人飢寒眩暈者脉虛弱也。

補中益氣湯方見依本方加半夏天麻白芍熟地黃。○一眩暈屬氣虛有濕痰者依本方去升麻柴胡加白茯苓川芎。

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也。

清離滋坎湯 方見辨寒依本方加川芎天麻山梔竹茹少許。

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脉沉細也。

參附湯 人參五錢大附子炮三錢右剉一劑生薑十片水煎熱服。

○一論眩暈之症因氣虛痰火交上故也。

清陽除眩湯 人參六錢白朮一錢白茯苓一錢半夏湯泡一錢明天麻八枚柳八旋覆花八甘草四錢右剉一劑生薑三片水煎服。

曾甫壽世保元

卷五

○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名曰疾暈

清瘡祛眩湯

天南星

姜泡半夏

川芎

陳皮

茯苓

桔梗

枳殼

去烏藥

酒芩

甘草

右剉

水煎

川芎

陳皮

茯苓

桔梗

枳殼

去烏藥

酒芩

甘草

右剉

生薑水煎

臨服入竹瀝

生薑汁同服

○一論體虛之人一時為寒所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷

薑附湯

乾薑

大附子

生去皮

右剉

每服五錢水煎溫服

一論一切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯

川芎

當歸各等

右剉一劑水煎溫服

○一論氣血兩虛而致寒作頭目眩暈者

十全大補湯

方見補益

依本方如有痰加陳皮半夏

○一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地疾涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛子以為腎經虧損不能納氣歸原

而頭暈不能攝水歸原而為疾陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸利治之而已

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰甚用八味丸料三劑而愈

八味丸見補益

○一大方瘡暈湯法半夏錢橘紅錢赤芍錢黃芩酒洗白木錢川芎五分黃連錢黃柏酒炒知母少石

膏錢薄荷錢甘草錢五分

右剉一劑

生薑三片水煎臨卧服

○一生冒形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地疾涎上湧手足麻痺

口乾引飲六脉洪數而虛子以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸原而為疾陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補

中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病即作用前藥而愈

○一孟都嘯氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮

大按之如無余以為腎家不能納氣歸原香燥致盛耳以八味丸料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神喜怒而帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯見補益補中益氣湯見內傷八味丸見補益

麻木

脉浮而濡屬氣虛關別得之麻在上體關後得之麻在下體脉浮而緩屬濕為麻痺脉緊而浮屬寒為痛痺脉微而芤屬虛血為木不知痛癢內經曰風寒暑三氣合而為痹故寒氣盛者為痛痺濕氣勝者善痺河間曰留著不去四肢麻木拘掣也經久曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深營衛之行滌經絡時疏故不痛皮膚不榮故為不仁夫所謂不仁者或周身或四肢唧

即然麻木不知痛癢如繩扎縛初解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木并作者古方謂之周痹治法宜先汗而後補也醫者亦各以類推而治之不可執一見也

○一論麻木遍身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜

加味八仙湯

當歸酒川芎熟地黃各一錢

白芍八錢

人參六錢

白朮去芦三錢

陳皮半錢

半夏曲一錢

白茯苓一錢桂枝三錢

柴胡四錢

羌活五錢

防風五錢

桂枝三錢

甘草三錢

伍秦艽六錢牛膝六錢甘草六錢

大棗三錢

右剉一劑

生薑一片

棗一枚水煎食遠服

氣虛加黃芪蜜炒八分

○一論麻是渾身氣虛也

加減益氣湯

黃芪蜜炒

人參一錢

白朮去芦三錢

陳皮一錢

當歸酒一錢

升麻一錢

柴胡一錢

木香各一錢

香附五錢

青皮去川芎各七錢

桂枝五錢

甘草六錢

右剉一劑生薑煎服

○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

補中益氣湯

依前方去

青皮

川芎

桂枝

白芍

甘草

大棗

升麻

柴胡

木香

白朮

當歸

半夏

姜

桃仁

白芍

大棗

白茯苓

紅花

白芥子

甘草

右剉一劑

○一論木是濕痰死血也

雙含湯

當歸一錢

川芎一錢

白芍一錢

生地黃一錢

陳皮一錢

半夏一錢

姜

桃仁一錢

白芍一錢

大棗一錢

升麻一錢

柴胡一錢

木香一錢

白朮一錢

當歸一錢

半夏一錢

姜

桃仁一錢

白芍一錢

大棗一錢

白茯苓一錢

紅花一錢

白芥子一錢

甘草一錢

○一論手足麻痺因濕所致也

杏蘇散

方見感冒

依本方加

蒼朮

黃芩

桂枝

白芷

羌活

木瓜

○一論感風濕手腫或痛或木或遍身麻木宜

五積散

方見中寒

○一論婦人七情六慾氣滯經絡手足麻痺宜

開結舒經湯

紫蘇一錢

陳皮一錢

香附一錢

台烏一錢

川芎一錢

蒼朮一錢

羌活一錢

南星一錢

半夏一錢

當歸一錢

桂枝一錢

甘草一錢

右剉生薑三片

○一論口角麻木涎及口角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木宜

止渴消痰飲

黃連一錢

半夏一錢

瓜萎仁一錢

黃芩一錢

白朮一錢

桔梗一錢

枳殼一錢

陳皮一錢

天麻一錢

細辛一錢

南星一錢

甘草一錢

右剉生薑三片

水煎服。血虛加當歸。氣虛加人參。亦有十指麻木。胃中有濕痰死血。加蒼朮白朮少佐。附子行經中死血者。四物湯加紅花桃仁韭葉。忌生冷魚腥發風發熱之物。

○一論十指疼痛。麻木不仁。大附子木香各等分。每服三錢。薑三片。水一碗。煎七分服。

○一論婦人遍身麻痺。謂之不仁。皆因血分受風濕所致。用祛風散送下五補丸。

祛風散 生川烏 白朮去白芷各三錢 甘草二錢 右為細末。酒調吞下五補丸。

五補丸 黃芪蜜炒一兩 人參蜜炒一兩 附子一个 當歸三錢 白芍五錢 酒炒五錢 右為細末。蜜煉為丸。如梧子大。每服五十九。祛風散送下。

○一論不仁者。謂不礙和也。痛痒不知針灸。不知是也。經曰。諸乘虛寒。而鬱冒不仁。蓋其血氣虛弱。不能周流於一身。於是正氣為邪氣所伏。故肢體頑麻。不知痛癢。寒過厥如死屍。而鬱冒者。心用麻桂各半湯。不愈者。補中益氣湯入薑汁設或汗如油喘不休。喘而直視。水漿不入者。此為命絕也。

○一論風熱血燥。皮膚癩痒頭面手足麻。

清涼潤燥湯 寶歸酒洗 生地黃各一錢半 黃連 黃芩 白芍蜜炒一錢半 川芎各一錢半 天麻 防風 羌活 荆芥各八錢 甘草六錢 右剉水煎

食遠服。麻甚加川烏炮三分。

○一論面上不處可將桂枝為末。用牛皮膜和少水化糊。調敷之厚一二分。若脚底硬木處。可將牛皮鑿化。入生薑汁調和。仍入南星末五錢。和匀。用厚紙襯貼二三分。乘半熱裏貼脚底。用溫火烘之。此外治也。

○一治兩手指麻木。四肢困倦。口慄嗜卧。乃熱傷元氣也。黃芪蜜炒一兩 人參蜜炒一兩 白芍蜜炒三錢 柴胡五錢 升麻一錢 五味子半錢 生甘草二錢 炙甘草二錢 右剉水煎。稍熱空心服。○一治兩腿麻木。沉重無力。多汗喜笑。口中涎下。身重如山。語聲不出。右寸脉洪大。黃芪蜜炒三錢 當歸二錢 苍朮蜜炒一錢 陳皮蜜炒一錢 黃柏蜜炒一錢 柴胡蜜炒三錢 升麻蜜炒一錢 知母蜜炒一錢 五味子蜜炒一錢 生甘草蜜炒五錢 右剉水煎。空心服。少待以早飯壓之。○一治皮膚間有麻木。乃肝氣不行故也。黃芪蜜炒一兩 白芍蜜炒一兩 楠皮蜜炒一兩 半澤鴻蜜炒五錢 甘草蜜炒一錢 右剉水煎。溫服。

癲狂。

癰脉搏大滑者。生沉小緊急不治。

狂脉寔大生沉小死。

癲脉虛可治寔則死。

內經曰。巨陽之厥。則腫首頭重。足不能行。發為胸滿。喘急。是蓋陽氣逆亂。故令人卒然暴仆。而不知人氣復則甦。此則癲之類也。又曰。陽明之厥。則癲疾欲走叫。腹滿不得卧。而亦面赤。妄見妄言。又曰。甚則棄衣而走。登高而歌。踰垣上屋。冒望不避。親疎是益得之於陽氣太盛。胃與大腸。蒙蔽燥火。鬱結於中。而為之耳。此則癲狂之候也。曰。癲曰狂。分而言之。亦有異乎。難經謂重陰者。癲重陽者。狂。素問註云。多喜為癲。多怒為狂。然則喜傷於心。而怒傷於肝。乃二臟相火有餘之症。難經陰陽之說。恐非理也。大抵狂為痰。

火實盛頑為心血不足多為水虛高遠不得安者有之癲病獨主半癲因火動之所作也治法癲者宜止狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三症者若神脫耳目瞪如愚痴者縱有千金我醉吾末如之何也已矣○癲者喜大不常顛倒錯亂之謂也○狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也又云狂者狂亂而無主定也○讖語者合目自言日用常行之事為讖也又蓄血症則重復語矣○鄭聲顛無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也○陰附陽則狂陽附陰則癲脫陰目盲脫陽者見鬼

○一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常

養血清心湯 人參 白朮去白朮皮 川芎 黃芩 生地黃 石菖蒲 當歸 甘草 麥門冬 蘇木 紅花 甘草 右剉

一錢 五分 五分 五分 一錢 五分 一錢 一錢 一錢

一劑水煎服

○一論狂者瘡人寢惑也宜後清心滾痰丸主之若風熱感者宜

防風通聖散方見中風 依本方加生地黃 桃仁主之一切大風癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也 以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以釵探吐熱痰次服

黃連解毒湯方見感冒 依本方加半夏竹葉竹瀝薑汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也

加味逍遙散 當歸 白芍 炒白朮 白朮皮 生地黃 柴胡 遠志 桃仁去皮 蘇木 紅花 甘草 右剉一劑水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心人參主心腹結氣故是以治時疾時熱狂言

苦參丸 告參為末煉蜜為丸如梧子大每服二十九薄荷湯送下

○一論一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚風入心并室女經脈通行驚邪蘊結頓服此經效抱膽丸 水銀一錢珠砂研 兩鉛半 兩乳香研 兩 右將鉛入銚內水銀結成砂子次下珠砂滴乳乘熱用柳木棍研勻丸如芡實大母一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動勿安再服一丸除根一方薄荷湯化下亦可

○一論癲狂失心不寐此方用硃砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能飲神歸心香可使利竅故乳香能豁痰達心志許學士加人參亦謂人參能寧心耳

靈芝膏 辰砂 雨酸棗仁 炒五錢 乳香 五人參 兩 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癲狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸 白朮 川芎 金砂 右為末米糊丸每服五十九溫水送下

○一論癲狂五癪驚悸一切怪症此皆痰火甚盛也。

清心滾痰丸 大黃酒蒸黃芩附青蒙石五錢沉香半錢牙皂五錢犀角五錢原寸分珠砂五錢

右為細末水為丸每服四五十丸滾水送下。

○一論心風者何蓋君人在心因怒發之相火助盛痰動於中腸氣上攻迷其心竅則為癲為狂所怒之事固於心轍自誤失其條序謂言之心風與風何干也若痰不盛則有感亦輕。

○一論久患心風癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守念多言不定此藥大能安神養血寧心定志以紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下○一人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈○一人氣心風即痰迷心竅發狂用真花石煅黃酒淬一次為細末每服一錢黃酒送下。

○一人癲狂五癪眩暉時作時止痰涎壅盛心神昏憊此屬氣血虛而挾風痰鬱火也。

驅風化痰湯 人參 白朮去白茯苓皮半夏炒陳皮 枳實炒當歸酒川芎 白芍酒炒桔梗去南星 遠志甘草水泡去心瓜蒌仁 白附子

僵蚕 天麻 黃連炒黃芩炒甘草 甘草 右剉一劑生薑五片水煎溫服。

○一癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守含多言不定一切真氣虛損用紫河車入補藥內服之大能安神養血寧心治健忘驚悸怔忡不寐以六味丸加遠志石菖蒲人參白朮各當歸酸棗仁炒○一治心恚狂惑用無灰酒一碗真麻油四兩共和匀楊柳二十條逐一條攏一二下擦遍楊枝直候油酒相和如膏煎至八分強者強灌之令熟睡或吐或不吐覺來即醒○一治狂言鬼語用蛤蟆一個燒為末酒調服○一治癲狂諸病 將軍湯 大黃浸一宿酒 右用水三升煎之分作三服。

癲狂病者多怒為癲多喜為狂癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也狂之病始發少卧少飢自賢自貴妄想妄動登高而歌棄衣而走是也癲病者賊邪之并於肝狂病者賊邪之并於心也此皆是症宜瀉而不宜補故用大黃以瀉之取其苦寒無物不降可以瀉實又必數日後方可與食但得還靜便為吉兆不可見其瘦弱減食方為得體故曰損其食飽之病必再作戒之戒之緩與之食方為得體故曰損其食氣則病易愈所以然者食入於陰長氣於陽故也又宜滾痰丸下之○一治癲狂不止得之驚憂極喜用甜瓜蒂半兩為末每服一錢井水調一盞投之即大吐後熟睡勿令驚起神效○一治邪狂癲癥不欲眠妄行不止用白雄雞二隻煮熟五味調和作羹食○一治因驚憂失心或思過多氣結不散積有痰涎留滯心包室塞心竅以致狂言妄語叫呼起音雄雞丸 珠砂用塊者二雄黃明淨者研成末 白附子白附子研末 右和勻以猪心血和為丸如梧子大另用珠砂為衣每服三粒以人參菖蒲湯送下常服一粒能安魂定魄補心益智。

○一牧童小子平日口中胡說一片鬼話令人驚駭予診之脉洪大此寔熱也以蚯蚓數條研爛井水調服立愈。

脉虛強為驚為風癇

癇症者發則仆地。悶亂無知。嚼舌吐沫。背反張目上視。手足搐搦。或作六畜聲者。是四益癇疾之原。得之於驚。或在母腹之時。或在有生之後。必因驚恐而致疾。蓋恐則氣下。驚則氣亂。氣歸腎。驚氣歸心。併於心腎。則肝脾獨虛。肝虛則生風。脾虛則生痰。塞極而通其發也。暴故令風痰上湧。而癇作矣。內經曰。然所以令人仆地者。厥氣併於上。寔下虛清濁倒置。故令人仆地。悶亂無知也。濁邪上干天君。而神明壅閉也。古脊心之苗。而脾之經絡連於舌本。陽明之經絡入上下齒縫中。故風邪寔於心肺。則舌自挺。風邪實於陽明。則口自噤一挺。噤故令嚼舌吐沫者。風熱盛於內也。此風火潮湧之象。背反張目上視者。風在太陽經也。足太陽之經起於睛明。狀脊而下。風邪干之。則貫而勁急。故目上視而背反張也。手足搐搦者。屬肝木。肝木主筋。風熱盛於肝。則一身之筋牽掣。故令手足搐搦也。搐者。四肢屈曲之名。搦者。十指閉提之義也。或作六畜聲者。風痰鼓其氣竅。而聲自變也。譬之弄笛焉。六孔閉塞不同而宮商別異是也。

夫癇之為病。角弓反張。手足搐搦。口吐涎沫。俗云猪圓風也。亦因金辰木旺。生風外出。驚邪入內以致之。蓋癇病一月數發者易治。周一年一發者難治。虛實之判也。實則即攻之。虛者先補可也。治法當先以瓜蒂散吐之。用甜瓜蒂為末。每服一錢。井水調一盞。投之即大吐後。熟睡勿令驚。起即效。後以湯藥調理。

○一論癇毒。宜下宜吐。茶子喜湯。而能吐。頑痰。宜取一丹。搗爛。煎湯服。得大吐便止。

○一論諸癇。神智不寧。時發狂燥。多言好怒。而容不澤。

定神至普丹 生地黃姜汁炒 橘紅 覆母 白茯苓去皮 黃連 遠志去皮 石菖蒲 酸棗仁炒 枳實炒 瓜萎仁 天花粉 甘草炒

右剉生薑三片。水煎服。

○一論癇者。痰涎壅併然也。

加減導痰湯

主方神效

南星姜制半夏

陳皮去白

白茯苓去皮

桔梗

山梔子

黃芩去皮

一黃連姜汁炒

甘草 木香

五分辰砂為末

右剉一劑。生薑煎。入竹瀝薑汁。磨木香末。調辰砂同服。

清心抑氣湯

當歸酒白芍炒 白朮去蘿

白茯苓去皮

陳皮去白

半夏姜汁炒

枳實炒

竹茹

石菖蒲

黃連姜汁炒

附各麥門冬川芎

人參遠志去甘草各四

右剉一劑。生薑煎服。

○一論大人小兒忽然昏暈倒地。五癇之症。

殊砂水飛用猪心一个削開入砂末。五錢。糊紙包南星。沸湯浸三次。巴豆仁五錢石灰

入仁在內。反冷取一將灰又以仁在內。再炒出用草紙包去油灰。不用全蝎去頭足尾。龍胆草兩錢。右為末。麵糊丸。如梧子大。每服十五丸。薑湯送下。

○一論風癇。搖擗心志。發狂棄衣而走。登高而歌。或數日不愈。踰垣上屋。妄言罵詈。不避親疏。妄見鬼神。一切潮熱。及風中厥逆。牙關

緊急並可治之。

三聖散 防風三兩瓜蒂兩二蓼蘆去苗加減用或一兩或二兩
沸卻入先煎約同煮三沸澄清候溫徐徐投下不必盡劑吐如吐不止煎勿白湯嚥三五口立解如不吐再加服之。○如服藥多不

吐出涎再飲薑汁鹽湯各一二盞投之如不出以光紋喉中探引即出矣須用白盆一个黑盆不見涎形狀吐出青黃涎沫二三升
為效吐罷之後吃微溫白粥一二頓此三性散汗吐下三法俱行防風發汗瓜蒂下泄蓼蘆湯吐凡用法則禁忌症候小者勿服病
久雖合吐勿服。○吐血人勿服。○主病不正勿服。○先正病人心神居淨室中善侍病者一二人溫克和柔善
誘病人則妙矣。○畏防吐後眩暈跌撲呼吐病人諸狂必損吐瀉能可與水及薪水峰心火勿食熱物。

○一論諸風癲癇不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暈胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏倦心氣不足神志不靈驚恐憂懼虛煩少睡
或發顛狂小兒驚癲風搐大人暗風羊癲風癲發叫如雷其效如神。

千金保命丹 珠砂二錢珍珠一錢胆星錢甘草

麻黃去根白附子地黃

雄黃

薄荷錢

防風

琥珀

金箔

牛黃各一錢

僵蠶炒犀角

右為粗末每服五錢用薑汁二盞煎三沸瀝於大碗中再用薑一盞煎清三

麥門冬去枳殼去桔梗去地骨皮

神曲炒白茯神去白朮去人參各一錢遠志三分

柴胡錢

天麻一錢胆礬七分水片少

黃芩錢

麝香少許

紫河車錢

黃芩荆芥錢

蟬退七分川芎

牙皂各一錢

右為細末

煉蜜為丸如彈子大金箔為衣用蠟包裹日

時取開每服一

九蒲荷葛湯磨化下不拘時服忌猪羊肉胡桃動風之物。○一參伯王攝庵公子患癲七年請醫罔效召余治以追風祛痰丸
安神丸二丸兼進半年而愈逾四年未發復因不善保守病發如前差役復求余治余以此方製藥一料投之輒效迄今數年不發
氣體已復原矣襄寧公優渥贈余匾曰醫士無雙余因此方屢驗故更一字名曰。

堅西癪無雙丸 南星半夏一兩一味用白芷皂角生姜煎湯浸一夜透切片隨湯煎乾去磬皂姜不用川芎芍藥歸身酒軟石膏各一天麻錢

僵蠶五錢

桂枝五錢

川獨活五錢

烏犀角五錢

白茯苓去皮

棟參

遠志去心

甘草水

來冬白

木去油

陳皮去白各一錢

酸棗仁炒五錢

軟石膏一錢

黃芩錢川黃連

去毛白附子研珍珠各三金箔三十

甘草錢

金箔三十

右為細末

好酒打稀糊為丸如梧子大

金箔為衣母服五十丸空心白湯送下最能

祛風化痰降火補益養血理脾益心定志輕者半料奏效重者全料。○一兒十五歲御女後復勞役考試失意患癲症三年矣遇勞
則發用十全大補湯加味歸脾湯之類更以紫河車生研如膏入蒸糯米飯為丸如梧子大每服百丸日三四服而痊後遺精盜
汗發熱仍用前藥及六味丸而愈此方治癲不拘老幼皆效。

清心滾痰丸 治諸風癲癇有殊效。

○一治驚癇方 白朮一兩半桂枝一錢半桔梗一錢半

白芍一兩半

甘草一錢半

白茯苓一錢半

棟參一錢半

遠志一錢半

甘草一錢半

來冬白

木去油

陳皮去白各一錢

酸棗仁炒五錢

軟石膏一錢

黃芩錢川黃連

母服二十丸薑湯送下。

夫健忘者陵然而忘其事也。盡心力思量不休為事有始無終言談不知首尾。蓋主於心脾二經心之官則思脾之官亦主思。此由思慮過多傷於心則血耗散神不守舍。傷於脾則胃氣耗傷而疾愈深。二者皆知人事則卒然而忘也。蓋心主血因血少而不能養其真臟。或停飲而氣鬱以生痰疫既滯脾不得舒。是病皆由此作治之必須養其心血理其脾土凝神定智之劑以調理亦當以幽閉之處安樂之中使其絕於憂慮遠其六慾七情如此日漸安矣。

○一論思慮傷脾不能攝血致血妄行或吐或下或健忘怔忡驚悸不寐發熱盜汗或心脾傷痛嗜卧少食大便不調或血虛發熱或肢體重痛婦人月經不調赤白帶下或晡熱內熱瘰癧流注不能消耗潰斂或思慮傷脾而作瘧痢。

歸脾湯 主方 人參三錢黃芩二錢白朮五錢白茯苓三錢當歸錢遠志一錢甘草去心龍眼肉一枚酸棗仁三錢木香分甘草十六分右剉薑茶煎服。

○一論諸症健忘及驚悸怔忡等症

加減補心湯 人參 白朮 無火速志泡去心酸棗仁炒知母 白朮 生地黃 當歸 石菖蒲 麥門冬去黃柏炒甘草 右剉薑茶煎服。

○一論寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱療咽乾除驚悸定怔忡育養心神大補元氣讀書勞神勤政勞心並宜服之。

天王補心丹 大中丞松石劉公傳加石菖蒲百部杜仲甘草 懷生地四天門冬去皮桔梗各五錢當歸 柏子仁 酸棗仁炒五味子

各一錢麥門冬去皮白朮去元參 丹參 人參〇一方加酒炒黃連二兩 右為細末。煉蜜為丸如梧子大珠砂為衣。每服二十九。臨卧燈心竹葉煎湯送下。燈心棗湯亦可。如飲食不思大便不是恐不宜也。又當服後方。

安神定智丸 功同補心丸 人參五錢白朮去皮白朮神去皮白朮去皮白朮神去皮遠志泡去心酸棗仁炒五味子另研辰砂二錢五分右為細末。元眼肉四兩熬膏和煉蜜三四兩為丸如梧桐子大辰砂為衣。母服二十九。清米湯送下。不拘時日。

○一論凡人多識不忘。春心血足而無所敵也。若心血不足邪氣侵之則傷其虛靈之體而學問易忘矣。龜介虫之靈物也。龍鱗蟲之靈物也。假二物之靈以養心之靈。欲其同氣相求。云爾。遠志辛溫味厚。辛溫可使人心味厚。可使養陰。菖蒲味辛氣溫味辛則利竅。氣溫則通神以之而治易矣。斯近理矣。

聰明丸 春元周用廷經驗 敗麗甲(火龍骨入雞腹中)速志去心 石菖蒲九節者 右為末。每服一錢酒調下。日三服。

○一論讀書辛苦而有房勞者 寶歸 生地黃 白朮 元參各一川芎 白芍 黃柏酒知母酒麥門冬去皮山梔炒甘草各五分 右剉一劑生薑煎服。

○一論癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍。多喜不定。一切真氣虛損用紫河車入補藥內服之。大能安神養氣益志。治健忘。驚悸。怔忡不寐。用六味丸加遠志。白菖蒲人參白茯神當歸酸棗仁炒研末。

○一論諸虛健忘等症。以十全大補湯去川芎肉桂黃芪加陳皮遠志石菖蒲麥門冬酸棗仁黃柏知母。

驚悸

脉寸口脉動而弱動為驚弱為悸。心中驚悸脉必大結飲食之慄。况伏動滑。

夫驚悸即動悸也。動之為病。惕然而驚。悸之為病。心下惕惕如人所捕。皆心虛膽怯之所致也。又曰。驚者恐怖之謂。悸者。怔忡。憤驚。悸健忘三症名異而病同。又云。心虛跳躍有時而厥者屬血虛。益人之所主者心。惟心之所養者血。血虛神氣不守。此驚悸之肇端也。

○一人聞聲即驚。醫者人之病人坐於堂下。使兩人扶之。醫自堂上以小凳木槌手擊而口云。吾擊矣。亦常事耳。爾何必驚且擊且言。患者視之。久而驚遂定。此深得平治之法也。

○一論驚悸怔忡健忘不寐屬心血虛者。

補心湯 王方 當歸二錢川芎白芍炒一錢生地黃二錢白朮一錢遠志八分白茯神二錢酸棗仁炒八分麥門冬一錢黃連炒一錢元

參五錢甘草錢三

右剉一劑水煎溫服。○一方。加柏子仁。

○一論血虛心神不安。驚悸怔忡不寐並治。

安神鎮驚丸 當歸酒洗一錢貝母去心川芎一錢生地黃酒洗一錢麥門冬去心酸棗仁炒白芍酒炒一錢遠志去心陳皮一兩白茯神去皮本黃

連五錢甘草錢三

砂研末水飛右為末。蜜丸如米大。每服五十九。食遠量湯送下。

○一論七情六慾相感而心虛夜多夢寐。睡卧不寧。恍惚驚怖瘦瘠。屬心氣虛也。

益氣安神湯 富歸二錢黃連姜汁生地黃麥門冬去心酸棗仁炒遠志去心各白茯神錢二分

人參

黃芪炒膽星各一錢淡竹葉錢甘草六

右剉一劑薑一片桑一枚水煎服。

○一論小兒大人被驚。神不守舍。瘡迷心竅。恍惚健忘。諸癰加風心風等症。

安神醒心丸 南星末兩川連末星木調和身成餅於飯面內蒸半日入南人參五錢製遠志末兩錢琥珀七錢白茯神當歸酸棗仁炒研末兩

右用雄猪心血三个。入竹瀝打細糊為丸。如梧桐子大。金箔為衣。每服五十丸。食遠白湯送下。小者二十九。

○一論異夢多驚。有二法。一於夢中戴粗大靈砂一囊。一於枕中置真麝香一囊。皆能杜絕異夢而廢夜驚。

○一論夜夢○陰盛夢大水恐懼○陽盛夢大火燔燎○陰陽俱盛夢相殺○上盛夢飛○下盛夢墮○飽夢與人食飢夢取人食○心

嘗夢蟠蛇○心虛夢致大陽物堅○肝虛夢細草芒芒○肝實夢伏樹下不敢近○脾虛夢飲食不足○脾實夢築牆蓋屋○肺虛夢白物斬血籍○肺實夢兵刃血戰○腎虛夢舟船溺水○腎實夢伏水中若有所畏

怔忡

夫怔忡者心中不安惕惕然如人將捕是也屬血虛有感便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人多是血少肥人屬疾怔忡者心胸躁動謂之怔忡此心血不足也多因畜養感風負賤不遂所願而成

○論血虛火盛怔忡心慌恍惚煩躁不寧

養血清心湯

當歸酒洗一錢川芎白芍酒炒一錢生地黃酒洗一錢

黃連薑甘草三錢片芩去核梔子炒八錢桑仁炒六錢

遠志去心麥門冬一錢各

右剉一劑生薑煎服

○論心煩憤懣驚悸怔忡胸中氣亂此血虛而火盛也

朱砂安神丸

朱砂另研水飛當歸酒洗一錢五分加生地黃酒洗一錢

黃連酒洗一錢甘草三錢

一方加入參白朮茯神酸棗仁炒麥門冬去心各

各半分為末煉蜜為丸如黍米大每服五十丸食遠米湯送下

○論思慮即心跳者是心中無氣少血故作怔忡也

四物安神丸

當歸酒洗白朮神桂皮白芍酒炒熟地黃

黃連炒片參白朮去皮附子仁研末臨竹茹

酸棗仁炒麥門冬去烏梅各一錢

子右剉一劑煎服

○論心氣怔忡而自汗者不過一二服而愈

參歸腰子湯

人參當歸身鐵猪腰子封右先以腰子用水二碗煎至一碗半將腰子細切入二味藥全煎至八分吃腰子以藥

汁送下如吃不盡腰子同上二味藥渣燒乾為細末山藥糊為丸如梧子大每服三五十丸米湯送下

○論精神虛慄恍惚不寐心思昏曠氣不足健忘怔忡

五味靈芝丸

人參白茯苓去皮遠志甘草冰石菖蒲滑石研末

酸棗仁炒黃連去毛柏子仁各二錢

當歸八錢木香錢砂半一錢入芍一錢

成右為細末煉蜜為丸如菜豆大半飴時來門冬去心煎湯下五六十九

虛煩

夫虛煩者心胸煩擾而不寐也多是體虛攝養有和榮衛不調使陰陽者一氣有所偏勝也或陰虛而陽盛或陰虛而陽虛則內熱陽虛則外寒陽盛則外熱陰盛則內寒令人虛煩多是陰虛生內熱所致虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之症卻無霍亂臨病宜審之○葉氏病源曰心煩不得寐者心熱也但虛煩不得

寐者。瘧冷也。

○一論病後虛煩不得眠及心胆虛怯觸事易驚短氣悸之或復自汗等症
溫胆湯 半夏湯泡七錢竹茹 枳實炒各三錢陳皮四錢白茯苓去皮二錢甘草一钱半右剉分二劑薑茶煎服 一方加酸棗仁炒遠志去心五味子熟地黃人參各等分

○一論大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不痛不可汗下宜服
竹葉石膏湯方見傷寒

不寐

不寐有二種有病後虛弱及年高人陽衰不寐者有痰在胆經神不守舍亦令不寐虛者用六君子湯加炒酸棗仁黃芩養神用溫胆湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁傷寒不寐者當求之本門

○一論心胆虛怯晝夜不眠百方無效服此如神

高枕無憂散 人參五錢軟石膏三錢陳皮 半夏炮姜白茯苓去皮枳實炒竹茹 李門冬法酸棗仁炒甘草各一錢右剉一劑龍眼五個水煎服

○一論勤政勞心瘞多少睡心神不足

養心湯 人參 李門冬法黃連微白茯苓去皮白朮神桂當歸酒白芍酒遠志陳皮 柏子仁 酸棗仁 甘草等右剉蓮肉五個去心水煎溫服

安神復睡湯 當歸 川芎 白芍酒熟地黃 益智仁 酸棗仁炒遠志去甘草水生山藥 龍眼肉各等右剉薑茶煎服

○一論心氣不足恍惚多忘或勞心胆冷夜卧不睡此藥能安神定智

加味定志丸 人參三白朮神桂木遠志甘草水石菖蒲各二錢酸棗仁炒柏子仁炒右剉砂乳杏為衣每服五十九卧東湯送下

附睡法 睡不厭路覺不厭舒眠者曲膝路腰以左右肋側卧修養家所謂獅子眼是也如此則氣深滿丹田常煖腎水易生益人多弘舒體而卧則一氣宣而寡畜神散而不清故卧惟覺時可舒體耳○西山蔡李通引千金方睡訣云睡則必側覺正而伸早晚以時先睡心後睡眼晦庵以為此古今未發之妙

○一論暗虛卧不安心多驚悸 酸棗仁一兩炒右為末每服二錢不拘時竹葉湯調下

○一治心下怔忡眼倒即大聲打鼾睡即醒不寐余以羚羊角烏犀角各用水磨濃冰入將所用或養心湯或復睡湯內服之立效

蓋打鼾者心肺之火也。

○一治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕狀頭目不清 人參 枳殼 五味子 桂心各三 柏子仁 甘菊花 白茯苓 柏子仁
各三 山茱萸五分 熟地黃五分 右為末每服二錢溫酒調下

厥症

脈陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏。

○氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也。氣屬陽陽虛則陰湊之故發厥也。血屬陰血虛則陽湊之故發熱也。氣虛發熱者不宜用涼藥。當用溫養氣血之藥以補之。宜養陰黃芪建中湯之類是也。又有一種病實熱者極而手足厥冷所謂熱深厥亦深此當用涼藥須以脉別之此最難辨。

○一論陽厥者是熱深則厥深蓋陽極則發厥也急以六順氣湯治之。

○一論陰厥者始得之身冷脉沉四肢厥逆足踰卧啞口青或自利不渴小便色黯宜四逆理中湯之類仍速火闢元百壯鼻炎有汗為度

○一論痰厥者卒然不省人事喉中有水雞聲者是也。用牙皂白芷等分為末吹鼻即以香油一盞入薑汁少許灌之立醞或燒竹瀝薑汁灌之亦可。

○一論蛇厥春乃胃寒所致經曰蛇者長虫也。胃中冷即吐蛇宜地中湯加炒川椒五粒檸榔五分石菖蒲梅丸。

○一論氣厥者與中風相似但風中身溫氣中身冷以藿香正氣散加南星木香烏藥如有痰以四七導痰湯主之。

○一論暴怒暴死者名曰氣厥蓋怒則氣上氣上則上焦氣實而不下行下焦氣逆而不吸故令暴死氣上宜降之。

五磨飲子 木香 沉香 檀榔 枳實 台烏鵲 右五味等分白酒磨服立效。

建中湯見汗症

六一順氣湯見傷寒

四逆湯見中寒 理中湯見中寒 藿香正氣湯見霍亂

四七湯見諸氣

心胃痛

脈沉細而遲者易治浮大弦長者難治

胃脘痛者多因縱恣口腹喜好辛酸冷飲熱酒煎燉後食寒涼生冷朝傷暮損日積月累自變成積自積成癥。癥大前熱血亦妄行疾血相繼始得升降故胃脘疼痛在酸冷氣餌雜惡心皆嘔膈反胃之漸者也。俗醫以燥熱之藥治之以火濟火誤矣古方有九種心痛曰飲曰食曰風曰熱曰冷曰悶曰蛇曰症曰去來痛失所謂冷者惟一耳豈可以熱藥治之乎須分新久若明知身犯寒氣口得寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥若病久則成鬱矣。鬱則成熟宜用炒山梔為君熱藥為之嚮導則邪易伏病易退病安之後若縱恣不改病必再作難治矣此病雖日久不食不死必須待服藥數劑痛定過一日漸而少食方得痊安其有真心痛者大

寒觸犯心君又曰汚血衝心手足青過節者早發夕死非藥所能療焉

○一論胃脹積有營熱痛不可忍者此亦治心胃痛之主方也

清熱解鬱湯 山楂仁炒黑五分 川芎一錢 黃連一錢 香附一錢 枳殼去穰麸炒七分 蒼朮米泔浸七分 陳皮分甘草分 右剉一劑生薑三

片水煎熱服服後戒飲食大半日再服一劑神效如痛甚加薑汁二三匙入藥同前

○一論諸精氣為痛心膈痛腹痛血痛腎氣痛肠下痛大便不通氣噎宿食不消等症 神保丸 木香二錢 胡椒五分 全蝎巴豆十枚去殼心研末 巴豆入巴豆霜再研 湯浸蒸餅為丸如梧子大疊砂二錢為衣每服五十粒○心膈痛柿蒂燈芯湯下○腹痛柿蒂煨薑煎湯下○血積痛炒薑醋湯下○肺氣盛者白芍蛤粉黃升各一錢同研為散煎茶白皮糯米飲調下三錢○氣喘癆白皮糯米飲下○腎氣痛腸下痛炒茴香酒下○大便不通蜜調枳榔末一錢調下○氣噎木香湯下○宿食不消茶下或酒漿飲任下○酒麵熱毒過度痰飲致臂痛柿蒂湯下○諸氣惟膀胱氣肠下痛最難治獨此藥能治之○

有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥乃流入背脊久之又注右膀胱痛甚苦乃合服一投而瘧再服除根

○一論治心胃刺痛并兩脇肋痛嘔吐胸痞大便堅六脉數或發熱口乾

清上飲 柴胡 黃芩 赤芍 厚朴 枳實 施子 鬱金 黃連 半夏 青皮 大黃 芒硝 甘草 右剉生薑三片水煎熱服

○一治心氣及胃脘諸痛鬱火所致者 肥施子姜汁炒十五枚 檀弓一錢 香附一錢 右剉水煎三滾入薑汁三四匙再煎一滾去渣入百草霜二是調和服之○一治心胃痛不可忍者或心神恍惚 施子炒黃連炒二味等分用茯苓茯神減半水煎服立止○一

治因多食煎炒燒餅米拌熟麵之類以致熱鬱胃脘當心而痛或嘔吐不已漸成翻胃 黃連一錢 白草一錢 右剉水煎溫服立止

○一治胃脘心氣作痛有熱者 酒餅炒施子炒石膏二錢 右剉水煎一服立止

○一論男婦小兒慣常心腹作痛其服一料以拔病根永不再發此藥能清痰涎消食積酒積肉積茶積一切諸積在胃脘當心而

痛及痞滿惡心嘈雜嗳氣嘔吐吞酸脾疼諸痛可定

無價金丹 白朮去芦炒 枳實炒 茶末炒 茯苓一錢 神曲炒半夏湯泡各澤瀉 赤茯苓去皮川芎 黃連一錢 白螺鈿每服各

砂仁 草豆蔻 黃芩炒 陳土青皮去皮 菊花頭子炒 生薑一錢 陳皮白香附子炒 瓜萎仁 桔梗錢 川厚朴去皮姜炒二錢 木香二錢 甘草一錢

右為細末青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作糊為丸如梧子大每服七十丸多至百丸米湯送下○吞酸加吳茱萸湯泡寒月用五錢熱月用二錢半○久病挾虛加人參扁豆石蓮肉各五錢○時常口吐清水加炒滑石一兩牡蠣煅五錢

○一論胃脫痛屬寒者

丁胡三連湯 丁香 良薑 官桂各一錢

右剉一劑水一碗煎七分用胡椒五十粒炒為末調入藥內頓服

一方用良薑木三分

分米湯調下。立止。○一治心胃刺痛不可忍者。胃口冷氣所致者。

乾薑肉桂

蒼朮浸炒半夏炒
汁右剉生薑煎服

○一論一切氣痛心痛腹疼及冷氣痛。良薑一兩。吳茱萸四兩。胡椒一錢。

右為末。

每服五分。輕者三分。用飛過硃砂三分。溫酒調服。

○一論氣自腰腹間攻心痛不可思。腹中水冷自汗如洗。手足寒急厥冷。二三錢酒煎八分入益一捻溫服。○一治諸般心腹氣痛或瘀血作痛。

桃靈丹 桃仁五錢。五靈脂五錢。大蠶頭五錢。

右為末。醋糊為丸。如梧子大。每服二十丸。酒下或醋湯下。○一人心胃刺痛手足稍冷出汗。指甲青白樂不爽。余用當歸三錢煎湯外用水磨木香沉香烏藥枳殼磨濃服立止。○一論寒邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒。乘於心令人卒然心痛或引背膂。甚則經年不瘥。

桂附丸 西園公龐驗 川烏頭炮去破附子三乾薑兩 二官桂二錢。川椒去目微赤石脂二錢。右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服三十丸。溫水下。覺至痛處即止。若不止加至五十九。以知為度。若是朝服無所覺。至午後再進二十九。若久心痛每服三十九至五十九盡。一劑終身不發。治心痛徹骨。皆如神。

○一論心腹疼痛每作必胸滿嘔吐厥冷。面亦昏麻。咽乾口燥。寒熱不時。而脉洪大。屢服寒鴻損真之故。內真寒而外假熱也。且脉弦洪而有怪狀。乃脾氣虧。搘肝木乘之。而然當暖補其胃。

補中益氣湯 方見肉傷 依本方加半夏。後芩。吳茱萸。

○一婦人胃脹當心而痛盛。右寸關俱無。左雖有微而似絕。手足厥冷。病勢后寫。察其色。眼胞上下青黯。此脾虛。肝木所勝。用參木茯苓陳皮甘草。補其衰氣。用木香和胃以行肝氣。用吳茱萸散脾胃之寒。止心腹之痛。急與一劑。俟滾先服。煎好再進。諸病悉愈。何況其痛無無法。而反用攻補之藥。禍不旋踵。○一婦人懷抱鬱結不時。心腹作痛。年久不愈。諸藥不應。余用歸脾加炒山梔而愈。○一唐儀部胸內作痛。月餘。腹亦痛。左關弦長。右關緩緊。此脾虛肝木所乘。以補中益氣加半夏木香二劑而愈。又用六君子湯二劑而安。此面色黃中見青。

○一論有蟲者。心面白斑白唇紅。又痛後便能食。時作時止是也。用二陳湯加苦練根皮煎服。上半月蟲頭向上易治。下半月蟲頭向下難治。或曰痛而久卧不安。自按心腹時大叫。或青或黃。唇緩目無睛光。此蟲痛也。

○一治蛔蟲作痛神方。用苦練根上皮。洗淨。白水煎。露一宿。次日早。燒豬肉一塊。嗅其氣。然後服藥。其法上半月服其蟲盡下。

○一治寸白蟲作痛。用酸石榴東南根。二兩。換榔榔五錢。大黃五錢。白水煎。露一宿。次日五更冷服。未服先燒些豬肉。嗅其氣。不可食。其藥上半月服之立效。一

○一論胃冷。蛇蟲上攻心痛。嘔吐四肢冷。

增補壽世保元

卷五

烏梅丸 當歸錢人參六錢炮薑一錢肉桂六錢大附子炮六錢去壳搗爛入蜜丸。如梧桐子大每服五十丸空心燒湯送下。烏梅用好醋浸一宿去核於五升米飯上蒸熟杵如泥和藥令相得納白中杵三十下。入蜜和為丸又治胃脣發咳而嘔嘔甚則長蟲出。

○一論蟲攻心痛并腹中有塊按之不見。往來痛無休止。

化蟲丸 鵝頭錢胡粉炒枯砕 苦棟根皮去浮 桧榔各五右為末麵糊為丸。如梧桐子大每服十五丸米飲入真芝麻油一二點打勺服之。其蟲小者化為水大者自下。一婦年四旬心胃刺痛時痛時止不思飲食食則即吐手足厥冷胸中痞悶口乾作渴余曰此胃中有蟲也以二陳湯加槟榔枳實烏梅花散炒黑乾薑苦棟根皮生薑煎一服打下蟲一大碗遂止。

○一論急心痛。

元靈散 五靈脂砂元胡索炒莪朶良薑炒當歸各等右為末每服二錢熱醋湯調下。

○一論諸心氣痛不可忍者。

絳雪散 白礬枯一硃砂錢生薑二右為末每服一錢五分輕者一錢空心白湯調下。

○一論心痛方 白礬枯一白硼砂五錢右為細末薑汁打麵糊為丸如黃豆大每服一丸溫酒送下。

○一治心胃刺痛如神 用生薑枯砕等分為末麵糊丸如櫻桃大每服三丸燒酒送下立止。一治心胃刺痛黑砂糖半錢熱酒調服。

○一治心氣痛五靈脂一錢枯砕二分為末溫酒調下。○一治心胃痛至死用良薑末三分米湯調下立止。○一徐四可治胃脣痛用炒鹽一錢生薑七片水煎一錘溫服立止。

○一論心腹痛不問寒熱新久一服立止。官桂五分白芍二錢甘草五分右剉水煎服。○如感風寒邪加香薷。○如有熱加芩連。○如大便閉及下痢初起任服寒藥不通腹痛不止加大黃枳殼立效。

一治胃脣痛甚諸藥不效者 黃連六錢香附子去皮附子一錢右剉一劑生薑三片東一枚水煎稍熱服。一治心疼痛荆子炒焦為末。

米飲調下。○又方蜜小鍤酒一碗同蜜煎濃調枯砕薑末一錢溫服出汗。一治諸血諸氣痛不可忍及解瘀血諸痛又治血滯腰痛三香沉麝丸 內翰蘇沉方 砂砂 血竭 沉蘇各一沉香分木香沉麝香半右剉為末磁器盛者生甘草膏丸如皂角子大每服一丸薑鹽湯嚼下。婦人產後氣血痛並主之亦治脾痛血滯腰痛用續斷牛膝桃仁炒煎溫湯送下。血暈用乳香泡湯研化服。

脈心腹痛不得息脉細小遲者生脉大而疾者死。

夫腹痛寒氣客於中焦干於脾胃而痛者有宿積停於腸胃者有結滯不散而痛者有痛而嘔者有痛而渴者有痛而大使不通者有