

醫燈續焰卷七

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人

陳 潛子含

校

顧濬含章之

大便燥結脉證第五十七

大便燥結。須分氣血。陽數而實。陰遲而澁。

燥結一證。稍有分別。大抵血液少者多燥澁。氣火

亡血乃諸竅
出血出自各
經產後脫血
屬衝任脉虛
一者大有分
別

盛者多結滯。然而燥則必結。結則必燥。又似難為

分別。但以脉合證。而屬氣屬血。自井然矣。氣火盛

者。為陽。脉必有餘。故數實也。宜局方麻仁丸之類血液少者。

為陰。脉必不足。故遲濇也。宜四物湯東垣導滯通幽湯之類氣血

一判而再審其因。有風燥。宜五仁丸得効皂莢丸搜風順氣丸之類火

燥。宜大小承氣湯麻仁丸之類亡血燥。宜四物湯之類產後脫血燥。宜四

物湯加人參黃耆之類嘔吐傷液燥。宜四君子加麥冬五味之類汗後亡

液燥。宜八珍湯十全大補湯之類腎虛液少燥。宜六味丸八老味丸之類

今人但知有熱結而不知有寒結即仲景所謂陰結也。選方亦妙。若結而實不妨以溫藥下之。

年血衰燥。

宜四物湯麻仁丸。生苳蓉潤腸丸之類。

氣實壅盛結。

宜六磨湯。

得効橘杏丸。蘇麻粥之類。

氣虛不能傳送亦結。

宜黃耆湯之類。

氣熱乾。

涸結。

宜大承氣湯麻仁丸。六一散之類。

氣寒凝滯不行亦結。

宜局方半

硫丸枳實理中湯之類。

但宜以脉辨證。以證求因。而用藥擬

方。無餘蘊矣。

附方

和劑麻仁丸

治腸胃熱燥。大便秘結。

厚朴

去皮薑製炒

白芍藥

枳實

麩炒各半斤

大黃

蒸焙
一斤

麻仁

別研
五兩

杏仁

去皮尖炒
五兩半

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服二十九。臨卧溫水下。大便通利則止。

四物湯

見第二十一

東垣導滯通幽湯

治幽門不通。上衝吸門不開。

噎塞氣不得上下。大便難。脾胃初受熱中。多有此證。治在幽門。以辛潤之。

當歸身

升麻稍

桃仁泥

甘草

錢各一

紅花

許少

熟地黄

生地黄

分各五

水二盞。煎一盞。調檳榔末五分。稍熱服。

得効五仁丸 治津液枯竭。大腸秘澁。傳道艱難。

桃仁

杏仁

炒去皮尖 各一兩

柏子仁

半兩

松子仁

一錢二分半

郁李仁

炒一錢

陳皮

四兩另為末

右將五仁另研如膏。入陳皮末。研勻。煉蜜丸如

桐子大。每服五十丸。空心米飲下。

佑賢曰津液雖枯傳道屬氣故陳皮分兩浮於五仁

得効皂角丸 專治有風人藏府秘塞大効。

猪牙皂角

枳殼

去瓢

羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

去皮尖另研

麻仁

另研

防風

川白芷

陳皮

去白各等分

右爲末。蜜丸如桐子大。每服三五十九。白湯下。蜜湯亦可。

聖惠搜風順氣丸 治三十六種風七十二種氣。

佐賢曰因風氣而見諸症者乃宜此方故云搜風順氣若無風何必搜氣不逆何必順今人則不審虛實一槩用之也

去上熱下冷。腰脚疼痛。四肢無力。多睡少食。羸

瘦。顏色不完黃赤。惡瘡下疳。口苦無味。增寒毛

聳。積年癥癖氣塊。丈夫陽事斷絕。女子久無子

嗣。久患寒瘧。吐逆瀉痢。變成勞疾。百節酸疼。小

兒老人皆可服。補精駐顏。疎風順氣

車前子

二兩半

白檳榔

火麻子

微炒去壳另研

郁李仁

湯泡去皮研

兔絲子

酒浸焙炮晒乾

牛膝

酒浸一宿

乾山藥

各三兩

枳殼

去穰炒

防風

去叉

獨活

各一兩

錦紋大黃

五錢半
生半熟

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。酒茶米
飲任下。百無所忌。早晨臨卧各一服。服一月消
食。二月去腸內宿滯。三月無倦少睡。四月精神
強勝。五月耳目聰明。六月腰腳輕健。一年百病
皆除。老者返少。如服藥。覺藏府微動。以羊肚肺
羹補之。久患腸風便血。服之除根。如顫語寒澁。
及癱瘓。服之隨卽平復。酒後一服。宿醒消盡。百

病不生。孕婦勿服。

濟生菴蓉潤腸丸 治發汗利小便。亡津液。大腸

秘。老人虛人皆可服。

肉菴蓉 酒浸焙 二兩 沉香 另研 一兩

右爲末。麻子仁汁打糊。丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

大承氣湯 見第十七

小承氣湯 見第十七

四君子湯

見第十六

八珍湯

見第十六

十全大補湯

見第十六

六味丸

見第十六

八味丸

見第十六

六磨湯

治氣滯腹急。大便秘澁。

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃

各等分

右各件熱湯磨服。

得効橘杏丸 氣秘老人。虛弱人。皆可服。

橘紅

取末

杏仁

去皮尖另研各等分

右和勻。煉蜜丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

蘇麻粥 順氣滑大便。

紫蘇子

麻子仁

不拘多少

二味研爛。水濾取汁。煮粥食之。

黃耆湯 年高便秘宜服。

綿黃耆

陳皮

去白各
半兩

爲末。每服三錢。用大麻仁一合爛研。以水投取
漿水一盞。濾去滓。於銀石器內煎。候有乳起。卽
入白蜜一大匙。再煎令沸。調藥末空心服。此藥
不冷不燥。其効如神。

六一散

見第四十四

局方半硫丸 年高冷秘虛秘。及痿痺冷氣。

半夏

湯洗七次焙乾爲細末

硫黃

明淨者研極細用柳

木槌殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下。丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。無灰溫酒。或生薑湯任下。婦人醋湯下。俱空心服。

枳實理中湯

見第十七

癲狂脉證第五十八

癲乃重陰。狂乃重陽。浮洪吉兆。沉急凶殃。

癲者。顛也。謂發時顛倒。異于平日。語言錯亂。喜怒無因。或笑或歌。或悲或泣。神迷意惑。穢絮妄知。平日能言。發反沉默。平日沉默。發反多言。甚或行步不休。或復僵仆不起。俗呼爲失心風。狂者。剛暴猖狂。呌號罵詈。甚則踰垣上屋。蹈火赴湯。不避死生。不知饑飽。倍常勇力。若邪所憑。俗呼爲發狂。二者證旣不同。因當各異。古人多以顛狂混稱。亦疎略

分陰陽之所
屬見依倚之
交通後發重
陰重陽參以
脉症癲狂殆
無漏義

矣。蓋人身氣爲陽。血爲陰。府爲陽。藏爲陰。府之手
足六經爲陽。藏之手足六經爲陰。形質可見者爲
陽。神志不可見者爲陰。身半已上爲陽。身半已下
爲陰。表爲陽。裏爲陰。凡此陰陽俱各兩相依倚。互
爲交通。而後氣血和平。府藏安靜。經脈調勻。形神
合一。上下無厥逆之虞。表裏無盛虛之變。如是則
微疴小疾亦無自而生。况癲狂乎。今癲云重陰者。
謂偏重于陰也。邪入于陰而陰實也。五藏爲陰。神

志舍于五藏。亦爲陰。設或抑鬱不伸。謀思不遂。悲哀不置。佗僚無聊。久久藏神凝結。情識昏迷。靈明何有。此癩之成于神志者也。

宜靈苑辰砂散歸脾湯人參琥珀丸之類

一種因陽虛不能衛外。反下陷而附并于陰。附并于陰。則陰氣實。下而不上。則升降紊而癩疾作矣。

卽脉經所謂陽附陰則癩者是也。

宜升陽益氣如補中益氣湯四

逆散之類

一種因三陽經從頭下行。三陰經不得

從足上行而逆下。下則陰經實。亦似陽附陰之義。