

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十九



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十九

瘴氣論
山嵐瘴氣論

瘴氣論
瘴氣論

周王朱楠撰

云江山霧氣多瘴凡以

瘴之法不一或謂其證

在裏可下者有在膈可

瘴者山嵐瘴氣之謂也今廣南山川地形瘴氣

欽定四庫全書

普濟方

所生之因及春夏之交瘴氣所起之時與夫人染瘴氣而治法悉著於篇庶可考焉且陽生於子盛於巳陰生於午盛於亥陽不極則陰不萌陰不極則陽不芽而廣南位當巳午則陽之氣蘊積於此可知矣天不滿西北地不滿東南西北土地高厚東南土地卑下而廣南屬東南則土地之卑下可知矣以其卑下而陰陽二氣之所蘊積是以四圍之山崇高回環百川之水悉所歸赴及秋草木不凋瘁當冬蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不

散霧露之氣易以傷害此正岐伯所謂南方其地下水
土弱霧露之所聚者也故瘴氣獨盛於廣南然瘴氣所
起其名有二孟夏之時瘴名芳草而終於秋孟冬之時
瘴名黃芒而終於辰四時皆能傷人而七八月之間山
嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣尤甚故當是時瘴疾大作不論
老壯或因饑飽過傷或因榮衛虛弱或衝煩霧或涉溪
澗但呼吸斯氣皆成瘴疾其狀頭疼體痛胃膈煩滿寒
熱往來欬逆多痰全不思食發渴引飲或身黃腫脹眉

鬚脫落是皆毒癘鬱蒸所致夫生於陵者安於陵其土
人宜無所受且日食檳榔蓋檳榔之為性破堅毒除蘊
積故耳治法當以磁石下收其陰次以丹砂上正其陽
陰陽氣正中滿自消然後以檳榔解其餘蘊 瘴與瘧
分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率
稱為瘴江北總號為瘧此由方言不同非是別有異病
然南方溫毒此病尤甚原其所歸大畧有四一山溪毒
氣二風溫痰飲三加之鬼癘四發以熱毒在此之中熱

毒最重故所用藥物須審病源患瘡瘴之後但是防瘴而發痢死不旋踵所以然者瘴體先虛虛不宜痢又瘴宜冷差痢宜溫斷斷痢則益瘴斷瘴則益痢大率如此不可不慎非直藥療亦須宜加將息取適若能一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘡最其妙也如不然先須斷痢然後療瘴瘴緩痢急故也仍變而作挾毒防之不得專醫其痢又服瘴藥皆在發前必須平旦空腹服藥之後勿洗手面漱口勿通外勿喫食勿勞力既過發時

久小進糜粥如此將療無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更是難療得瘧之後復癰癖亦有即發氣者死不嗽若熱渴者豉汁煖服取其得吐彌善水煮豉併犀汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪如兩棗許大水和飲之并燒猪糞作黃龍湯亦善各可服三二升又搗大鼠絞汁與服大止熱毒瘴熱病服此俱効其鼠并頭皮五臟等全搗若汁少著少許水和絞亦不難服常用立驗也

方

大五補湯

出千金方

治時行後變成瘴瘧

桂心

三十銖

遠志

桔梗

芎藭

各三兩

茯苓

乾地黄

芍藥

人參

白朮

當歸

黃耆

甘草

各三兩

竹葉

五兩

大棗

二十枚

生枸杞根

生薑

各一斤

半夏

麥門冬

各一斤

右㕮咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次內諸藥煎

取六升分六服一日一夜令盡

白微湯 治瘡瘡經百日或一年者

白微

蜀漆葉

各半兩

常山

一兩

知母

切焙半兩

大黃

生一兩

鼈甲

去裙襴醋炙黃三分

甘草

炙剉

苦參

升麻

半兩

石膏

碎三分

豉

一合

蒜

獨顆者三枝切

淡竹葉

切三兩

龍膽

黃芩

去黑心各半兩

赤茯苓

去黑皮三分

右判如麻豆大每服三錢水一盞酒半盞同煎至一

盞去滓未發前溫一服發時一服仍以藥敷塗手面

良

白朮丸 治瘴瘧

白朮 丹砂研 麝香研 丁香 訶梨勒皮

安息香入胡桃同研 檀香 華撥 犀角鎔各半兩

薰陸香 蘇合香 龍腦研各一分 莎草根 石膏

木香各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸空腹并華水下老人小兒三丸仍用紗絹袋盛帶於臂辟鬼氣臘月合以新瓷器盛勿令泄氣

治山瘴瘧寒熱頭疼方

出聖惠方

恒山半兩烏梅肉七枚

微炒豉心半兩

桃枝一枝柳枝半兩

鼈甲

半兩塗醋炙令黃去裙襴

虎頭骨

半兩塗醋炙令黃

乾棗

三枚

青銅錢一文雄鼠糞

二七枚

右細剉以酒一大盞半浸一宿明旦以重湯煮十餘

沸去滓分為三服空心一服良久再服欲發時一服

麝香散 治瘴瘧

麝香

研一錢

鼈甲

去裙襴醋炙黃半兩

丹砂

研二分

甘草

炙半兩

大黃

炒三分

恒山

一兩

右為散每服三錢末發前溫酒調下臨發更一服

木香丸

出直指方

治瘴

檳榔

雞心者

陳橘皮

湯浸去白焙各二兩

木香

人參

附子

大者炮裂去皮臍

厚朴

去麁皮姜汁炙

桂

去麁皮

羌活

去蘆

荆三稜

炮

獨活

去蘆

乾薑

炮

甘草

炙

芎藭

剉

天雄

剉炒

芍藥

各半兩

牽牛子

一斤搗取末四兩

肉苳蔻

大枚去殼

右為末瓷器盛密封臨服再用牽牛末二兩同研令

勻煉蜜為丸如梧桐子大心腹脹滿一切風勞冷氣
臍下刺痛口吐清水白沫醋心痰癖氣塊男子腎臟
風毒攻刺四肢及陽毒脚氣目昏頭痛嘔逆及兩脇
堅滿臨卧橘皮湯下三十丸以利為度婦女血痢下
血刺痛積年血塊胃逆手足心煩熱不思飲食生姜
湯下三十丸取利小兒五歲以上疳氣腹脹氣喘燈
心溫湯下五七丸小者減丸數服凡胸腹飽悶不消
脾泄不止臨卧溫酒下取利食毒癰疽發背山嵐瘴氣

纔覺頭痛背膊拘急即早宜服之快利為度常服可以不染瘴疾凡瘴疾皆因脾胃實熱所致常以涼藥解膈上壅熱并以此藥通利彌善此藥本治嵐瘴及瘟瘧大効以快利為度

菖蒲散 治瘴氣久治不瘥者

菖蒲乾者 白朮剉炒 蒼朮剉炒 梔子仁 荊芥穗

芎藭各一兩 甘草炙剉 乾薄荷 側柏炒黃 消石研

吳茱萸湯浸洗焙乾各半兩

右為散用薄荷煎湯調下二錢如患熱疾水一盞入

姜五片棗二枚擘破煎至五七分溫服

十補丸 治瘴氣虛弱面色萎黃不思飲食或困或醒

心腹脹滿痞氣耳鳴補元氣

巴戟

去心

肉蓯蓉

酒浸切焙

白朮

米泔浸一宿切焙

五加皮

剉炒

石斛

去根各一兩

鹿茸

去毛酥炙半兩

人參

菟絲子

酒浸一宿別搗

栢子仁

研菊花各三兩

右等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空

臨卧溫酒下鹽湯亦得

茵陳蒿丸

出聖惠方

治瘴疫時氣溫黃若嶺表行此藥常

帶隨身

茵陳蒿

四兩

大黃

五兩

豉

五合熬

恒山

梔子仁

熬

芒硝

研

杏仁

去皮尖雙仁炒研各三分

鼈甲

去裙襴醋浸炙二兩

巴豆

半兩去皮心熬別研去油

右為末煉蜜丸如梧桐子大初得時氣三日以粥飲

旦服五丸至半時許或吐或利或汗為効如不吐利

不汗更服一二丸即以熱飲投老小加減凡黃病痰
癖時氣傷寒瘧痢小兒熱欲發癇服之瘥治瘴氣尤
妙一方無大黃有麻仁

露宿湯

恒山

炒一兩

秦艽

去苗土

梔子仁

柴胡

青蒿子

檳榔

生判

甘草

炙判各半兩

桂

去麋皮一分

右麤搗篩每服三錢水三盞入烏梅二枚黑豆二十

粒煎至一盞去滓露一宿五更初再溫服其滓再入