

一方用核桃肉七箇大罇子肉一个硫黄烟水銀仁其爲

便癰

便癰俗云便毒實血病也生于腿胯小腹之間近陰上則疝除
肝經及衝任督三脉隨道精氣出入之路也或入房忍精或思色
不遂或泄下泄敗精凝滯爲瘡腫痛在胯腹之間

江氏傳先用蘇葉 陳皮 香附 麻黃 干葛 升麻 赤芍

羌活 一點煎服 後以川山早紅白姜蚕 炒皂角 炙五靈脂

炒大黃其爲細末酒調下通三次而安或去五脂加白芷貝母

亦妙 体虛者用 人參 煅艾熱再入大黃 錢同炒畧熟取服

初起及久欲成漏者俱宜 蠟丸丸神効

應員製 治便毒用 姜虫 板榔 牽牛 貝母 白芷稍

大黃川山甲 錢仁同煎 炮皮硝 紅生磨大黃 烟錢 空心服通四

五次以粥止之外用信子白丸醋調敷如要腫破用烏豆去皮

生搗爛鴨清調敷過一

夜即破出膿

薄氣

是症凡便毒下些

近陰下處治宜大黃蚰川山甲蚘黃柏

黃芩

美虫

白芷

三白木煎生酒調服被蓋出汗爲度或

黑牽牛

七錢

大黃

五錢

午藥子

貝母

各三錢

羌活

獨活

錢甘草

一錢

好酒

心熱服

四時

驢馬

是症即便毒左右

而邊俱發或先有茸瘡而發或卒然起

核疼痛而發

治法同便

毒但潰後亦如總要敷洗化毒生肌

路岐

俗名瘰癧些小腫

痛此症小兒患之多因食積痰滯

祖傳用

亭午雄黃川練

花粉枳殼貝母甘草等分爲末南酒調

服三五劑

出膿即消

如痛不可忍

者用細辛

連川山甲乳香沒藥連喬歸尾大黃按

一錢

花牡蠣車前子

手制核桃去油酒煎五更服

如腫

一錢

粉爲末搽之鹽湯洗之內以赤膏

生髮良藥 乙并出為度澤用敷

通標 治宜山慈貝母川 四甲大黃茫硝模柳我木煎服或大黃

川山甲姜黃黃芪牡礪 酒水各半同煎空心服

懸癰

懸癰之症乃足三陰虧損 生谷道前陰囊之間初發甚痒狀如松

子或如蓮子日久如桃李 加以赤腫若破則大小便從此中而出

不可救也輕則漏血而 死重則肉潰而亡

此症初起濕熱壅滯作痛 痼腫者治宜腦疽內活命飲去大黃加

倉木料如不成膿不潰者 八物湯或腫脹已成者急針之腦收斂

如血虛者宜歸芳芍黃人 參白木氣虛者參木苓芍歸川草

如脾虛者補中益氣湯如 久成漏者八物湯加其桂或蠟凡丸此

病常服固老膏雖患亦 照雖潰亦淺若誤用涼寒必不可救

固老膏 粉草帶節 用山瀾水一碗浸三時令透以慢火炙

干仍投水浸透再炙至水干爲度酒三盞煎至八分并澄空
心服三日一服

谷道中生瘡

治宜水中

何葉卷筒綿裹納下部日三次即愈

肛門爛出水作痛或痒或

出血用石硫黃

五錢

冰片

一錢

爲末擦

但先每用銀花散艾花

椒槐花水洗

肛門腫痛熱毒用枳殼刺

視角黃連

各乙

兩陳冬瓜皮

二兩

右爲

末空心酒調服

痔瘡

痔瘡不論男婦小兒俱有何也經曰富因酒色財氣病緣負重擔

輕婦人因經後受冷月後傷風小兒多母腹受熱利後積血搃之

臟腑虛而血脉未貫風濕犯而食毒日因七情鬱結寒怒交戕於

是血氣下墜羶聚肛門宿滯不散而衝突爲此症也然症分二十

四原有歌謠云痔漏分三八憑君仔細看穿腸并鼠尾酒色兩相

子莫言翻花怨蜂窠亦不實雖雄并氣血子母及盤腸玄殊猶可
怪勾腸痛若鎖核桃與旋氣聞見即心酸粟子於中大雞心在外
安刪瑚形可惡脫肛狀不堪內痔肛邊出搭腸裏內盤垂珠更难
治日久有雞冠治疳虛寒男妄施針刀此症凡毒深者大如雞冠
蓮花核桃毒淺者小如松子牛奶乳心鼠乳櫻桃雖種仁不同皆
三陰肛也治法亦不甚殊當知痔非外邪乃臟內濕熱風燥四氣
相合濕熱流入大腸而成毒但瘡頭向上或硬者熱多向下或軟
者濕多也

祖傳治血痔用槐花槐角地榆黃芩當歸枳殼荆芥黃連蒲黃木

香酒糊爲丸空心酒下有熱者宜飲下外以文蛤白凡桑寄生

朴硝蓮房煎水先熏後洗

如氣痔肛門腫痛便難強力則肛出不收用紫蘇陳皮枳殼槐花

桃仁木香檳榔香附甘草姜三味一煎服

如酒痔飲酒則發用干姜枳元半下生黃茯苓杏仁黃芩甘草

豆豉白梅一箇姜三片煎服

如角痔浸淫爛濕歲積月累及腸穿穴用黑玉丹

○黑玉丹 牛角腮 蝟皮 雷丸 芝蔴 猪蹄用板槐

角三頭髮 敗棕 苦練根 右藥俱入罐內燒存性取

出入乳香 射 爲末酒糊丸梧子大先嚼胡桃一枚溫酒下十

五九日二服甚者三服忌別藥此方善治男婦痔漏腸瘋疼痛

及谷道虫痒不忍者

如雞冠痔 用生桃橙葉杵爛煎水燻洗得効或五倍子楠硝桑

寄生蓮房倍荆芥先燻後洗

如牛奶痔 用明雄黃 一兩 班狗五十 將雄黃爲末同班狗入新

竹筒內七日去班狗以雄黃燻痔其効如神

如翻花痔先用荆芥朴硝防丰煎湯洗之次用木別幣金研末八

龍腦少些水調敷要用猪胆十個和均貼尤妙

如湯肛痔用花椒和輕粉杏仁十個搗為末猪胆汁調搽如疼

後可以防丰通聖散加減服

如梅毒用象牙龍骨一兩杏仁去皮輕粉各一冰片七厘其將

公猪脚火筒骨髓調搽

如虛兒傳治痔血箭肛脫方用槐角地榆川黃蓮連翹荆芥牛蒡

子綿一婦尾只壳防丰合以仁赤芍黃芩車前木通路

分李仁白芷胡麻甘草各三分每發時空心服三四貼

如牛奶腸瘋濺血及腸出不以惡痔疼痛用經霜後收的冬瓜皮

火上焙切為末每老酒調服一錢

陳進士傳治穿腸痔漏二十四種惡痔及楊梅惡瘡悉皆神效

用蟾酥五硃砂各一雄黃各一乳香各一沒藥各一丁香各一草烏各一

用姜汁煮過十二箇去油俗各沙各為末或為丸牙皂土

心不見者每正頂

扶苓湯送下每日用一分

藥末早米打糊爲丸如痔漏腫瘡米

湯下如瘡瘡及筋骨痛去

海蚌加蜈蚣爲妙此方與衆不同專

治痔漏大有神功如綿花

瘡筋骨酸痛者削草除根神効無比

黃氏傳治內痔用黃連枳壳

漏芦槐角地榆芫花川芎吳黃川山

甲校子蒲黃甘草黃芩同

煎又用于馬齒莧湯煎一碗開攪藥

一碗服但必先服過藥後五日方放出腸擦洗

放腸法馬錢子二箇合起用麵包火炙成炭去麵爲末一錢初

生小兒臍帶爲末五分四時以津調棍子上敷肛門四圍其腸

即出用竹刀刮去腸上毒物後用刺蝟皮

燒過磁石末一分花柳

蛛包一個黃泥以三味將病人涎調敷上即收病即愈其洗用鹽

茶洗切宜久忌毒物及房事

如內痔入敷藥後大便緊急

宜閏腸丸磁石黑丑牛白芷各二兩

半生或姜二大黃

一兩酒

黃連五兩枳壳兩木香仁艾爲末水

一翻丸如梧子大每五十空心服酒下服二三次爲止

如小便不通用葱一握煎湯洗小腹則通

如大小便不通用澤瀉紅朱苓赤苓白朮焙吐益智仁陳

皮枳壳車全木通絡小茴五分甘草燈心煎空服

如血不止用烏梅側艾葉五井花水煎服或五倍而生青丸研石

芟茶二兩煎水洗肚其血自止

如痛甚者用前服冰片乳香沒藥爲末水調搽

如肛不收者用蜆皮一個礮內燒焦黃存性磁石礮碎肉桂三錢

驚甲鐵三爲末米飲調服炙熱鞋底托上

如大腸結硬下墜多血痛不能忍用婦尾澤瀉生地黃只壳大黃

郁李仁蒼朮秦苑皂角仁研成膏麻子仁一錢半水煎空心服

祖傳細方不問男婦遠年近日二十四種痔漏不用刀針祇有

○括藥藥白砒烏絲白血五種二味入鉄杓內先用白朮末

方小書卷之三

又放砒一錢又放紅白乳蓋面將慢火熬至烟淨出火毒入後

藥兒茶錢血竭蛇含石一錢醋炒芫花仁硃砂一錢雄黃一錢硃砂

乳香一錢沒藥一錢各一錢去油輕粉一錢荊芥石一錢右十二味

共同一處為極細末合五分之一用液津調開捏作薄毒餅子

如此大藥餅又放些簪脚大用陰干聽用大凡醫痔之法首用

喚痔散當先喚出痔來纔好下手枯痔藥

○喚痔散單用生胡椒一錢為極細末空心用生酒一瓶隨量大小

送下待半上午其痔即消出來方用津液調前枯痔藥如稀

糊樣週圍搽上枯藥必道中納一藥餅痔孔內插上簪脚樣

的梃子一枚後用白紙封固但上藥之後疼痛難禁則不必

憂心書云若藥不順眩厥疾不瘳故曰惡病還用惡法也但

是上藥之後血即隨手而止疾則刻日而安每三洗三換新

藥若是大便堅硬須用大黃酒蒸透熟為極細末每日用酒

調服一錢以稀薑為度間服蝟皮散

○蝟皮散 治二十四種痔瘡出血裏急疼痛

槐花炒 艾葉炒 枳壳 地榆 當歸 川芎 黃芪 白芍

白凡柏 貫衆 蝟皮炙 蛤頭髮 燒灰三錢 皂角 炙黃 祛諸後

蹄重甲 炙十枚 右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九

煎米湯下換藥敷至六七日看痔瘡變黑色堅寔乾枯不痛

方用浸洗之藥拔去病根若是痔瘡未曾乾枯過腳還要生

藥凡朝以乾枯堅硬為度

○浸洗脫落痔根方 用生艾葉 白頭翁 索羅草冬青葉

左纏藤 綿花子及各樣疎風散血之藥煎出水來將痔瘡

燻洗待藥水溫七之時坐在脚盆之內日日洗浸五七次待

其痔瘡浸洗至五七日之內其痔根自然脫下以落盡為度

絕不用浸洗待落下痔根隨用生肌散搽在痔窠之內每日

又用新蘄之藥頻洗次生肌散首尾前後半月之內可以除根脫胎而復舊也

生肌散

嫩老鼠子

干一個

雞內金

三錢

乳香

沒藥

各一錢

兒

茶紅輕粉

錢

耳石

三錢

雄黃

一錢

破絲網

巾

二錢

血竭

錢

兒骨

錢

陀生

飛火

林黃柏

末

錢

大黃末

一錢

右爲細末

二

日一次洗換新藥白肤生肌平復矣屢試神効

漏毒

方

治

瘡

癰

疽

凡瘡疔久則宿膿腐肉停蓄其間穿口必透風冷外侵治以穢膿流出如缸甕之有漏孔九漏肝主銀河山鼠漏大腸主螻蛄漏腸主轉筋漏原因氣血壅滯染觸而動含之是毒而名其因治則一也在疔則有穿腸穿腎穿陰者又有無疔肌門左右別生竅流出膿血名爲草漏竅在皮廬者易愈藏臍損者難治如漏症初起淡紅微腫小核宜涼血清熱燥濕用加味槐角丸久

則內如稿白外如黑腐淫虫惡臭宜收斂殺虫溫補用前痔瘡

口加味槐角丸 槐角 生地 略二龜膠 川芎 各五 當歸 黃

芩 黃芪 黃連 藜朮 防丰 只壳 地榆 升麻

連喬 略一白芷 五共為末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十漸

至七八十溫酒送下

又有初起因風冷者久則虛而挾濕熱者丹溪用參朮黃芪芩歸

為君佐以蝟皮蛇退牛角腮蜂房之類服之外用津唾調附子

末作餅如錢厚放瘡上漏大疔大艾漏小疔小艾炙令微熱不

可令痛乾則易新餅再炙如倦暫止次日又炙宜至肉平為度

外用雲母膏貼之畏炙者內生肌丸最妙枯凡 鹿角 芝麻 牙

祖傳治漏症 用人言 料 明凡 兩乳香 沒藥 朱砂 各五 蛇

含石 醋 一兩火 煨七次 先將人言為末入沙鍋內火煨待烟起將明凡

蓋人言上看有烟起處以凡末填之漸匕用凡末蓋爲度候凡
乾白色待冷去上面凡末取人言爲未入前葉共爲細末將一
半麵糊作針一半綿皮作條蘸麵糊拖藥末槎乾用真綿纏凡
遇漏先將藥針入漏內漏深入深漏淺入淺待三日毒盡却用
帛條入痛處漏深入深漏淺入淺日漸抽出其帛條即生肉
凡遇穿腸痔漏用好細絲線八煨蛇含石醋內煮過要從夏秋月
內收取蜘蛛網過綱絲一相共合絲線穿入漏孔內穿法先將
野灯心草破開些穿入透出却將藥線入于野灯心破開處透
出如無野灯心草將嫩布線兩掛繫銀絲上穿入却將長線入
糞門內接出去銀絲却將絲線八一根于布線內抽過絲線再
將原絲線頭入第二根布綿內抽過絲線來却不是來去兩轉
收緊締一葢待明日解開葢又收緊些仍縛一葢莫令寬日日
如此線落後以生肌合口

雜錄法

芫花根大戟根金項玉梅花五爪龍鵲巢并八水內

煮汁去滓將後嫩絲線八汁內煮一二沸取線風乾聽用

如痔漏不脫綿者用百草霜草烏尖各一為末并花水調筆點

如脫線不生肉用枯凡五倍子為末摻之即生

如穿線不收口用芎藭皮為極細末生肌甚快藥煮過苦甘草石

次之如痔漏痛不可忍用黃連黃柏鬱金硃砂水片乳香沒藥白

芷等分為末水調作錠子陰干挿入孔中

如痔漏血不止用陳棕箬葉枳實各炒灰歸尾炒鱉甲炙蜂房猪

左懸蹄性燒存黃柏槐角共為末米糊為丸梧子大每米湯下三

如原有痔漏肛門別生二塊弥膿就在痔孔出者乃食積注下也

宜連魏散

口連魏散 黃連 阿魏 山查 神曲 桃仁 槐角 連翹

皂角等分為末以少許置掌上時上舂之津吞下

子孫治一人肛門外陡生一毒其勢如核久而破出膿甚臭遂將

猪肉湯鴨毛制洗以貝母末搗即安後復成一孔出水子以爲

漏用白雷丸切一兩皮硝四兩將公猪大腸一頭線扎將皮硝築入

一層雷丸築入一層如此築凡五層而頭蘇扎將尾盛腸火焙乾

用如吃下取出雷丸同石乳香五真沒藥五苦楝粉四刺蝟皮

一个焙切其爲細末酒調服

龔應圖製透漏丹治漏如神

象牙末五黃蜂窠去姜蚕去頭廣木香出乳香

沒藥血蝟各三右八味爲末次用黃蠟八兩銅銚熔化熬白色

離火入前藥末攪勻成汁傾入水中取起爲丸此一科藥分作

百丸臨睡時服一九早晨空心一九俱白湯下又服後方枯凡

兩鹿角末兩芝麻兩煉蜜丸如倍子大溫酒下三十塞竅去鹿

角加象牙兩黃蠟爲丸常服斷根