

欽定四庫全書

子部
仁端錄卷六



詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁端錄卷六

齊民要術

利服賦

日四

本極遠而外

止之所本

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

勢方安靜出欲盡而不

氣之所响血漸化水兮

腫而休怕密則毒多兮

氣血不充而有憂時日既足今自翹翹而雜起表裏無邪兮勿汲汲以作湯若有陸續不出之狀或隱隱于皮膚之內不起名為不快若非風寒鬱遏之因必是氣血不振之故是以四日已前痘毒方出身表宜涼則氣血和平痘色必然潤澤至于四日之後毒出已定身表宜溫溫則腠理開通其毒易以成漿故至此而身不微熱雖未必至于冰伏而痘瘡斷乎勿長四五日來血包已就候當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白

者已具行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿

六日依然到頭空殼虛花

氣虛之痘虛火上乘陽症故不分光不行漿

皮薄

而光亮如燈内含是水頭尖而脚根不紅行漿不實是以熱毒盛而未解則為紫為黑壅而不起為陷為塌滯而不榮為乾為枯為青為灰怯而不振為不快為停漿或有毒先腫脹而痘久不起者漿則滯而不行毒則遏而不出故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色還紫不變溫之可興氣血弱而不振發遂成不快之狀紅潤

依然如舊補之則起紫色乾枯且忌溫中帶補只宜活血鬆肌毒之壅滯烈藥雖然可發透肌猶是良方澹泄惟宜溫補瀉盛佐以升提頭面預腫今三陽亢甚而必亡咽喉急痛今火灼肺金宜早治

起脹總論

放標之後漸漸起脹痘瘡發出一分則毒發出一分胖盡則毒盡有不起者或因元氣本弱不能送毒或因雜症阻滯不能升發皆發熱放標之時失于調攝故也此

時不治後難救矣

痘之起發只以出勻為期不可拘定日數痘出以漸其發亦以漸謂之適中

痘曰起脹是點出已定毒氣盡出時也氣血定位毒被制伏成膿矣若白不泛頂紅不斂窠氣血與毒混一不分是元氣弱也故必察形色審舌胎為主

有痘起發嬌紅潤澤至四日光潤如油珠每自搔破破處更見光澤遍身頭粒分明紅艷起發圓潔亦不為

害

有痘面上粗平起脹時無頓針之處猶如錠蓋面上但髮際耳後腮後明潤至七日腫退八日復腫必成薄漿結靨而生婦人年長者多有之

痘至四日起發太驟亦非吉兆蓋表虛毒重也七日後腫退倒靨皆因此而變遇此症須分虛實治之

痘至五日即帶黃色假漿也當以神采辨之有神采者真漿也假漿必無神采或補或瀉惟古是準

起脹時痘頂有小孔不黑不白曰蛙痘大泄元氣腠理不密故也大補氣血其孔自密諸痘自起用保元湯加丁香 肉桂 川芎 當歸 鹿茸

或問毒滯痰停與風寒之阻塞有辨乎曰渾身壯熱焦紫乾枯塌陷腫脹或肉腫而痘不腫者毒滯肌肉也內外無症但板硬不起者痰滯經絡也板膩不起而復喘滿身熱者風寒阻塞也

起脹順症

報頭三日後先後大小雖不等而根窠紅澤面目漸腫無他症者順也或腮頤一二悅目鼻塞流涕口角流涎眼朦不欲開者亦順也

起脹逆症

四五日頂平脚塌赤色過頭紅如衄血根窠散漫五六日鼻不塞眼不合

起脹時口出臭氣者肺胃敗也失聲者咽喉腫潰也體寒者陽脫也嘔泄者腸胃敗也利不止者臟氣絕于內

也手足厥者腑氣絕于外也手足現而復隱起而復塌者枝葉萎也皆不治

痘嬌嫩皮軟不碍手以燈照之如琉璃以手按之水漿就出內色不暗此假壯也十二三日決不能收功急假表以防內攻或似榴之紅而不痛核之硬而不動癰之腫而不潰皆血不榮也不出四五日必搔痒悶塌而死頭面不起脹雖遍身皆壯不治

痘不起而根皮先腫亟用內托散加穿山甲

痘紫而刺破如屋漏水者不治

初起面上胸前只有三五處顆粒糝糊脚根腫硬至漿期一齊擁出先疎而後頓密也危症

五六日氣血不分焦紫陷伏頭面紅腫或舌白至唇處者曰內潰或雙目腫脹神氣無光或胸高喉腫及氣粗喘者皆死症也

有面部無痘四肢反多背上乾塌焦紫或溺短澁或血妄行徧身痛至四五日身背起如蜂針隱隱若有若無

皆凶候也

餘俱詳
見各卷

起脹險症

色裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者至重
瘡端裏黑點如針孔者勢劇也

四五日不成血泡頂陷灰白或五六日頂陷脚斂或脚
雖塌而血附是血旺氣弱也頂雖綻突而無紅暈是氣
旺血虛也初時一片紅點斑疹雖分至起發時斑疹盡
散惟見痘在此先似密而後實疎半輕半重

有痘四圍高中心畧低者乃中氣不足發未透耳能食者至漿期自充滿而起若不能食宜扶中氣疎者用人參白朮散密者用解毒化斑湯

四圍起中心落陷此是死肉其形如錢者宜急攻之若變黑點不可治矣用四君子湯合四味順氣飲加燒人屎或紫草飲有四圍起頂皮不起腳根不擴猶是死肉之形不見新生之水此乃起發不透審虛實以治之如氣本實者必曾感風寒用桂枝葛根湯合奪命丹氣本

虛者必不能食而吐利急補中氣而發表邪用人參白
朮散合奪命丹

有痘六朝勻朗朗潤但是頂陷乃不實不虛之症至期
自然充灌若妄治以補劑反加煩熱便閉目疾癰腫

凡年壽天庭印堂坎離不起者即用升天灌頂散未效
再服數部若起不妨

有痘四圍乾平不起中心突起或裏紅外黑者由平日
受風寒皮膚堅以致毒鬱而不散也宜解表邪用桂枝

葛根湯十宣散外浴水楊湯

四圍乾枯中心微起含水者由毒蒸津竭也急以疔法治之
有痘聯串皮腫肉浮者或四旁旋出小痘攢聚長胖漸
成一片者此候最重用快斑湯合消毒飲加燒人屎更
宜嚴守禁忌以防觸變

有糊塗聯串痘色灰白面目浮腫如錫餅樣能食便調
別無他症者此不過痘出太多氣血難周耳往往綿延
日久渾身脫皮而愈倘食少而渴却無吐瀉裏虛之症

用保元湯加當歸 芍藥 防風 桔梗 牛蒡若有
吐瀉用木香散溫之

有七八日後面瘡赤腫是血未嘗化水遽然成漿也後
必潰爛而死

托腮痘見點脚塌但正面光澤起發亦不至危若時日
已多發猶不透急導心經熱毒用導赤散送下牛黃清
心丸若毒蘊譫狂此陽氣獨盛無陰以和之也用退火
回陽丹大便不利用當歸丸微利之或膽導法甚則用