

# 欽定四庫全書

子部  
婦人大全良方卷十五  
六五



婦人大全卷之五

經水不調  
辨經水不調  
辨經水不調  
辨經水不調

經水不調  
辨經水不調  
辨經水不調  
辨經水不調

宋 陳自明 撰

為青白或黃白或水穀

內傷冷也謂之洞泄寒

澀小便赤腹脇脹滿煩

或小便不利得熱則極

脉虛大而數由乘虛熱入於胃湊滲下焦津液不分併於大腸謂之協熱利先以五苓散利小便次以黃連阿膠元或三黃熟艾湯凡泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿微痛其脉沉緊而小數謂之冷熱不調宜戊己元和之凡暴下或青或白水穀或化或不化腹脇或脹或不脹或痛或不痛但餽生熟氣全不思食其脉內虛外實右關脉沉緊者謂之飧泄先去沉積宜感應元後調和之凡治瀉先須理中焦如理中湯元是也次即分利水穀

如五苓散是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石

脂是也

亦可就第八卷第八論選方通用

厚朴元 治妊娠洞泄寒中

乾薑

厚朴

去粗皮細剉

右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煮麴糊為圓如梧桐子大每服五十圓食前米飲下

草葉散 治妊娠藏氣本虛宿挾風冷脾胃久弱藏府虛滑臍腹疔痛日夜無度

厚朴

去粗皮薑汁浸炒黃二兩

肉豆蔻

一箇麩煨

草豆蔻

一箇煨

右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓熱

服

三黃熟艾湯

方見第八卷第十論

理中元

理中湯

五苓散

黃連阿膠元

戊己元

感應元

已上並見和劑局方

妊娠下痢赤白及黃水方論第二

凡十五方

論曰夫妊娠之人胞血既閉臟氣不理脾胃易傷或恣

食腥肥生冷脾胃停滯不能尅化冷熱相搏致令心腹攪刺疼痛膿血赤白雜下古書所謂滯下是也原疾之由皆因冷熱不調大腸虛冷熱氣客於腸間熱氣乘之則赤冷氣乘之則白冷熱相交則赤白相雜而運滯水止名為滯痢也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿涕而有赤脉如魚腦此名魚腦痢又有血痢者熱乘血入於大腸為血痢也血之隨氣外行經絡內通臟腑常無滯積若觸冒勞動生熱熱乘血散滲入大腸

腸虛相化故成血痢也

療妊娠患痢膿血狀如魚腦髓小腹絞痛難忍

阿膠

炙二兩

地榆

酸石榴皮

三兩

薤白

切一斗

黃連

方

是黃蘗皮各  
三兩並細切

右用水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膩

療妊娠白膿痢腹中冷

乾薑

四兩

赤石脂

六兩

粳米

一升炒黃

右用水七升煎取二升溫分三服忌如前

療妊娠腹痛下痢赤白不可忍

黃連

一方是白朮

石榴皮

當歸

各三兩

阿膠

炙二兩

熟艾

一兩半

右用水六升煮取二升溫分三服忌如前

療妊娠腹痛下痢膿血不止

黃連

八分

厚朴

製

阿膠

炙各六分

艾葉

黃蘗

各四分

分 乾薑

五分

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服

療妊娠臍下刺痛大便白晝夜三五十行

根黃

厚者蜜煮令焦

大蒜

煨令熟爛去皮

右以根黃為末研蒜作膏為元如梧桐子大空心粥

飲下三十元日三服妙

一方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下

療妊娠痢黃水不絕

厚朴

薑汁炙三兩

黃連

二兩肉豆蔻

五箇連皮

右用水二升煮取一升頓服忌如前

已上六方並出產寶

文仲療妊娠下痢不止方

黃蘗

乾薑

赤石脂

各二兩

酸石榴皮

一枚

右細切以水八升煮取二升分三服

古今錄驗療妊娠下痢方

酸榴皮

黃芩

人參

櫟皮

各四兩

粳米

三合

右細切以水七升煮取二升分三服

療妊娠挾熱下痢冷熱不調千金翼同

黃連

一升

黃蘗

一升

梔子仁

二十枚

右為末每服五錢水二錢浸三時久煮十沸頓服嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常痢

一方治中暑挾熱下痢無梔子仁用薑錢羊脂煎服肘後方療妊娠下痢赤白如魚腦腹中絞痛

阿膠炒黃蘗

地榆

當歸

各一兩

川芎

酸榴皮

各三分

右為細末葱白粥飲調二錢

療妊娠下痢腹痛不食

薤白

切一合

當歸

炒

地榆

各一兩

甘草

半兩

糯米

一合

右為散以水七升煮取二升去滓溫分三服

療妊娠下痢腹痛小便澀

糯米

一合

當歸

炒

黃耆

各一兩

右細切和停以水二瓊煮取一瓊二分去滓溫分四

服

治妊娠臨產下痢

右梔子不以多少燒存性為細末每服一大錢空心

熟水調服甚者連進四五服即止

治妊娠藏府氣素弱頻併下利時時腹痛漸覺羸瘦面

色痿黃不美飲食

厚朴一兩半 白朮 川芎 白芍藥 當歸炒熟地

黃各一兩 乾薑 人參各五錢 訶子三分 甘草一分

右呖咀每服四錢水一錢棗三枚煎至六分溫服

療妊娠下痢赤白絞刺疼痛出三因方

烏雞子一枚就頭上開一穴 黃丹一錢入雞子殼內打令均以厚

紙裹黃泥固濟  
煨取乾為細末

右每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者是

女

妊娠大小便不通方論第三

凡十方

論曰夫妊娠大小便不通者由藏府氣實而生於熱熱者隨停之處則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱所結故煩滿而大小便皆不通也

小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服甘遂散下之

太山赤皮甘遂

二兩

右一味為末以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服下之後還將猪苓散不得下日兩服漸加至五分以微利為度經心錄同

猪苓散 療妊娠小便澀痛兼療胎水

猪苓

五兩  
去皮

右為末白湯調方寸匕加至二匕日三夜二不差宜  
轉下之服前藥

古今錄驗療妊娠得病六七日以上身熱入藏大小便  
不利安胎除熱葵子湯

葵子二升滑石四兩  
碎

右以水五升煮取一升去滓盡服須臾當下便愈

又方

葵子一合川朴二兩硝二兩

右研每服三錢水一錢煎至六分去滓溫服

治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩

熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 郁李仁去皮

北五味各一兩 桑寄生 甘草 苦梗各半兩

右為粗末每服三錢水一錢煎至六分溫服

治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食

大黃 木通 檳榔各一兩 枳殼三分 大腹子三枚 訶梨