

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六十九



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十九

編輯外科心法要訣目錄

下部

懸癰

穿襠瘻

跨馬癰

便毒

疳瘡

陰虱瘡

腎囊癰

腎囊風

婦人陰瘡

腎部

鵝口疽

坐馬癰

腎癰

上馬癰下馬癰

涌泉疽

臍毒

痔瘡

坐板瘡

御纂醫宗金鑑卷六十九目錄

欽定四庫全書

醫宗金鑑卷之十八

婦科心法

下部

惡露

難產

久不生育

此言一名駢馬瘡生於身間係前陰之後後陰之

如桃三陰虧損濕熱鬱

前屏翳穴即會陰穴係任脈經首穴也初生如蓮
子微癢多痛日久炊腫形如桃李由三陰虧損兼
憂思氣結濕熱壅滯而成其色紅作膿欲潰若破
後潰深久則成漏以致瀝盡氣血變為瘡勞初起
氣壯實尚未成膿小水澀滯者宜用九龍丹瀉去
病根稍虛者仙方活命飲利去濕熱如法治之遇
十證可消三四如十餘日後腫勢已成不能內消
宜服托裏消毒散或托裏透膿湯自破如不破腫

高光亮脹痛者用卧鍼開之穢膿一出其腫全消
者順朝服六味地黄丸午服十全大補湯溫補滋
陰又有過食膏粱厚味氣實者初服龍膽瀉肝湯
潰服滋陰八物湯又有房勞過度羸弱者初服八
珍湯潰服十全大補湯脾虛不食六君子湯日久
成漏者國老膏化湯送服琥珀蠟礬丸外治法按
癰疽潰瘍門當戒房勞怒氣魚腥發物慎重調理

九龍丹

木香

乳香

沒藥

兒茶

血竭

巴豆

不去油

等分為末生蜜調成一塊磁盒收貯臨用時旋丸
豌豆大每服九丸空心熱酒一杯送下行四五次
方食稀粥腫甚者間日再用一服自消

方歌

九龍丹醫懸癰毒初起氣實膿未成木香乳沒兒

茶竭巴豆蜜丸酒服靈

滋陰八物湯

當歸

生地黃

白芍藥

酒炒

川芎

丹皮

花粉 各一錢

澤瀉 五分

甘草節 一錢

水二鍾燈心五十寸煎八分食前服

大便秘者加蜜炒大黃一錢

方歌 滋陰八物過膏梁懸癰已潰服此方四物丹皮花

粉瀉草節便秘加大黃

仙方活命飲

琥珀蠟礬丸

托裏消毒散

俱見腫瘍門

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

六味地黃丸

見面部雀斑

十全大補湯

八珍湯

六君子湯

即香砂六君子湯減去藿香砂仁俱見潰瘍門

龍膽瀉肝湯

見腰部纏腰火丹

國老膏

見背部丹毒發

穿襠發

穿襠毒發會陰前憂思勞傷濕鬱源焮痛紅順塌陷逆腐深漏溺收斂難

註此證生於會陰穴之前腎囊之後由憂思勞傷濕

鬱凝結而成初起如粟漸生紅亮焮痛潰出稠膿

者順若起如椒子黑焦陷於皮肉之內漫腫紫暗
並無焮熱痛連臍九及腰背肛門者逆此係皮囊
空處凡生毒患宜速潰根淺但遇根深遲潰腐傷
尿管漏溺不能收斂者至險內治按懸癰外治按
癰疽腫瘍潰瘍門

跨馬癰

跨馬癰生腎囊旁重墜肝腎火濕傷紅腫焮痛宜速潰
初清托裏勿寒涼

註此證一名騙馬墜生於腎囊之旁大腿根裏側股縫夾空中由肝腎濕火結滯而成初如豆粒漸漸腫如鵝卵隕墜壅重色紅炊痛暴起高腫速潰稠膿者順若漫腫平塌微熱微紅潰出稀膿者險多成串皮漏證此處乃至陰之下醫治不可過用寒涼初宜服仙方活命飲消之次服托裏透膿湯既潰之後內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲

見腫瘍門

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

便毒

便毒生於腿縫間忍精瘀血怒傷肝堅硬木痛寒熱作
初汗次下灸之痊

註

此證又名血疔又名便癰無論男女皆可以生發
於少腹之下腿根之上摺紋縫中經屬肝腎由強
力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精搏血留聚
於中途壅遏而成或為暴怒傷肝氣滯血凝而發

初如杏核漸如鶩卵堅硬木痛微熱不紅令人寒
熱往來宜荊防敗毒散汗之若煩躁作渴氣鬱者
宜山甲內消散以消解之若過於堅硬大痛者宜
紅花散瘀湯舒通之前藥用之不應者宜九龍丹
攻之若無痛無熱則不可攻下宜陽燧錠日灸五
七壯以或輒或消或潰為止膿勢將成不可強消
宜黃耆內托散托之甚虛者托裏透膿湯既潰宜
八珍湯十全大補湯補中益氣湯因證用之外用