

前 言

祖传医药，是宝贵的文化遗产，是我们人民几千年来，同疾病斗争的经验总结。它是一个伟大宝库，对我们民族繁荣，作出很大贡献。解放以来，广大中草医药人员，在党的中医政策正确领导下，在除害灭病，支援工农生产大跃进，保证人民身体健康，起到了积极作用。而且在现在和将来，为人民健康事业，为医学事业的发展，将更发挥伟大作用。

这卷小册子收集的单方秘方，是在一九五八年十二月廿五日，召开的除害灭病卫生工作大会上，八十三位中草医药人员，只用一早一晚的时间献出来的。由此可见我县中草医药人员，在党的领导下，打破了保守，破除了迷信，解放了思想，是愿意把自己同疾病斗争的经验，公开于世，为群众健康服务。这是党的中医政策胜利，我们在动员献方运动时，是认真总结中草医药在我县除害灭病工作的伟大功勋，进一步肯定中草医药成绩，并批判资产阶级思想对中草医药的错误看法，鼓起了中草医药人员干劲。因此才获得这样成绩。我们相信，这些单方秘方，对保证人民身体健康，消灭疾病，将起重大作用。希各地中医、草医、西医人员，试用总结，观察推广！

痼疾方

药物：草药、青蒿、马兰草（又名铁树根下~~行~~、~~多~~、~~近~~、~~去~~、~~叶~~）、
老鸦酸（又名酸藤叶）、野棉花~~根~~、~~这~~、~~条~~、~~药~~、~~性~~、~~晚~~、~~服~~）、
以上药前四种若用三斤，野棉花根~~用~~、~~下~~。

制法：晒或烘干共研细末，每服二指（用大指与食指）。

服法：拾量一天两次，病发前与发后吃。

特点：病正发时也能吃，同样有效，但必须用药末约钱半泡开
水搭全身，服本方如无特殊反应，可酌加剂量，加多少
可以酌量推试，开水送下。

钩 虫 （黄种病）

药物：黄荆子（即黄荆条的干子）、野花椒（或树皮）、贯众、苦
楝根皮，以上四药，黄荆量多，余药减半。（本方集萃
药，可以分开单用一种或两种试验。）

制法：晒或烘干共研细末，米粉糊为丸，梧子大。

服法：适量吞服，由少到多，以不发生特殊反应为度。（用开
水送下）。

中 药：

药物：苍朮^切、礞石^丸、酒曲^丸。

制法：共研末末糊为丸，梧子大（滑石粉为衣）每服十至廿丸。

服法：一天三次，开水送下。

又：

药物：楸子^丸、热柳^丸、川椒^丸、雷丸^丸、苦楝根皮^丸。

制法：共研细末，水打为丸，梧子大，每服十五至廿丸。

服法：一天两次，开水送下。

说明：以上两种丸药，如患病者身体大虚，有重度贫血症状，可先服前一种丸药，约十天上下，体虚有了改变，再加第二种丸药同吃，如果病情不太重，可以两种同时吃，如单纯生蛔虫，只吃第二种丸药。

又：

药物：樨子_一、樨榔_二、川楝_三、大蒜_二。

服法：以水煎浓，分两次服下，一天一剂。

上药服二至三付后服下方：

药物：厚朴_一、苍朮_二、甘草_三、神曲_四、煨皂丸_五。

服法：水煎服，一天两次，每天一剂。

验方：

药物：煨皂丸_一、铁灰（又名针砂）_一、硃砂_二、鹿香_三、（黄木香亦可）、夏硝_四。

制法：末糊为丸，梧子大每次服七丸加到十一、十三丸均可。

服法：一天两次，开水送下。

丝 虫 方

草药：

药物：杉木浆、椿木浆、枫香木浆、三角茅量。

服法：适量调酒吞服，一天两次。

又：

药物：干桃子、干石榴、干茶泡、加食叶少许。

服法：一天两次喂水服。

又：

药物：香叶（即做神香用的树叶）大香叶（也是做神香用的一种，又名观音香），核桃树皮、大蒜、雄黄。

服法：喂水服。

说明：以上方剂，以往用是沒有一定分量，希在实验中，观察确定用量。

又外洗（即象皮那方，不论下肢阴中均可洗）

药物：臭牡丹、下枯草、蕊草（即四棱草）杉木球（即杉树枝上结的球）没硝

用法：将上药熬水洗，洗后用外滴以布洒烘热擦患处。

蛔 虫 方

草药：

药物：野花椒（或树皮）苦楝根皮，一色组（又名野韭菜）。

红大麻根、棕树根等五种都可杀蛔虫。

用法：造量用，并可观察有效剂量。

根据蛔虫病症状，阴中肿大，象皮阴茎脉管而胀，鼠蹊结核肿大，微热作寒，小便如米针或如骨斗等症，拟定下方，希作临床观察，确定疗效。

1 桔梗丸：

药物：桔梗、桃仁、昆布、海藻、川楝，以上五钱至一两等分，枳实、桂皮、木通，各二至五钱，元胡三钱。

制法：共研末为蜜丸，梧子大，每服三钱。

服法：一天两次，开水送下，如病势轻，亦可酌量减服。

2 加味龙胆汤：

药物：龙胆汁（炒黑）^三、柴胡^二、泽泻^三、前仁^二、木通^二、山桅^二、
 归尾^二、黄芩^二、单梢^二、赤芍^二、茯苓^三、桂枝^二、
 芦荟^二、川楝子^二（加外少许作引）。

煎法：水煎服，煎三次，一天一剂。

说明：本方亦可酌加剂量，制成丸子，服量酌定，并作临床观察，又可作外洗药，煎汤每日洗二次。

流 鼻 血

药物：白芨、松树叶、雄黄、大蒜。

用法：共捣浓敷湧泉穴，其血立止，血止去药，无白芨亦可。

来源：係朱星瑜传刘治，曾经治十人均有效。

頭 暈 嘔 清 水

药物：老君扇、白根、过龙。

用法：喂鸡蛋吃。

治 沙 淋

药物：斑蛾、枝、朱砂少许。

制法：斑蛾为末同朱砂和饭为丸吞服。

验案：曾治数人，有特效。

面 黃 作 瘦 腹 膨 飲 食 无 味

药物：焦术^二、云苓^三、陈皮^三、台党^二、只壳^三、黄芩^二、

省曲^三、白芍^二、使君^五、大白^三、麦芽^二引。

用法：加減。熱加柴胡、花粉，大便結加黃芩、白朮、枳實各三錢。

瀉去白朮、枳實，加米苓、法下。

十歲以下減半服，兩歲以下禁服。

功效：能消食杀虫，健脾補胃，開味進食。

偏頭瘋方（浮腫）

藥物：川芎、白芷、黃牛腦髓一個。

服法：共為細末和酒蒸熟吃，使后睡一下即愈。

女人脫胎

藥物：別甲頭、鐵絙子根、去茄子壳、玄陽合、芥麻、熟地、當歸、續斷、共煨水服。

治痢症

治法：白芍、當歸、酒苓、火白、桂枝、木香、煨水溫服。

肚脹痛有食又寒又熱

处方：開王道氣湯：

藥物：羌活、陳皮、香豉、白芷、川芎、白茯苓。

干姜、滑石、山梔仁、神曲、甘草。

服法：煨水服，服二次愈。

飲酒大醉

治法：用白砂粉調水，多食極效。

延年肚痛特效药

药物：六曲^一、单^一、灵^一、黑^一、麦芽^一、芡^一、
 青^一、天^一、大^一、双^一、尔^一、木^一、
 青^一、苡^一、君^一、香^一、姜^一、米^一。

服法：米糊为丸，每服十，用茺藟子或紫苏汤送下。

说明：延年肚痛，得午时痛至丑寅二时止的，服之立愈。

久咳痰火

治法：用生姜^一、茺藟子^一、蜂^一、白^一、杏仁^一，煎服即愈。

咳嗽忌药方

药物：陈皮^一、桔^一、前^一、法^一、粉^一、芩^一、
 只^一、南^一、胆^一、海^一、苦^一、芥^一、
 宝^一、瓜^一（去皮）、木^一、知^一、甘^一。

用法：共为细末，用白开水送下，大小加减。

食飢冲目（鸡目眼）

药物：杏仁^一、古^一、酒^一。

用法：上面神药共研细末，拌酒渣塗眼匡。

色劳病

药物：陈皮^一、白^一、蒜^一、三^一、车^一、茅^一、南^一、
 星^一、小^一、杉^一、女^一、寸^一。

功效：治的个好的个。

大 便 柏 虫

药物：黑砂，1—2分为末

用法：和饭为丸，量病轻重，以开水吞服。

刀岩破伤口出血（小方）

治法：以熟石灰、黄丹各半为细粉，掩伤口。

功效：止血止痛，提肉生肌。

说明：掩药禁湿水。

最痛的真龙壳疮

治法：以正北早炒焦黑和黄柏为末，用木油调，洗去疮壳，用鸡毛搽上。若痛中带痒，加黄丹少许。

治 膠 疾 病

药物：独思毛、双皮、车廷菟_三、戈把言、小通草，喂水服。

腸 内 生 馬 黄

药物：红藤子_四、号筒根_一。

服法：煮水服，日服一次。

烏 痧 症

药物：寸香_一、辰砂_五、陳石灰_一、（古庙或老桥下取）蟾酥_三、雄黄_一、木香_一。

用法：共研细末为丸，辰砂为衣。

说明：凡遇腹部突然膨胀，万分胀现青筋紫黑色，百药无效，此方独灵，曾治廿六人均立愈。

治半边风头痛

治法：薄荷菜叶（水）用香葱吹鼻孔。

便毒

药物：下谷草、蒜血草、满天星、贯头夫、六月良、五抓红。
用法：口嚼塞上即有效。

蛔虫病

药物：红藤、苦楝皮、小通草、共喂水服。

红痧症

治法：汗巾、狗史坡夫、洋咸、月素子、长把坟、共喂水吃。

疔志疮

药物：水清潔律、三月坡夫、子求夫、对嘴木塗上。

腹痛

药物：干脚泥二刀、車前草二刀、鸡蛋白二刀。

用法：共捣为团，在腹部向下揉赶。

说明：内服黄瓜黄一把更妙。

治大便秘结：用多年尿壺加皮硝一两，烧气薰之。

无名肿毒

药物：麻部、楠泥巴树根、铜样草、灰色黄、神酒配

消一切无名肿毒

药物：破瓷碗碎片屑、金银花叶一把。

用法：将瓷屑捶粉，再用金银花叶共捣后加冷饭共捣敷患处

四支肿

药物：当归、皂下、朱砂、白朮、炒凡、大白、肉桂、合乌草根、羌活、牡丹皮、铁衣、研细为末

又

药物：蒙古子根、小通草、隔山消。

钩虫

药物：酸色根、半音子树、脾胃和鸡蛋。

疾

药物：桃仁、子立研细粉水服

腹痛

药物：蜂衣草

四支肿

药物：神曲、茯苓、大白、小通、山来、姜皮 水煎服日三次
功效：曾治好数百，男女可治。

頭身俱腫

藥物：槐子樹葉三斤、食鹽四兩。

用法：將藥煮濃汁，倒在腳盆內，病者坐在盆上，用被子圍緊，待病者汗出如牛，腫云則腫消。

大腸大腹

藥物：木香 30、蒜盤子 30、過龍 30、三也根 30半、煎水服。

大便不通

藥物：小於臘喂水充服，三次即愈。

一切腹痛痧症

藥物：苦蕒滓渣莖、小麥滓渣莖。

用法：將莖渣共曬存性，用開水沖泡，澄清后服下。

又

治法：用絲衣葉一大把，取其自然汁和冷開水服，有特效。

又

治法：用開水灌入陳鱗骨腔內，倒出澄清后吃服，有奇效。

治腹瀉

藥物：白朮、云苓、赤苓、皂下、桂枝、甘草、姜棗引。

又

藥物：五枚 30、白石 30、甘草 30

用法：共研末和結粉，用開水沖服

治胃病气痛

药物：芫术 二钱、姜卜 二钱、青皮 二钱、香附 二钱、元砂 一钱、木香 一钱。

胃痛微背

药物：樟树皮 三钱、香附 三钱、广香 一钱、元胡 三钱

用法：用将取去上面粗黑皮后，煎水服三次

验案：本方曾治多人均有效，如刘年姑11岁得此病，治后即愈。

胃痛病积年不愈

治法：雄猪心一个、胡椒（每粒一粒，视年数多而定量）共煨服

胃痛

药物：五付散、青木香、透身汗、桂香子皮、杆草、四两麻、

服法：共研粉末，用酒冲服

心裡痛

药物：桑树上的君子、樟树君子、细心草、大血藤、黄风、

服法：每样各一钱煮水喝，每天二次。

暴症肚及心痛

药物：正苏山虎 三钱、四金瑞、桐寄生 一钱、百合莲 一钱、香夫竹

用法：捣细末冲水服，孕妇禁吃

翻胃嘔吐

治法：老生姜片用布包定浸煮缸内七日漂淨晒干为末酒冲服三次

脾土虛弱面黃腫脹

藥物：杏仁_四 居肉_四 神曲_四 查肉_四 大白_四 欠實_三
連肉_四 麦芽_四 伏毛_二 蔞陳_三 甘草_一 姜皮_一
淮山_二

用法：煎水服，小兒減半。

肚大

藥物：二丑牛_一 (平生熟) 大白_一 广香_三

服法：共為細末，和黑砂糖調服。

婦女乳腫

藥物：蒲公英、姜黃、白芷、赤芍、花粉、大黃、連台、

各二錢共為細末用半酒半茶敷之

腹腫腹飽

藥物：棕樹根_五 寸香_二 桐子樹根_四 西星_一 木子樹根_四
生薑_二 (煎服)

一切陳疔爛疔

治法：先以新鮮生豆漿塗敷患處，再以銀渣子樹葉研末搽患處

飲食不消

藥物：六油_一 山查_一 欠實_一 只實_二 只壳_三 吉更_二
蛤合_一 甘草_二 珠砂(衣) 研細為末 每付二錢 姜湯送下。

急吐血方

治法：艾炙法：如血来过急，可灸足壮风府和风池两穴，轻则各一灸，重则各三灸，此方曾治多人均有效。

吐血衄血

治法：以胎髮烧灰存性，将灰吹鼻则鼻衄立已，另以灰末冲童便服三次，此方曾治多人均有效。

内裡损伤衄血

药物：大通草、小通草、大血藤、小血藤、大竹节、小竹节、芥、升喉见、搗皮血、茅针子、倒生根、葛根、木通、苏山虎、老君山、续旦、前胡、丰惠树根、泽兰。（煎服）

鼻衄吐血急救方

治法：将患者之血焙生成黑褐色研末，冲童便服和吹鼻，如加藕节煎汁冲药更好。

肺病

药物：白芨二两 百合二两 红粉一两

服法：白芨百合同煎浓水，渗入红粉使成胶剂，每次一茶匙。

因食霍乱

药物：松利夫 林柳树夫、青橘叶、

服法：研细冷水喝。

上 嘔 下 泄

治法：鸡爪虎王壳，焙干捣细，开水冲服。

吼 病

药物：花籽二、床草二、枇杷花一朵、蜂粉一

服法：将蜂粉炒黄煨水服，作四次吃

寒 气

药物：伸麻、黄风、薄皮血、大谢（木谢藤子）内消、八马消、

青山甲（根）煎水喝，每日三次。

肚 子 痛

治法：一真血（根）、山茅（根）每一段用口咬碎冲酒喝。

血 气 痛

药物：大血藤、小红藤、血毒为（煨水喝）有特效

妇 女 崩 血

治法：磨凡、斑丸荷、双皮、（煎服）

劳 病

药物：淡皮血、白根、真鳖子、三月坡、茅毛根、蛇色谷、小

木香、杉树夫

服法：煨水服。

肚子痛

治法：雄磺、大蒜、多少不一，碾细冲水喝。

治手段

治法：冲天炮三个，用桐油煎

关 节 炎

药物：小血藤、乱风树根、玉麻叶、甜酒汁，各量相等碾细。
用法：用荏苒针拔血，然后注于患处。

肾 也 痲 痺 作 痛

药物：川花椒一斗、威灵一斗、白芷一斗、荆芥穗一斗、艾叶一斗。
用法：上药用水洗，洗后用甘草汤只实、杜芩、黄芩、三茎共煮水调药苦胆水散。

流 鼻 血 不 止

治法：用小兒頭髮燒灰，吹入鼻中即止

骨 节 風

药物：白芷、白練、川芎、草烏、姜黃
用法：共碾细敷患处，热天加花柳藏于以药其。

跌 打 入 肉 內

治法：用鸟鸭毛数根焙成焦黄色研末和酒调服一钱，再用機器
止血如不愈者表作或膏药敷患处，每月换一次。

凍脚疮方

治法：甘草、白芷、银花、煎水服三日见效。

跌打顽伤

治法：用罐或小便值火上烧热，时于黄之，敷次即愈。

胸膈肝疼，厥食

治法：用白沙粉对酒冲服。

跌打青肿内伤

治法：用木耳四面麻油拌匀，好酒冲服

内跌伤

药物：生加皮二钱 生泽兰二钱 生牛夕二钱 黄支子二钱 川芎一钱 甲珠一钱 芍药二钱 白酒一钱

用法：将药研末和芍药白酒炒糯后敷患处

因跌手足

治法：用生姜葱白研末和灰芍药敷之，敷次即愈

打伤压伤

药物：当归四钱 羌活三钱 川芎三钱 红花二钱 桃仁二钱 丹皮三钱 苏本三钱

说明：头伤加藁本三钱，中部伤加白芥三钱，下部伤加牛夕三钱，内伤