

漢字實在易

卷三の

醫學實在易卷之三

聞長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

男

心典微菴
心蘭之亭

全校字

裏症

傷寒病陽明經大渴大熱法用白虎湯爲表中之裏症及其傳裏譫語胸腹滿不大便爲裏中之裏症宜三承氣湯擇用詳於傷寒門不贅劉河間先生用三一承氣湯代上三方

傷寒裏症詩

表中之裏是陽明熱渴汗多白虎湯行胃實晡潮膨譫語裏中之

裏枳實黃平三承氣湯隨其見症而用之

心痛心為君主之官受邪而痛手足寒至節名胸膈痛肺氣不謂胃脘痛

胃氣不和兩脇痛肝脾之病大腹痛脾屬小腹痛之病肝腎苦人每症皆分別九種曰

飲曰食曰風曰冷曰熱曰蟲曰悸曰注曰去來悸者心虛而動痛也

注者邪氣着而痛也去來者作止不常亦邪氣也但注陰而去來為

陽耳其實是小家伎倆不必泥也宜以上中下兩旁部位分之自心

胸至胃脘為上部宜宣其陽氣陽氣虛宜黃芪氣實宜枳實氣結宜

貝母瓜蒌皮氣逆宜半夏薤白氣滯宜檀香砂仁之類自胃脘至臍

為中部宜調其陰陽仲景理中丸以人參甘寒多液為陰分藥甘草味勝於氣亦陰分藥

補陰以白朮乾薑補陽爲萬古準繩卽如通脈四逆湯急於回陽若

有腹痛必加苦寒之芍藥以養陰黃連湯重於清火因有腹痛不離

辛熱之薑桂以開陽此理甚微非熟於內經者不可與語也自臍下

至陰器爲下部宜破其陰氣金匱名爲寒疝

今人以辜丸腫大爲疝金匱則以腹中痛劇爲

寒疝所主皆附子烏頭蜀椒大熱之性扶陽以破陰若前痛徹後後痛

徹前陰陽無分界限宜加赤石脂一二兩以堵截之而生薑當歸羊

肉湯藉羊肉之濁氣引入陰分以破陰尤其神妙也脇肋一帶爲側

部宜利其樞轉肝膽之氣其行在側小柴胡湯爲少陽之正藥當歸

四逆湯爲厥陰之正藥或再加鮮橘葉四十九片則得矣以上諸症

脈細而遲寒也以薑桂附子吳茱萸之類爲主脈大而數熱也以金

鈴子黃連沙參芍藥之類爲主痛而利者虛也以附子理中湯之類
爲主痛而閉者實也以小承氣湯之類爲主亦有寒實而痛者宜大
黃附子湯以溫通之若吐蟲則用附子理中湯去甘草加當歸川椒
黃連烏梅若食積則先以平胃散加麥芽山楂以消導之否則以承
氣湯下之若因怒氣而痛則以七氣湯加貝母撫芎香附以解之人
人共知不必贅也又仁齋直指治脾痛攻刺百藥罔效用和劑抽刀
散如神此方醫家秘不輕傳嘉慶十八年長州徐炳南梓尤氏金匱
翼載之心腹爲陰故列於裏症

經義舉痛論曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲滯而不行
客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛厥病篇曰眞

心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死按經文極繁此不過摘其要語

心腹諸痛詩

痛分四面定醫方下主於陰上屬陽介在陰陽中部位樞行在側
轉斯康

痰飲症乃水氣上泛得陽煎熬則稠而爲痰得陰凝聚則稀而爲飲
此症以脾腎爲主以水歸於腎而受制於脾也痰宜二陳湯隨寒熱
虛實加減怪病老痰宜滾痰丸飲宜桂苓甘朮湯真武湯二症愈後
以桂附八味丸收功

經義六元正紀大論曰少陰司天四之氣民病飲發又曰太陰所至爲

積飲痞隔又曰土鬱之發爲飲發注下至真要大論曰諸病水液澄澈清冷皆屬於寒按內經言飲而不言痰有之自仲景始

痰飲詩

痰病卻緣水泛成滾痰丸峻烈二陳

湯和

桂苓甘朮

湯

同真武

化一

太陽水府之氣一鎮少陰水藏之氣

五飲源流一派清

附錄

痰飲之病源皆水也經云三焦者決瀆之官水道出焉設三焦失職因之聚成痰飲變證多端古人論痰有四痰飲懸飲溢飲支飲詳於金匱要略余著有淺註宜細辨之然又有聚而不散者名留飲僻處脇下者名癖飲流移不定者名流飲沉伏於內者名伏飲又因酒而

成癖者名酒癖因寒所傷者名冷痰因熱所傷者名熱痰總由於三焦失職氣道否澀所致是以氣行卽水行氣滯卽水滯唯能宣通三焦之氣則爲治其本而清其源矣金匱曰當以溫藥和之此六字爲金鍼之度也所以然者人之氣血得溫則宣流及結而成病尤在涇新立七法授時醫方捷徑余閱江蘇顧西疇徐炳南之治案多本於此今姑錄之以見奇相賞疑與析神交在三千里外云

一曰攻逐

古云治痰先補脾脾復健之常而痰自化然停積旣甚譬如溝渠壅滯久則倒流逆上污濁臭穢無所不有若不決而去之而欲澄治已壅之水而使之清無是理也故須攻逐之劑

神仙墜痰丸 控涎丹 礞石滾痰丸 十棗湯

二曰消導

凡病痰飲未盛或雖盛而未至堅頑者不可攻之但宜消導而已消者損而盡之導者引而去之也

青礞石丸 竹瀝丸 半夏丸

三曰和

始因虛而生痰繼因痰而成實補之則痰益固攻之則正不支惟寓攻於補庶正復而痰不滋或寓補於攻斯痰去而正無損是在辨其虛實多寡而施之

六君子湯

按此湯宜入補方此條宜香砂六君子湯

四曰補

夫痰卽水也其本在腎痰卽液也其本在脾在腎者氣虛水泛在脾者土虛不化攻之則彌盛補之則潛消非明者不能知也

濟生腎氣丸

桂苓甘朮湯

六君子湯

余新
增之

五曰溫

凡痰飲停凝心隔上下或痞或嘔或利久而不去或雖去而復生者法當溫之蓋痰本於脾溫則能健之痰生於溼溫則能行之

沉香茯苓丸

本事神朮丸

六曰清

或因熱而生痰或因痰而生熱交結不解相助爲虐昔人故言痰因

火而逆上者治火爲先也其證咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重或欬吐稠粘面目赤熱

二陳湯加黃芩連翹山梔桔梗薄荷

七曰潤

肺虛陰涸枯燥曰至氣不化而成火津以結而成痰是不可以辛散不可以燥奪清之則氣自化潤之則痰自消

王節齋化痰丸

痢疾伏邪之爲病也夏月受非時之小寒或貪涼而多食瓜果胃性喜寒初不覺其病久則鬱而爲熱從小腸以傳大腸大腸喜熱又不覺其爲病至於秋後或因燥氣或感涼氣或因飲食失節引動伏邪

以致暴瀉旋而裏急後重膿血赤白小腹疼痛甚則爲噤口不食之
危症當知寒氣在胃熱氣在腸寒熱久伏而忽發之病用芍藥湯瀉
滌大腸之伏熱令邪氣一行正氣自能上顧脾胃如若未效卽用理
中湯以溫胃中之伏寒加大黃以泄大腸之伏熱一方而兩挽其要
紅者可加地榆白者可加木香紅白兼見者並加之倘久而不瘥可
用理中湯原方以補之或用真人養臟湯以瀉之或間用香連丸以
堅之此定法亦活法也如初起而發熱不休方書皆云死證其實非
經絡不和卽外感風寒所致唯審其發熱而仍惡寒者用當歸四逆
湯發熱胸脇滿而嘔吐者用小柴胡湯和其經絡而下利自鬆倉廩
湯更面面周到足補古人所未及痢爲腸胃之病故列於裏症

義經太陰陽明論曰食飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟

入五臟則填滿閉塞下爲殮泄久爲腸澼論疾診尺篇曰春傷於風夏生殮泄腸澼陰陽別論曰陰陽虛腸澼死氣厥論曰腎移熱於脾傳爲虛腸澼死按內經新謂腸澼卽今之下痢方書又名滯下是也本經惟評虛實論謂腸澼使血身熱則死寒則生大奇論謂腎脈小搏沉爲腸澼下血血溫身熱者死又云心肝澼其脈小沉瀉爲腸澼其發熱者死熱見七日者死論疾診尺篇又謂殮泄脈小手足寒者難已脈小手足溫者易已數句互異而不知熱與溫有別熱者壯熱溫者溫和也且痢與瀉二證同而不同

痢疾詩

痢分寒熱客相爭張氏

号心在近時人著張氏醫參

伏邪論最精腸熱腸喜熱日受熱

而伏為病根

胃寒

胃喜寒日受寒而伏為病根

標

熱本寒

異暑過

炎暑已退寒氣欲動秋至新

初至餘熱猶燃

序時更

理中湯

薑克貪涼病加味

前湯加大

黃芩鬱火清初患

尚輕休語此止從芍藥

湯

定權衡

痢疾救逆詩三首

發熱如焚痢可愁

當歸四逆

湯

探源流小柴

湯

治嘔兼寒熱倉廩

湯中再講求

噤口垂危亦可醫

大承

氣神妙

少人知芩連葛草

葛根黃連黃芩甘草湯

需用奪出生關

在片時真人養臟

湯

直腸需

水穀直下不停間用香連

止下趨仲景桃

花湯

春有腳個中誰識反三隅

陰虛下痢發熱膿血稠粘及休息痢用駐車丸

陰虛下痢詩

千金傳下駐車丸兩半歸連重一般三兩阿膠薑一兩陰虛久痢得靈丹

阿膠三兩黃連當歸各一兩半乾薑炒一兩醋煮阿膠爲丸每服四五十丸晝夜三服米飲下三車運精氣神分治三焦以調適陰陽此因陽熱過旺陰精受傷故用黃連以駐鹿車之驟乾薑以策牛車之疲阿膠以挽羊車之陷當歸以和精氣神之散亂也張石頑此註甚超全錄之

奇匠痢張隱菴曰病生於外感內傷人所共知而奇恆之病知之者

鮮矣奇恆者異於恆當也卽以奇恆之下利而言乃三陽並至三陰
莫當積並則爲驚病起疾風至如礮礪九竅皆塞陽氣旁溢噎乾喉
塞痛并於陰則上下無常薄爲腸澼其脈緩小遲澹血溫身熱死熱
見七日死蓋因陽氣偏劇陰氣受傷是以脈小沉澹此症急宜大承
氣湯瀉陽養陰緩則不救醫者不知奇恆之因見脈氣和緩而用平
易之劑此又何異於毒藥乎予故曰服平和之藥而愈者原不死之
病勿藥亦可服和平湯而後成不救者醫之罪也

奇恆痢疾詩

奇恆痢疾最堪

驚陽並於陰勢匪輕喉塞噎乾君切記

嘉慶戊午夏泉州郡王

孝廉患痢七日

忽於寅午之交聲微啞語半刻卽止酉刻死七月榕城葉廣文觀鳳之弟患同前症來延自言伊弟痢亦不重飲

食如常唯早晨噤乾微痛如見鬼狀半刻卽止時屆酉
刻余告以不必往診令其速回看看果於酉戌之交死大承急可
可回生

泄瀉之症內經所謂溼勝則濡泄是也宜以胃苓湯爲主如寒甚則
下利清穀加乾薑附子吳茱萸如熱甚則下利腸垢去桂枝加黃連
黃芩乾葛如食積加麥芽山查炒黑如虛甚加人參若五更後依時
作瀉名脾腎瀉宜四神丸去肉荳蔻加人參白朮罌粟殼乾薑茯苓
以棗湯疊丸臨臥以薑湯送下四五錢久瀉宜聖濟附子丸又金匱
翼乳豉丸治滑泄不止諸藥罔效方用肉荳蔻生爲末通明乳香以
酒浸過研成膏丸如梧桐子大每五十丸空心米飲送下

義經金匱真言曰長夏善病洞泄寒中陰陽應象大論曰清氣在下則