

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百五十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

次定司直人書

普濟方卷

厚

周王朱櫛撰

和氣

胃

害多為飲食內行之人
食人五臟下瘀血黑如
亦或黑無有多少此皆

是量毒精醫以色源藥成之此大非也

次定司直人書

普濟方

方

躑躅散 治蠱毒腹痛注下赤血

羊躑躅 乾薑 藜蘆熬 附子炮 雄黃研 巴豆去心

熬 野葛皮 肉桂 丹砂 蜈蚣炙各一兩

右搗為散水一兩盞不知加一粟米忌猪肉蘆筍生血物生葱狸肉

茜根湯 治中蠱下血如呻肝腹中疔痛急者

茜根 升麻 犀角鎊各一兩 地榆 桔梗剉炒五錢 白

藁荷根

二兩

藥皮

剉

黃芩

去黑心
各五錢

右粗篩每服五錢以水半盞煎七分去滓不拘時服
治中蠱下血日數十行者方

巴豆

十二枚

芫青

藜蘆

附子

礬石

各二分

右為末別治巴豆合篩和相得以錦裏藥如大豆許
內下部中日三瘥

槲皮散 治蠱毒下血爛肉片心腹疔痛如有物齧不
即治食人五臟乃死

槲皮

避陰白皮

桃根白皮

各四兩並細剉

蝟皮灰

亂頭髮

各一

兩

大麻子汁

五升

右先以水五盞煮槲皮桃根皮取濃汁二盞和麻子汁每服煖汁一盞調頭髮灰蝟皮灰二錢服令患人少食旦服須臾用水一盞用鷄翎引吐於中如牛涎諸蠱並出

治蠱下血欲死方

薔薇根

剉一升

牛膝

五味

連翹子

一升

蠟

一彈子大

右切以水四升煮三升分三服不計時

治蠱吐下血方

檳皮

廣五寸
長七尺

蘆荻根

五寸如足指大
一方用薔薇根

右呖咀以水二升煮取一升頓服即下蠱一方以水

酒共煎服亦得

治中蠱毒下血肝

蓖麻

一粒
去皮朴硝一錢

右研細末作一服新汲水調下連作二三服效

桔梗散 治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不止臟腑悉

損者用

桔梗

去蘆頭

伏龍肝

各等分

右搗羅為散每服以溫酒下二錢每日三服不能下藥幹開口灌之心中自定服七日止食諸臃腫補之物一方單用桔梗搗屑酒服一方搗汁服並瘥

地榆散 治蠱毒下血或腹痛或不痛百治不效日夜

加煩渴

臭椿根

東引根白皮
蜜炙焙乾

地榆

各五錢

右為細末熱米飲調下一錢

牛膝酒

出千金方

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不瘥

用牛膝一兩搥散切以淳清酒一升漬一宿平旦空

腹服之再服便愈

鼓皮散

出直指方

治蠱毒下血如鷄肝晝夜不絕臟腑敗

壞待死而已者

用鼓皮五寸薔薇五寸酒水煎服

蝟皮散

出聖惠方

治蝟毒下血

用蝟一枚炒為灰細研以熟水調下二錢日三服

苦瓠湯

出聖惠方

治蝟毒吐血或下血如爛肝

用苦瓠一枚切以水二大盞煎去滓以取一盞空腹溫服二服吐下蝟即愈范注方云苦瓠毒當臨時量之肘後方云用苦酒一升煮令溫服之神驗一名苦

瓠蘆

治中蝟毒瀉血日夜無度腹痛不可忍者

出肘後方

取皂角三箇炙去皮子打碎醃醋四升入瓷器中日
中午時漬又以新白布三尺蓋上布上刀裂一橫口
正對病人眠牀下安之明日午時藥用布濾去分三
服如人行十里再服若不肯服可針兩手大指端甲
亦不勞深勿取針當自服或吐或痢去根先取白蘘
荷葉四五枚放病人床席下勿令病人知若中毒則
不眠其上矣一方治蠱毒以漬酒一宿去滓頓服並
瘥

治蠱毒暴下血

以筋子根酒飲磨服

療卒中蠱下血如鷄肝者或晝夜出血石餘四臟皆壞
惟心未毀或鼻破待死者

以桔梗搗屑酒服方寸日三服不能下藥以物挖口
開灌之心中當須臾自定服七日止當猪肝臠以補
之神良

療中蠱毒下血如鷄肝或晝夜不絕臟腑敗壞待死知

蠱姓名方

取敗鼓皮燒灰作末酒服方寸下須臾自當吐蠱主
姓名令蠱主呼取蠱姓名即瘥聖惠方亦治小兒蠱
毒一方作飲服

治蠱毒血痢

方見中蠱
下血類

治蠱毒下血如鷄肝或出血石餘四臟虛惟心未毀或
鼻破待死

取馬蘭根末水服七寸下隨吐出極神效苗似葛蔓

緣子生子如橘子

治蠱毒溪惡刺虎狼蠱虺等毒

乾犀根

味辛平生嬰娶洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛

千金藤

味苦平生北地

主商土者根大如脂黑色亦如細辛

右二味不拘多少煮汁服之若研服又良

蠱毒吐血

附論

夫病源云蠱是合聚虫之類以器皿盛之任其相噉食
僅一存者名為蠱能害人食人腑臟其狀心切痛如被

嚙或鞭面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也
不治之食臟腑盡則死矣

方

太上五蠱丸

一名雄黃丸
出千金方

治百蠱吐血傷中心腹結

氣堅塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上
氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩痛寒戰夢
與鬼交狐狸作魅卒得心痛又胸脇痛如刀刺經年
累歲着牀不起悉主治之

雄黃 椒目 巴豆 莽草 芫花 真珠

外臺用木

香 鬼臼

礬石

藜蘆

各四分

附子

五分

獺肝

一分

蜈蚣

二枚 斑猫 三十粒

右藥為末煉蜜和更搗二千杵丸如小豆先食飲服
一丸密封勿泄藥氣十丸為劑如不中病後日增一
丸以下痢為度當下蠱種種狀貌不可具述下後每
日將息服一劑三十年百病盡除忌食五辛一方無
真珠巴豆有木香空心粥飲下亦以痢為度

治中蠱吐血方

出肘後方

以及下血

羚羊皮

方三寸得敗鼓皮亦佳

苦參

三兩

藁荷根

三兩

黃連

二兩

當

歸

二兩

右呖咀以水七升煎取二升分三服忌猪肉冷水一

方加犀角升麻各三兩無藁荷根用茜根四兩代之

雄黃散

出聖惠方

治中蠱吐血

雄黃

研一分

伏龍肝

研五錢

獺肝

如棗大炙

斑猫

去翅足糯米炒十四

粒