

全氏痘疹秘錄

亥集

邦字主抄

亥集

全氏家藏痘疹秘錄

都字子抄

全氏家藏痘疹秘錄卷十二亥集

麻疹門

麻疹金鏡賦

原疹論

認出疹法

麻疹諸名

麻疹之色

養血化癰湯

大青湯

疹科藥性賦

麻疹論治

清陽飲

金壇治法

馮白消毒飲

加味金沸草散

宣化丹

全氏發疹清火湯

過期不出

麻黃湯

檉柳散

胡荽酒

河澗涼膈散

檉前草根湯

疹出不透

三黃石膏湯

喘嗽

竹葉石膏湯

牛黃奪命散

家傳馮白散

出汗鼻衄

茅花湯

咽喉腫痛

十全散

玉鎖匙

驚悸

瀉青丸

牛黃清心丸

吐利滯下

益元散

香連丸

發渴

發表不早致生後患

收靨遲速

全氏瀉白解毒湯

疹後身熱不退

柴胡清表湯

柴胡麥冬散

柴胡四物湯

逍遙散

牛黃奪命散

蘆薈肥兒丸

疹後作搐

加味四物湯

導赤散

安神丸

抱龍丸

疹後喘急

清肺飲

疹後咳嗽

清肺飲

白附丸

疹後失音

清金降火湯

兒茶散

疹後牙疳

蚊蛤散

雄黃散

犀角地黃湯

黃龍散

龍礪散

化愚丸

疹後痢疾

黃柏湯

槐皮湯

香連丸

全氏石蓮子湯

田螺貼臍法

加味苓芍湯

黃芩湯

益元散

疹後煩燥譫語

益元散

殊砂四苓散

疹後生瘡

疎風散

加味銀花散

連壳生地飲

四物湯

疹後瘡疾

蟹甲湯

全氏加減小柴胡湯

疹後浮腫

加味五苓散

五皮湯

疹後失血

加味四物湯

八正散

疹後風

家傳牛黃保嬰丹

白虎丸

疹後中惡

蘇合香丸

沉香降氣湯

赤子出疹

癰不同疹

元參湯

三黃丸

疹後補養

孕婦出疹

加味四物湯

禁忌

麻疹吉凶

麻疹金鏡賦

翁仲仁曰疹雖胎毒多待時行氣候暄熱傳染而成其發也與痘相類其變也較痘非輕先起於陽後歸於陰毒感於脾熱留於心臟腑之傷脾則尤甚始終之變症不及腎初則發熱有類傷寒眼胞困倦而難開鼻流清涕而不乾咳嗽少食煩渴難安斜目視之隱隱皮膚之間下以手摸之磊磊肌肉之間其形若疥其色似丹出見三日漸沒為安隨出隨沒喘急須防根窠若腫兮疹而兼癰皮膚如赤兮疹猶夾癰似錦之明兮不藥而愈如煤之黑兮百無一痊瘡疹既出調理甚難坐臥欲煖飲食宜淡咳嗽涎沫兮不禁酸醎忽生喘急兮肺受風寒心脾火灼

口舌生瘡肺胃蘊熱津液常乾有此變症治法異焉微汗毒解  
熱減少山二便清調氣行無壅腠理拂鬱兮即當發散腸胃秘  
結兮急於疎通鼻衄者不必憂疑邪從衄解自利者不必遽止  
毒以利鬆痲後多痢兮熱毒移於大腸咳嗽喉痛兮疫氣滯於  
心胸口渴心煩法當生津以養血飲食減少治宜調胃以和中  
餘症雖多臨期變通此是痲疹之大畧玄奧悟之無窮

### 原疹論

乘六曰痘與疹同一胎毒也皆因男女交媾之始其火蘊於兌  
之命門而結是毒矣若值溫氣大行則邪陽旺火之氣動也觸  
於臟者則出痘觸於腑者則出疹是胎毒所結雖一而邪氣之

感觸有不同也。蓋痘症有陰有陽。疹則純陽而無陰。其症在表。變化甚速。故為腑症。然毒雖屬於腑。而其症總不離乎脾肺也。蓋脾主肌肉。肺主皮毛。風邪中之。令人肌肉之間發出如麻。頂尖不肥。由稀漸密。有顆粒而無根暈。微起發而不生漿。出現三日收靨。三日斯謂得中。而餘症不生矣。

### 認出疹法

管氏曰：發熱之初，與傷寒相似。但出子疹子，則為面浮、腮赤、咳嗽、噴嚏、鼻流清涕、眼胞浮腫、其淚汪汪，或惡心、乾嘔、呵欠、喜睡，或作嘔吐，或手搥鼻面，眉目為異耳。見此症候，即是出疹，便宜謹避風寒，戒暈腥厚味，至於用藥，以發表為主，務使皮膚通暢。

膝理開豁而疹毒易出也

乘六曰凡兒身發大熱咳嗽噴嚏眼淚汪汪鼻流清涕者即是出疹宜先用胡荽酒塗於身上時時看子若狀如蚊嘴所傷者便是雖用發表之藥發之務使出透而後已

胡荽酒

芫荽

西切

碎以好酒二鐘先煎數沸入芫荽再煎少

時用物合定不令洩氣候溫洗之從肩至足使香氣襲運自然出快切忌勿洗頭面

### 麻疹諸名

準繩云麻疹浮小而有紅粒不結膿胞者也北人謂之糖瘡南人謂之熬瘡吳人謂之沙痧越人謂之厝古人謂之麻聞人氏

謂之膚疹是也。小兒有出一二次者有出輕而日數少者名曰奶奶疹。子有出於痘後者名曰正疹。子但麻發於腑腑屬陽其病淺故易出而易收。用藥總以清涼為主。

乘六曰麻疹者古之統名也。然究其形狀則種類不一。至於治法則大抵相同。有癰疹者形如粟米遍體發出。滿月內兒身見者名曰爛衣瘡。百日內小兒而見者名曰百歲瘡。未出痘瘡之先而見者名曰癰疹。子蓋因生後傷風而得此症最輕不須服藥。痘後出者名曰蓋花疹。始如粟米漸成雲片乃痘之餘毒未盡也。又有癰疹者乃心火灼於肺金並兼外感風濕而成之也。發必多痒色則紅赤隱隱在皮膚之下者是也。

麻疹之色

摘錦曰疹發於心色貴通紅如色淡白心血不足治以養血化  
癍湯主之如色太紅而紫者血熱也或出太甚而昏慘慘不明  
者並宜大青湯主之如忽而見形忽而消滅甚至黑癍發見而  
心中悶亂煩燥不寧者死症也

翁曰疹色宜紅活如淡白而活者不妨若顏色深紅而兼滯者  
毒盛也色如煤黑者逆症也

按此時如能流出鼻血反為吉兆也

却子識

養血化癍湯

當歸

生地

蟬衣

紅花

赤芍

甘草

大青湯

大青

元參

石膏

知母

生地

木通

地骨皮

枝子

黃連

黃芩

連翹

竹葉引

疹科藥性賦

翁曰麻疹藥性又當精詳出之太遲發表為良出之太甚清解  
堪膏勿施溫補以助其邪若用寒涼休犯其胃檉柳紫蘇散  
理之留邪荊芥葛根解榮衛之蘊熱甘草瀉心生地涼血黃連  
入心而清火黃芩入肺而定喘元參石羔治邪火之浮遊枝子  
連壳開惡毒之鬱熱瓜蒌潤肺止渴須合麥冬知母生津降火  
必因黃柏溺若澁兮瞿通咽若痛兮甘桔心神驚妄兮鎮以硃  
砂臟腑秘結兮利以大黃牙齒生疳蚊蛤配乎中白命咽喉腫  
痛射干助以牛蒡五味杏仁治喘氣之哈哈薄荷竹葉解膚熱  
之洋洋火燒人尿蜜炙麻黃發疹毒之出現令邪氣之舒張只

寔山查和中行滯兜鈴骨皮清肺回瘡使多膿血兮白頭翁黃  
芩最妙咳多涎沫兮貝母麥冬無雙口爛唇裂芩連可用皮焦  
髮枯知柏敢當疹後餘熱柴胡合乎四物口舌生瘡甘桔對乎  
三黃此乃疹科之藥性繼痘科而再詳

### 麻疹論治

繆仲淳曰麻疹者手太陰肺足陽明胃二經之火蒸發而為病  
也。小兒居多大人亦時有之。殆如時氣瘟疫之類歟。或云麻疹  
可以隨症而施治。然當反求其本。本者何。手太陰肺足陽明胃  
二經之邪熱也。解其邪熱則諸症自退矣。其症類多咳嗽噴嚏  
眼中多淚口中多痰泄瀉煩悶而渴。尤甚則燥亂神昏咽痛唇

其  
焦是候也亦多有嘔吐者勿治嘔吐但透疹毒則嘔吐自止矣  
况嘔吐中便有發散之義治法宜用清涼發散為主藥清熱透  
肌為佐使也有辛寒苦寒甘寒等法以散發之最宜辛散惟忌  
酸收誤施溫補禍不旋踵

辛散諸藥如

芥穗

葛根

牛子

檉柳

麻黃

另煎去  
沫夏月忌用

石羔

清熱透肌如

竹葉

元參

花粉

青黛

薄荷

蟬退

甘寒諸藥如

麥冬

蘆漿

甘草

苦寒諸藥如

黃柏

貝母

黃連

知母

黃芩

但有病

之輕重製劑大小中病則已勿太過焉

患疹者須速用前劑以解散庶可無大患也假令病重藥輕或

誤用溫補以致邪熱內攻煩燥悶亂者不可救也惡破氣溫補  
酸收燥熱下辛溫臍滯等味

破氣各藥如 青皮 枳殼 枳實 厚朴 枳櫟

溫補各藥如 人參 黃芪 蒼朮 白朮 雖屬虛症勿用

恐動陽氣上升變生他患

酸收各藥如 五味 烏梅 白芍 石榴皮 醋

燥熱各藥如 肉桂 溫寒勿用 丁香 木香 半夏 雖有痰勿用胆星半夏  
燥悍之劑升陽諸品不可用

蒜 吳茱萸 胡椒 大料 姜

下藥如 巴豆 二丑 砒硝 元明粉 大黃 保胃護氣

此藥所當忌也

辛溫各藥如 白芷 當歸 細辛 川芎 紫蘇

乘六曰紫蘇下氣定喘疹科要藥然性雖辛溫其涼藥同用亦不妨事

賸滯各味如 猪 羊 牛 犬 雞 鶩 羊肉及油汁麤

魚 蝦 果 鋪 燕 心 之 類 是 也

乘六右載忌用之藥眉目最清可作疹家指南針其用心精細處他書不及也 又曰發疹之藥檉柳為第一若只用此一味煎服最穩最安忌用升提者恐提起肺氣而作喘也又恐將火邪提上結於咽喉而作腫痛也忌用之藥如升麻川芎紫胡防風之類若發喘者尤忌