

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷二十三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷二十三

產後作見鬼神

產後如見鬼神或言語譫妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

明 孫一奎 撰

薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加

炮薑若心血虛損用栝子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散益甚痰涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時見怪

沒藥 琥珀 桂心

各一錢

白芍

炒

當歸

各七分

細辛

五分

麝香

少許

右為末每服半錢薑湯酒各少許調服

栢子仁散

治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

栢子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

當歸

炒

生地

甘草

炙

各等分用白羊心一個水三盞煮清汁七分入藥

五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

一產婦患前症二度服琥珀地黄丸局方妙香散隨效再患服之其症益甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黄丸 治產婦惡露未盡胸腹作痛或小便不

利

琥珀

延胡索

糯米同炒去米

川歸

各一兩

蒲黃

四兩

大

生地

研取汁留滓

生薑

各二斤研取汁留滓生薑汁石銀器內炒地黃滓以地黃汁炒

生薑滓各乾為度

右為末蜜丸如彈子大每服一九當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂

琥珀

沒藥

當歸

等分

右為末每服二錢空心日午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末每以酒調下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寧

薛氏曰當大補氣血為主而佐以後方為善蓋風乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治其風則速其危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺作肝火熾盛用十全大補加鈎藤山梔而安再用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧

石菖蒲 遠志

去心蘆用甘草湯煮

人參 茯神 辰砂

各三

錢

川芎

山藥

鉄粉

麥冬

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

各一兩

為末薑汁糊為丸萊豆大別以硃砂為衣每服三

十九薑湯送下

產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出
目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加附子
鈎藤鈎若肝經血虛用逍遙散加鈎藤經云脾之榮

在唇心之液為汗乃心脾二臟虛極急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹疼以為陽氣虛寒用六君子薑附各加至五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍前腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方效

濟危上丹

乳香 五靈脂 硫黃 玄精石 阿膠 卷栢

桑寄生 陳皮 各等分

將上四味入石器微火炒再研入餘末用生地黃汁九梧子大每服二十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯

治產後腹痛拘急痛連腰背自汗少食

當歸

桂心

各三兩

白芍

六兩

炙甘草

二兩

每服五錢薑棗水煎入飴糖一匙以效為止

獨參湯

一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴

自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷益血生於氣補氣者

乃陽生而陰長也

產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頓虛腠理不密而津液妄洩也
若遇風則變痙縱虛乏短氣則身體消瘦唇口乾燥
久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附芪
附湯恐汗多亡陽發痙尤當用之王好古曰頭汗出
至頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱

薰蒸而出竊謂前症當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治者審之

一產婦略聞音響其汗如水而昏瞶諸藥到口即嘔作脾氣虛憊用參附末為細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寐神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯 產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

當歸 黃芪炒 麻黃根 牡蠣煨 炙甘草

人參

各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

炙甘草一兩 附子炮五錢 桂心 白芍炒各一兩五錢

每服三五錢加薑棗水煎服以效為止

止汗散

牡蠣

煅五錢

小麥麩

炒八兩

右為細末每服三五錢猪油汁調下

人參湯 產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症

人參 當歸

等分為末猪腰子一枚切片水二鍾糯米半合葱

白二根煮取汁八分入藥三錢煎服

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止如不應加人參

白朮心血不足加炒酸棗仁

當歸

熟地

黃芪

炒各二錢

生地

黃柏

炒黑

黃芩

炒黑

黃連

炒黑各一錢

水煎服

參附湯

治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷大便自利

或臍腹疼痛嘔逆不食或汗多發瘧等症

人參

一兩

大附子

炮五錢

作一服加薑棗水煎徐徐飲下

當歸補血湯

治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜