

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十八



南京中医药大学图书馆版权所有

證治準繩

和

胃

明 王肯堂 撰

便不利者津液耗於內

於外也發黃與痞及夫

熱病小便不利者熱鬱所致風濕相搏與夫陽明風中其小便不利寒邪所乘其小便難者亦多由汗下而然宜詳辨之

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯去麻黃

如茯苓

方見欬

太陽病大發汗後胃乾煩躁不得眠欲

飲水小便不利脈浮者五苓散不浮者猪苓湯 本以

心下痞與瀉心湯痞不解渴而口躁煩小便不利

者五苓散 服桂枝湯或汗或下之仍頭項強痛翕翕

發熱無汗心滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白

朮湯 太陽病飲水多必心下悸小便少者茯苓甘草

湯方見 若兼身黃而小腹鞭脈沈結者茵陳湯方見

若表未解反下之不結胸但頭汗出小便不利者必

發黃亦茵陳湯梔子檨皮湯

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病小便不利若中寒不能食手足澀然汗出大

便初鞭後溏者此欲作固瘕 若能食大便自調其人

骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂澼然汗出而解者此

水不勝穀氣與汗共併脈緊則愈 或無汗心中懊懣

或被火額上微汗出或頭汗出身無汗齊頸而還渴引

水漿皆欲發黃之候 若脈浮發熱渴欲飲水小便不

利者猪苓湯主之

此浮字誤也活人云脈浮者五苓散脈沈者猪苓湯則知此證若脈字下

脫一不字也按太陽篇內五苓散乃猪苓澤瀉茯苓三味中加桂白朮也陽明篇內猪苓湯乃猪苓澤瀉茯苓三味中加阿膠滑石也桂與白朮味甘辛為陽主外阿膠滑石味甘寒為陰主內南陽之言亦可謂不失仲景

之旨矣第南陽欲區別二藥分曉不覺筆下以沈對浮
遂使後人致疑三陽證中不當言脈沈更不復致疑經
文之有闕也更詳太陽證固當脈浮而陽明為表之裏
故其脈不曰浮而曰長蓋長者不浮不沈之中脈也成
氏直以脈浮釋之而朱氏却以脈沈言之胥失之矣若
曰脈浮者五苓散不浮者猪苓湯則得仲景之意矣又
詳少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓
湯一條雖不言脈沈然少陰之脈必沈也豈活人以少
陰對太陽一證而言與以此

推之成氏隨文誤釋明矣

病人小便不利大便乍

難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣
湯得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至
四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之若不大便

六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必溏須小便利尿定鞭乃可用大承氣攻之

少陽傷寒五六日中風往來寒熱胸脇痛不欲食心煩喜嘔或心下悸小便不利者小柴胡湯 傷寒五六日已汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗心煩往來寒熱為未解柴胡桂薑湯 傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯

少陰小便不利而大便自利腹痛為少陰病 兼四肢
沈重有水氣者真武湯 兼便膿血者桃花湯 兼四
逆者四逆散加茯苓

厥陰傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈
前部為小便小便不利脈浮者五苓散不浮者豬苓湯

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫

者屬風濕宜甘草附子湯

方見身痛

若脈沈緩大便反快

者屬濕脾活人用五苓散

方見渴

附

活陰證小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便

冷滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之

方論見陰毒

集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉

吳凡傷寒小便不通刺任脈二穴在臍下一寸用長針入八分又次支溝二穴在手腕後三寸兩骨之間陷中針入二分凡傷寒小便不利當分六經治之太陰少陰詳見本條太陰腹滿自利小便不利無熱脈沉者理中

湯合五苓散更加厚朴木香分利其小便而大便自止
厥陰寒閉厥冷脈伏囊縮入腹小便不利宜四逆湯通
草茯苓或灸氣海石門穴或以葱熨法治之若陰虛火
動小便赤澀不利者加木通生地知母黃蘗凡內熱盛
大便不通小便赤澀不利者八正散治之凡不渴小便
不利者熱在血分也宜知母黃蘗生地之類夫膀胱為
津液之府氣化而能出也若汗多者津液外泄小便因
少不可利之恐重亡津液待汗止小便自行又小便自

利不可妄利之恐引熱入膀胱則變蓄血又為害也

小便難汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風

小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯

方論見自汗

若太陽

證中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽

盛陰虛欲衄小便難也

方論見頭汗

若少陰以火劫汗者

則欬而下利譫語小便難

論見脇痛

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿

身黃項強小便難也

見脇痛

若陽明胃實發熱惡寒脈

浮緊下之者則腹滿小便難也

論見胃實

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若

下後不食項强者忌柴胡

論見脇痛

趙傷寒小便難仲景論有發汗漏不止桂枝加附子湯者有陽明中風或脈弦浮大而潮熱噦者或脈浮而緊誤下而成腹滿者又有陽明脈浮遲飽則微煩頭眩者活人問中當以傳經邪熱與漏風亡陽分作兩條其桂枝加附子湯證乃亡陽經虛所致豈得均

謂之陰虛陽湊為有熱耶要當以小柴胡證及誤下
證穀疸證次於陽湊傳邪之下却別出一條云外有
汗多亡陽津液不足亦有小便難者還以桂枝加附
子湯證屬之

小便自利

小便數

成小便自利有在表者有在裏者有熱而利者有寒而利者
六經俱有之證難以槩治宜考經條分之可也小便數者三

陽有在表者有在裏者三陰並無小便數之證宜詳察之

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂以

熱在下焦小腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當湯 太

陽病身黃脈沈結小腹鞭小便自利其人如狂血證也抵當

湯 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當

下之不可餘藥宜抵當丸 傷寒十三日不解過經譫語小

便利而大便亦下利脈反和調胃承氣證

詳譫語

太陽中風

火劫汗後發黃欲衄小便難頭汗出腹滿微喘口乾咽爛或

不大便久則譫語甚者至噦捻衣摸牀小便利者可治

詳譫語

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏

急小便不利甘草茯苓湯 傷寒八九日風濕相搏身體疼

煩不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯若其人

小便自利去桂枝加白朮湯 傷寒發熱惡寒大渴欲飲水

其腹必滿自汗小便利為欲解此肝乘肺名曰橫刺期門

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必

苦頭痛

詳頭痛

得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁

心下鞭以小承氣湯微和之不大便六七日小便少者
雖不能食但初鞭後溏未可攻小便利大承氣湯傷
寒脈浮而緩手足自溫係在太陰當發身黃若小便自
利不能發黃至七八日大便鞭為陽明病也大承氣湯
陽明病自汗更發汗小便自利為津液內竭屎雖鞭
不可攻之宜蜜煎導而通之豬膽汁或土瓜根皆可為
導

太陰傷寒脈浮而緩手足自溫係在太陰當發黃小便

自利不發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止
按以上數條皆以小便自利為病蓋以驗病之下與
不當下也若小便不利而少腹鞭者屎也當滲泄之
若小便自利而少腹鞭者非血則糞也當通利之且
病之發黃與不發黃及病之死與不死皆可於此而
驗之焉

少陰病二三日至四五日腹滿小便不利四肢沉重疼
痛自下利者為有水氣或小便利真武湯

詳下利

既吐