

# 欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

大定回春全書

醫聖元戎

大定回春全書  
醫聖元戎

大定回春全書  
醫聖元戎

元 王好古 撰

加半夏湯

升麻湯  
錢氏用治小兒痲疹傷寒

甘草

鬚葱白湯次又不已

者葛根升麻湯恐太陽流入陽明斷其路故以此湯  
主之地黃湯內加犀角以升麻代之是知陽明藥非  
太陽藥也人或初病太陽證便與葛根升麻湯是遺  
太陽不惟遺經及引太陽邪氣入於陽明不能解也  
其變可勝言哉

活人蔥白例

此例當在前麻黃葛  
根蔥豉湯四味條下

連鬚蔥白湯

治傷寒發汗已  
未頭疼欲破者

蔥白

連鬚  
半斤

生薑

二兩

右以水二升煮取一升去滓分二三服此藥不差者服葛根蔥白湯

葛根蔥白湯

葛根

蔥白

生薑

芍藥

川芎

知母

右剉水三升煎一升去滓分二服

七味蔥白湯

許仁云傷寒或因氣勞或因食勞其病如強力持虛

行步而發者力勞也

蔥白

連鬚

葛根

鹽豉

生薑

麥門冬

乾地黄

潑水

一斗揚之無數

右七味潑水煎三分去二去滓分作二服覆首出汗

王朝奉方 活人蔥白例並出金匱祖方

蔥薑湯

治妊娠傷寒

蔥白

十莖

生薑

三片切

右二味以水三升煮取一升分作三服取汗為度

又蔥豉湯

蔥白

二兩半  
豉 半斤

右以水三升煮取一升分作二服取汗為度

又蔥白一物湯

蔥白

二把

又葛根一物飲子

右以水一升煮熟服取汗食盡亦主安胎若胎死須

臾即出

葛根汁每服一小盞如人行五里地道一服若無生

葛乾葛咬咀煮濃汁服至于升麻梔子前胡知母黃

芩杏仁六味共七物內加蔥白三兩莖煎去滓服

普救散

治小兒傷寒

乾葛

炒半斤

甘草

炒赤四兩

蒼朮

一升泔浸煌

右麤末每服二大錢水一鍾煎至七分去滓熱服

百解散

升麻湯

六兩

蒼朮

四兩

菖蒲

一兩

右同為末水煎服

又百解散

治太陽陽明合病

麻黃

荊芥

石膏

川芎

蒼朮

甘草

又百解散

治證同前

麻黃

芎藭

蒼朮

甘草

不卧散

蒼朮

半兩

甘草

一兩

芎藭

三錢

右以水同生薑棗煎服

蕩邪散

藁本

蒼朮

甘草

各等分

右以水一盞煎服之

和解散

蒼朮

半斤製

藁本

桔梗

微炒

厚朴

製各二兩

陳皮

去白

甘草

煮各四兩

右為麤末每服三錢水一大盞生薑三片棗一枚去

滓服

易簡王氏生料五積散

治感冒風寒肩背拘急發熱頭疼或為寒所搏一身  
凜然急用此藥如服養胃湯法以被覆汗出即愈

蒼朮

桔梗

枳殼

麻黃

陳皮

錢各六

白芷

川芎

當歸

甘草

官桂

半夏

白芍

茯苓

錢各二

乾薑

厚朴

錢各四

右吹咀每服四錢水一盞半生薑三片葱白一根煎至六分去滓食前熱服尋常被風寒濕氣交互為病頸項強直或半身偏疼或麻痺但服此藥加麝香末少許煎服自能平治婦人經候不調心腹撮痛或閉塞不通加醋一合煎服產後催生及胎死腹中亦如前法能飲者更加酒半盞產後發熱及往來寒熱不問感冒風寒及惡露為患均可治療腹中血塊尤宜熱醋調服傷寒手足逆冷面青嘔吐宜加附

子 或疰癰癰癰膀胱小腸氣痛加炒茱萸半錢鹽  
少許 脚氣加茱萸木瓜大便秘者加大黃 脚氣  
下注焮然赤腫者以大便流利為度 脚氣初發增  
寒壯熱者亦宜此藥利之 又一方治渾身瘡疥膿

血水淋瀝經時不愈加升麻大黃名升麻和氣飲

蓋瘡癰為患多因內有所蘊發在皮膚若只傳以藥  
何由得愈不若以此藥滌之若寒濕之氣注下作瘡  
瘡愈則毒氣入腹為害不淺此藥尤妙若有熱證則

以敗毒飲亦加大黃煎服

海藏五積論

麻黃桂芍藥甘草即麻黃桂枝各半湯也蒼朮甘草陳  
皮厚朴即平胃 枳殼桔梗陳皮茯苓半夏即枳梗  
半夏等湯也 又川芎當歸湯治血 又加乾薑為  
厚朴散 右此數藥相合為解表溫中泄熱之劑去  
疾消痞調經之方雖為內寒外感表裏之分所制實  
非仲景表裏麻黃桂枝薑附之的方也至於冷積嘔

吐泄痢癥瘕時疾疫氣項背拘急加蔥白豆豉厥逆  
加吳茱萸寒熱咳逆加棗婦人難產加醋始知用之  
非一途也惟知活法者擇之

### 仲景五苓散

治太陽病後汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得  
飲水者少少與之令胃氣和則愈若脉浮小便不利  
微熱消渴者與五苓生之

猪苓

十八銖  
去皮

澤瀉

一兩  
銖

茯苓

十八銖

桂

半兩  
去浮皮

白朮

十八銖

右五味為末以白米飲調服方寸七日三服多飲暖  
水汗出即愈 胃弱小便少亦宜少減二苓澤瀉加  
白木桂便以生薑之類 若水停心下煎生薑三錢  
或半夏入煎濃調服五苓散秤三錢或半兩亦可  
太陽標病傳入標之本發渴溺不利以此散導之邪  
自膀胱而出也若未渴妄用五苓散反引邪氣入裏  
而不能解也故易老云即太陽經之一藥也若傷寒

太陽脉緊而渴者不宜用此 陽明證後有仲景五  
苓散一條甘露飲枳朮湯梅師方一以其消痞去水  
故入陽明例 飲酒而泄瀉者脾胃受濕也何以知  
之仲景厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯  
却治其厥不爾水漬入胃必作利也故飲而瀉者五  
苓散甘露飲子神效飲酒若過度必作利者裏急後  
重者溫熱之毒浸漬腸胃也當作別治 甘露飲即  
五苓散去猪苓關

