

820

中医驗方集

(1)

5

新文豐

中華人民共和國鐵道部衛生局編

前 言

我國医学有数千年的历史，有豐富的内容和宝贵的临床经验，党中央对卫生部党组报告批示中说：“中国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的经验总结。它包含着中国大共同疾病作斗争的丰富经验和理论知识，它是一个偉大的宝库必須继续努力發掘，並加以提高，我們必須組織力量認真地学习、研究、加以整理。”以豐富現代医学科学，保障人民健康和国家社会主义建設，促進工農業生产更大更好更全面的躍進。

幾年來，我市卫生事業在党和政府的正确領導下，逐步深入的貫徹了党的中医政策，取得了一定成績，組織全市所有医药卫生人員学习了党的中医政策，对岐視，排斥中医的錯誤思想开展了批判，中医已經得到了工作上的适当安排，百分之九十以上中医参加了公立或联合医療机构，鼓历中医帶徒弟，西医学习中医运动已开展了起來。在党的教育下，广大中医在思想觉悟上有很大提高，不仅積極参加了医療保健工作，而且重視了对祖國医学遺產的研究和整理，許多中医紛紛献出了多种秘方和驗方，这对繼承与發揚祖國医学遺產有重大帮助。对服务广大羣众起着巨大作用。

为研究整理祖國医学遺產，广泛地交流中医治療經驗，我們收集整理了部分中医秘方驗方和临床驗例等資料，現經初步审編成冊，借以交流，共同提高，並便医療部門和医务卫生人員臨床参考。但由於我們在編排选輯上沒有經驗，錯誤之处，在所难免，尚望每个医药卫生工作者随时給予批評、指正，以便改進我們今後工作。

开封市卫生局 45454月

目 录

前 内 科

瘧疾.....	(1)
痢疾.....	(1)
流行性感冒.....	(2)
大叶性肺炎.....	(3)
风湿症.....	(3)
消化性潰瘍.....	(5)
胃痛.....	(7)
腹痛.....	(7)
蟯虫症.....	(8)
蛔虫症.....	(8)
腎炎.....	(9)
腹水併全身性水肿.....	(11)
喘息.....	(11)
肺結核咯血.....	(12)
滲出性胸膜炎.....	(13)
五更泻.....	(14)
肝膿瘍.....	(14)
紫斑病.....	(15)
口眼喎斜.....	(16)

外 科

骨折.....	(17)
---------	------

外伤出血.....	(18)
跌打损伤.....	(18)
普通外伤.....	(18)
扭伤、腰痛.....	(19)
疤痕增生.....	(19)
燙伤.....	(20)
乳腺炎.....	(20)
癰肿.....	(22)
癰.....	(22)
外痔.....	(23)
腸梗阻.....	(23)
血栓閉塞性脉管炎.....	(24)
前列腺肥大症.....	(24)
骨結核.....	(25)

妇 产 科

功能性子宫出血.....	(27)
子宫脫出.....	(27)
子宮頸糜烂.....	(27)
习惯性流产.....	(28)
产后腹泻.....	(29)
血崩.....	(29)
月經不止.....	(29)
妊娠高血压.....	(30)
先兆性子癇.....	(30)
回乳.....	(30)
脫臍.....	(31)

小 儿 科

麻疹·····	(33)
百日咳·····	(34)
破伤风·····	(35)
鹅口疮·····	(35)
腹泻·····	(36)
急性肾炎·····	(36)
咳嗽、气喘·····	(37)
上呼吸道感染、肺炎·····	(38)

眼 科

结合膜炎·····	(41)
虹膜睫状体炎·····	(41)
内障眼·····	(42)

耳鼻喉科

变态反应性鼻炎·····	(43)
萎缩性鼻炎·····	(43)
咽喉痛·····	(44)
慢性化脓性中耳炎·····	(44)

皮 膚 科

荨麻疹·····	(45)
湿疹·····	(45)
秃疮、癣·····	(46)
顽固性牛皮癣·····	(47)
白皮癣·····	(47)
头部黄癣·····	(47)
鸡眼·····	(48)

脚气..... (48)

酒齄鼻..... (49)

□ 腔 科

牙痛..... (51)

拔牙后伤面出血..... (51)

潰瘍性口內炎..... (52)

口腔粘膜潰瘍..... (53)

口腔炎..... (54)

瘧 疾

来 源：北京医学院附属医院中医科王少清大夫家传秘方

主 治：瘧疾

处 方：杏仁三錢 常山三錢 檳榔三錢 烏梅三錢

制 方：用水三杯，煎成一杯。渣再煎，仍取一杯。煎成后露宿一夜。

用 法：于瘧疾发病前一小时温服。

注 意：治瘧疾发作三次以后，始可服此方。

效 果：本方单用多年，試之，极为有效，已使用20多年。

痢 疾

(一)

方 名：增味芍药湯

来 源：哈尔滨局衛生处（經驗方）

主 治：痢疾

处 方：車前子二錢 萊服子二錢 川 軍四錢
滑 石二錢 甘 草二錢 榔 片二錢
当 归一兩 白 芍一兩半 木 香一錢
只 壳二錢 川 連二錢 元 苓二錢

制 法：水煎二次，合一处，

用 法：分三次服，4小时服一次。

注 意：忌生冷、油膩。

效 果：共治40余例，輕者1剂，重再3剂即可痊癒。

(二)

来 源：上海鐵路中心医院

主 治：細菌性痢疾

处 方：金星鳳尾草1—2兩

用 法：加水200毫升，煎到40C.C.即可，在四小时內分两次服完，小儿減半。

效 果：治疗30例，效果显著。

(三)

来 源：成都局第二工程处医院

主 治：腸炎、痢疾、一般腹瀉

处方及制法：取新鮮鉄馬鞭草7斤，加水20,000C.C.煎三小时煎至15,000C.C.經過濾，加入陈皮酊(每100C.C.加1C.C.)

用 法：每日二次，每次50C.C.或每日三次，每次100C.C.。

效 果：患者曾××，女、21岁，六月十九日腹瀉20次左右，有脓血粘液便，輕度脫水，精神不好，經服上药，每日二次，每次100C.C.总服量为500C.C.22日治癒

流行性感冒

来 源：济南局青島鐵路医院中医科金显民大夫經驗方

主 治：流感、感冒

- 处** 方：荆芥 防风 桔梗 黄芩各二錢 姜夏一錢五分
甘草 柴胡各一錢
- 用** 法：水煎服，一日二次，早晚分服。
- 效** 果：共治疗300例，平均一付見效，2—4付治癒。

大叶性肺炎

- 来** 源：牡丹江鐵路中心医院內科（經驗方）
- 主** 治：大叶性肺炎
- 处** 方：蒲公英4—5两（一日量）
- 制** 法：蒲公英4—5两，加水800C.C.，煎成400C.C.。
- 用** 法：一日四次，每次100C.C.（每六小时服100C.C.，成人量重者（高热）可以每二小时服一次，至下热后可酌量减少或将服藥間隔時間延長。
- 注** 意：只能用于大叶性肺炎，有高热症状为适应，其他肺疾患无效。伴有心力衰竭时用强心剂。
- 效** 果：共治疗12例，均治癒。
- 效** 果：患者××服此藥后24小时內退热，48小时热恢复正常，X綫检查左右肺部炎症显著消失。

風 湿 症

（一）

- 来** 源：錦州局兴城疗养院
- 主** 治：风湿症
- 处** 方：透骨草三兩 海桐皮一兩 紅花一兩 防风一兩
当归酒炒一兩 荆芥一兩 羌活一兩 大活一兩
川椒二兩

- 制** 法：將上藥煮好，作浸浴。
- 用** 法：溫度為40°C，每次浸浴20分鐘，15次為一療程，每劑藥可連用三次。
- 注** 意：應注意再感風寒。
- 效** 果：以此法治療4例，其中3例症狀顯著好轉，1例無效。

(二)

- 來** 源：錦州工程大修醫療隊（民間驗方）
- 主** 治：風濕症
- 處** 方：洋金花三克 白酒五百毫升
- 制** 法：取夏季盛開之洋金花曬乾用3克置500毫升白酒中，浸泡48小時，然後濾過，用其濾液。
- 用** 法：日服3次，飯後服，每次服15毫升，連用10日為一療程，勿需間歇，可服至痊癒。
- 效** 果：共治療風濕性關節炎12例，坐骨神經痛1例，均獲良好效果。

(三)

- 來** 源：太原局大同鐵路醫院
- 主** 治：風濕症
- 處** 方：當 歸三錢 炒白芍二錢 茯 苓二錢
粉甘草二錢 檳 榔二錢 桔 梗三錢
元 參四錢 板蘭根四錢 菊 花三錢
馬 勃一錢 生 地二錢 杏 仁二錢
柴 胡一錢 銀 花二錢

用法：水煎服，早晚各一次。

效果：經臨床觀察，一般較輕者一兩劑后自覺症狀減輕，四、五劑后症狀消失，重者十幾劑即消失。

(四)

來源：錦州局阜新鐵路醫院

主治：風濕症

方：附子 細辛 肉桂 乳香 沒藥 當歸 桃仁
紅花 申姜 干姜 血竭 虎骨 花蠅 龜骨
麻黃 桂枝 土虫 大黃 黃柏 黃芩 白芷
甘草各一兩 冰片二兩。

制法：將以上各藥研成細粉，先將好米醋熬成液汁一斤半，牛胆汁熬成液汁1斤備用，再將香油14斤(豆油亦可)熬至滴水成珠，下漳丹七斤即成膏藥，再用砂鍋熬醋，胆汁與膏藥合一处融合后，下藥即成。

用法：不必用火烤，只用熱水將膏藥微浸，以手捻之，使柔軟，攤貼白布上，貼于患处(白布宜厚)，每貼可貼20多天，為一期。

效果：通過45例觀察，其中有27例有效。

消化性潰瘍

(一)

方名：內痛丸

來源：哈爾濱局衛生處(經驗方)

主治 治：消化性潰瘍
处方 方：甘草一斤 馬勃一斤 文蛤五錢 儿茶三錢
海粉五錢 白芨五錢 川軍三錢
制法 法：共研細面，制成水丸。
用法 法：每服个半～2个，一日二次飯前服。
效果 果：治疗12例，均痊癒。

(二)

来源 源：北京铁道医学院附属医院中医科于长印大夫經驗方
主治 治：消化性潰瘍
处方 方：当 归二錢 甘 草二錢 灵 脂一錢
瓦楞子二錢 香附末二錢 貝 母一錢
烏鰂骨二錢 川楝子二錢 沒 药二錢
卜 黃一錢 青木香二錢 桃 仁二錢
赤白芍五錢 (吞酸、有热者，加莫連二錢)
制法 法：用清水300毫升，煎成200毫升两剂，两煎药
400毫升。
用法 法：分二次服，每日早晚空腹各服100毫升。
注意 意：勿食酸、辣、干、硬等刺激性食物，应食稀軟、
易消化之流質食物。
效果 果：患者刘××，患胃潰瘍病七年之久，經服此药
五剂，症状好轉。

胃 痛

(一)

- 方** 名: 胃灵丹,
来 源: 哈尔滨局衛生处 (經驗方)
主 治: 胃痛、食思不振、吐酸
处 方: 瓦楞 甘松 广皮 神曲 各一斤
內舍 白术 牡力 各八兩
白叩七兩 木香四兩
制 法: 共研細面、制成水丸, 滑石为衣。
用 法: 一日三次, 每次服1.5錢。
注 意: 胃酸缺乏忌用。
效 果: 治20例, 效果良好。

(二)

- 来** 源: 吉林局梅河口鉄路医院中医张輯五經驗方
主 治: 胃痛、胃痉挛、吞酸、膈气腹胀、腸充气、腸炎
处 方: 大蒜一兩 山药一兩 阿魏五錢 雄黃五錢
硃砂三錢
用 法: 五分丸, 每次一丸, 白水送下。
注 意: 胃、腸十二指腸潰瘍、腹膜炎禁用。
效 果: 用之于胃痛病人25例, 效果良好, 其中: 11例全癒, 7例好轉, 7例輕快。

腹 痛

- 方** 名: 泄泻合剂

- 来** 源：貴陽局衛生處（經驗方）
主 治：腹痛、腹瀉、吞酸、消化不良
處 方：黃 芩三錢 白 芍三錢 木 香二錢
蒼 朮三錢 黃 柏三錢 建 曲三錢
檳 榔三錢 麥 芽三錢 陳 皮三錢
滑 石三錢 焦 查四錢 甘 草一錢
制 法：用水500毫升，煎成100毫升。
用 法：每次20~30C.C.，一日三次，飯前服。
注 意：虛寒泄瀉忌用。
效 果：治療400多例，療程一般1—2天，最多不超過三天。

蟯 虫 症

- 来** 源：青島鐵路醫院金顯民大夫獻方
主 治：蟯虫症
處 方：樟腦七兩 大棗肉適量（制成豌豆大小藥丸約千余粒）
用 法：每晚睡前，將一丸塞入肛門內。
注 意：切忌口服
效 果：治療40例，效果良好。

蛔 虫 症

- 来** 源：錦州鐵路中心医院吳長崑大夫經驗方
主 治：胆道蛔虫、腸管蛔虫
處 方：苦楝皮五錢 檳榔四錢 川軍二錢（5歲量）
制 法：用水400C.C.，煎成200C.C.。

主治：赤痢（阿米巴）

方药：馬齿莧六錢 白槿花五錢

用法：水煎服

療效：90%以上。

（省淮河医院中医科）

主治：赤痢（阿米巴）

方药：椿根白皮四兩 川連二錢 广木香二錢

制法：为細末蜜丸、每丸兩錢。

用法：每日早晚各服一九

療效：95%以上。

（省淮河医院中医科）

主治：阿米巴及細菌性痢疾

方药：白头翁五錢

用法：水煎服

療效：住我院患者凌化祥、男、20歲，王德祥、男20，等十餘例均服此药迅速治癒。

（市职工医院中医科）

主治：赤痢（阿米巴）及一般頑固性痢疾

方药：鴉旦子二兩（去壳）

制法：將鴉旦子仁研为泥狀加入适量蜂蜜加糖，溶化後熬干，为丸，莢豆大，硃砂为衣。

服法：成人服15粒，小孩服二九一五九，开水送下。

療效：98%以上。

（龍亭区联會医院）

效 果：經用此方治疗30%，效果均佳。

(三)

方 名：遂榔消肿散
来 源：吉林局梅河口鉄路医院中医張輯五經驗方
处 方：甘 遂二兩 二 丑一兩 木 香二兩
六 通二兩 檳 榔二兩
制 法：將以上五味藥研为細末，每付五分，体壯者可
每付用七分。
用 法：每天早晚各服一付。体質虛弱者每天早晨服一
次即可。
注 意：孕婦，心脏病患者禁服。
效 果：臨床治疗观察31例，其中：60%治癒，30%基
本好轉，10%輕快。凡由腎炎引起之浮腫，經
服此藥后浮腫均消。

(四)

来 源：牡丹江机車工厂医院
主 治：急性腎炎
处 方：銀 花三錢 菊 花二錢 黃 柏二錢
川 連二錢 毛 根三錢 丹 皮二錢
澤 瀉三錢 猪 苓三錢 茯 苓三錢
桑 皮二錢 車前子二錢 水煎服。
用 法：每剂分两次服，根据病情可适当增減上列藥
物。
效 果：治疗四例，效果滿意。

腹水併全身性水肿

效 果：长沙局株州铁路医院

主 治：腹水併全身性水肿

处 方：用法及注意事项：

1. 千金子：将千金子去壳，捣如泥，装入胶囊（每粒含量0.4克），每次用4—5粒，于清晨空腹吞服，可视情况，增减之。有的患者只用一粒而腹泻10余次者。服后大多无反应，个别则有胃部稍感不适或呕吐与轻微腹痛。

2. 二丑：将二丑微火炒香，研为细粉，每次用15—25克，于清晨空腹吞服，服后反应极少。

3. 白茅根：将乾白茅根切成小节，用半斤到一斤，加水500—1000C.C.用缓火煮沸后，移锅静置10余分钟，根沉入底时，去渣为一日量，分次服完，服后未发现反应者。以上三种药均为单味使用。

效 果：用以上单味中药治疗之18例中，16例（肾炎、肝硬化症等）腹水及全身性水肿迅速消失。

喘 息

来 源：锦州铁路中心医院

主 治：支气管喘息

处 方：蛤蟆鸡蛋

制 法：取蚺蛤蟆一只，将白皮鸡蛋一个，经口塞入蛤蟆肚内，外裹一指厚黄泥，用两块瓦扣住以火