

# 欽定四庫全書

子部

名醫類案卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

名醫類案卷十一

胎毒

胎毒

胎毒

胎毒

明 江瓘 編

利常先啼日以羸困問

食乳中虛冷兒得母寒

九十日即愈

三國志

歲之後身生紅絲瘤

欽定四庫全書

名醫類案

不救後四子至一二歲皆病瘤而死問何緣致此翌  
日思之謂曰汝乃腎中伏火精中多有紅絲以氣相  
傳故生子有此疾俗名胎瘤是也汝試觀之果如其  
言遂以滋腎丸數服以瀉腎中火邪補真陰之不足  
忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血受  
胎五月之後以黃芩白朮作散與五六服後生子前  
症不作

丹溪治一兒二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘

詢其母孕時喜食辛辣熱物視其子精神昏倦受病  
特深知其為胎毒也解利藥大非所宜遂以人參連  
翹黃連生甘草陳皮川芎白芍木通濃煎入竹瀝與  
之數月而安

一婦形瘦性急身本有熱懷妊三月適夏暑口渴思水  
時發小熱遂教以四物湯加黃芩陳皮生甘草木通  
因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲瘡痕遍身忽  
一日其瘡頓愈遂成痲瘋此亦胎毒也瘡若再作病

必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有

一女得癰遇陰雨則作遇驚亦作口吐涎沫聲如羊鳴  
此胎受驚也其病深痼須調半年可安仍須淡味以  
助藥力與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨時令加減  
果半年而愈

一人連年病瘧後生一子三月病左脇下陽明少陽之  
間生一癰甫平右腋下相對又一癰膿水淋漓幾死  
醫以四物湯敗毒散數倍加人參以香附為佐犀角

為使大料乳母三月而愈踰三月忽腹脹生赤疹如  
霞片取剪刀草汁調原蠶砂敷隨消又半月移脹入  
囊為腫黃瑩裂開二九顯露水出以紫蘇葉盛桴炭  
末托旬餘而合

一子年十六生七箇月得淋病五七日必一作其發則  
大痛水道方行下如漆和粟者一盞方定脉之輕則  
瀉重則弦視其形瘦而長青而蒼意其父必服固下  
部藥遺熱在胎留於子之命門而然遂以紫雪和黃

栢末丸梧子大曬極乾湯下百九半日又下二百丸  
食壓之又半日痛大作連腰腹水道乃行下漆和粟  
者碗許痛減十之八後與陳皮一兩桔梗木通各半  
兩又下合許而安父得燥熱尚能病子况母得之者  
乎

一小兒胎受熱毒生下兩目不開燈心黃連秦皮木賊  
棗各五錢水一盞煎澄清頻洗而開

程仁甫治一兒一歲之內大便三四十日只通一次每

次通時腹脹盛此乃胎毒熱結所致用元明粉米飲調下一錢三五次之後再不復秘矣

薛已治少叅史南湖孫乙未生丙申正月陰囊赤腫薛作胎毒治之而瘥後患發熱痰盛等症診其母有鬱

火血熱用解鬱涼血之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉小便赤澁兩眼睜動投參朮之類不應或以為慢驚欲用附子之藥請薛議視其寅卯關脉赤此風熱傷脾用柴胡清肝散加釣藤鈎木賊草一劑即

愈至丁酉正月初旬頸患熱毒潰而膿出感風發熱  
翌日頭面黯腫如斗大兩耳厚寸許此風熱上攻血  
得熱而然急砭兩額出黑血二盞許次砭面額亦如  
之隨用清熱化毒湯腫黯十退七八翌日又砭各處  
血不甚黑乃止仍用前藥去牛蒡子加熟地黃而愈  
此症若砭緩則血凝滯或為破傷風皆致死

劉欽天之子腿如霞遊走不定先以麻油塗患處砭出  
惡血其毒即散用九味解毒散一劑而安

一小兒患之外勢雖輕內苦便閉此患在臟也服大連  
翹飲敷神功散而瘥

胎暈

江篁南治一兒產數日常昏暈一日五六見醫作驚風  
治不效江以大補氣血之劑濃煎湯喂之并飲乳母  
多服漸減而愈

臍風

樞密孫公抃生子數日患臍風已不救家人乃盛以盤

合將送諸江道遇老媪曰兒可活即與俱歸以艾灸

臍下即活

青箱記

江應宿曰凡兒臍風須看牙齦有水泡點如粟粒以銀針挑破出汚血或黃膿少許而愈

又一法以熱水蘸綿子包指擦之輕挖破以金頭蜈蚣炙末敷之仍以厚衣包裹納母懷中取大汗出而愈再服歸命散解之

近來江南臍風之症最多蓋由赤子落臍之時不

慎照顧風邪流入心脾五七日而發面青口撮吐白

沫窘卒急迫失救遂致夭折急用蒜一兩搗捏作

餅子納于臍上以艾火灸五七壯以拔出風邪仍

用艾茸或綿子如錢大一塊貼於臍上外以膏藥

封之兼行前二法為妙

必有青筋發在腹有二道  
生以艾灸絕截住以頭

稍遲則上行  
攻心而死

撮口臍風方

生川烏尖三個為末全足蜈蚣半條  
酒浸炙為末加麝香少許吹鼻得嚏

乃以薄荷  
湯灌一匙

腎縮

思村王氏之子生七日兩腎縮一醫云硫黃茱萸研大  
蒜塗其腹仍以茵草蛇牀子薰之愈蓋初受寒氣而

然也

瑣錄

咯血

錢氏治段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫  
以桔梗湯及防己丸治之不效其涎上攻吐喘不止  
錢用補銀丸一大服下之復以補肺散治之醫曰今

咯血肺虛何以下之曰肺雖咯血有熱故也久則虛  
痿今涎上潮而吐當下其涎若使不吐涎為甚便也  
蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦使發搐故依法  
只宜下痰後補脾肺必涎止而吐愈若先補其肺為  
逆先下其痰為順先下後補為良也

熱症

錢仲陽治朱氏一兒五歲忽發熱醫曰此心熱也腮赤  
而唇紅煩躁引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯

下之來日不愈反加無力而不能食又下之便利黃

沫錢曰心經虛而留熱在內必被攻藥下之致此虛

勞之病也先用白朮散生胃中津液後以生犀散治

之宜參連並用朱曰大便黃沫如何曰胃氣正則瀉自止

此虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃

連一物耳性寒多服則利能寒脾胃也諸醫皆曰實

熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁

不食而引飲醫曰既虛熱何以大便黃沫錢笑曰便

黃沫者服瀉心湯多也因與胡黃連九而愈

鄭人齊郎中子忽臟熱自取青金膏三服併一服而餌之至三更瀉五行其子困睡齊言子睡中多驚又與青金膏一服又利三行加口乾而身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏一服其妻曰用藥十餘行未安恐生他病錢曰已成虛羸先多煎白朮散時時服之後服香薷九十三日愈

朱氏子五歲夜發熱曉即如故醫有作傷寒治者有作

熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃取白朮散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉否錢曰無生水不能作瀉縱多不足怪也但不可下耳朱曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神此藥是也至晚服盡錢視之曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得稍愈至第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而安