

頭痛 鬚髮 面病 耳病 鼻病 口舌

蘭唇 牙齒 眼目 喉痺 結核 癭瘤

肺癰 肺痿 心漏

己集卷六

頭痛

脉頭痛短瀋應須死浮滑風痰必定除寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛

夫頭者諸陽所聚之處也諸陰至頸而還惟足厥陰有絡上頭至顙頂其脉浮素弦長洪大者屬風熱痰火而致也其脉微弱虛濡者屬氣血兩虛必丹田竭而髓海空為難治也其有真頭痛者脉無神而腦中劈劈痛其心神煩亂為真頭痛也且發夕死夕發旦死蓋頭痛暴起者如鼻塞發熱惡寒乃感冒所致也其曰頭痛者有虛有火有痰厥頭痛者有偏有正蓋左邊宜小柴胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荊子酒荅其肩稜處痛者二陳湯加酒炒片荅羌活薄荷其腦頂痛者宜人參敗毒散加川芎藁本酒炒黃栢木瓜紅花酒炒大黃

○一論一切頭痛主方不問左右偏正新久皆效

清上蠲痛湯 當歸酒洗一錢小川芎一錢白芷一錢細辛三分羌活一錢獨活一錢防風一錢菊花五分蔓荊子五分蒼朮一錢米泔浸

門冬分甘草生三片荅酒炒一錢五分右剉一劑生薑煎服

○一左邊痛者加紅花七分柴胡一錢龍膽草酒洗七分生地黃一錢○一右邊痛者加黃芪一錢乾葛八分○一正額上眉稜

骨痛甚者食積痰壅用天麻五分半夏一錢山查一錢枳實一錢○一當頭頂痛者加藁本一錢大黃酒洗○一風入腦

髓而痛者加麥門冬一錢蒼朮一錢木瓜一錢荊芥各五分○一氣血兩虛常有自汗加黃芪一錢人參五分白芍一錢生地黃

錢各一

○一論年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈怔忡煩熱百節酸疼腦

昏目痛鼻塞聲重頂背拘急皮膚癢痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻注頭目昏痛並皆治之

追風散 防風去芦 荆芥穗一兩 羌活錢五 川芎一兩 白芷錢五 石膏兩煨 全蝎錢五 白附子錢五 天南星錢五

炮一 天麻錢五 地龍錢五 川烏炮去皮 草烏炮去皮 雄黃錢五 乳香錢五 沒藥錢五 甘草錢五 右為細末每服五

分茶湯調食後臨臥服清頭目利咽膈消風化痰

○一論痰厥頭痛其症眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白朮天麻湯 黃栢酒洗 乾薑炒 澤瀉 白茯苓去皮 黃芪蜜 人參 蒼朮米泔浸炒 神麴炒

白朮去芦 半夏薑 陳皮各七分 麥芽炒七分 右剉生薑三片水煎熱服可一劑而愈

○一論頭痛偏左者屬血虛火盛也

加味四物湯 當歸 川芎 生地黃 黃栢酒 知母酒 蔓荊子 黃芩酒 黃連酒 梔子炒 黃芩各等 右剉一

劑水煎溫服○風盛加防風荆芥

○一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也

黃芪蜜 益氣湯 黃芪蜜 人參 白朮去芦 陳皮 半夏姜汁 當歸酒洗 川芎 藁朮 甘草各五分 升麻 黃栢酒

細辛各三 右剉一劑薑棗煎服

○一論頭左右俱痛者氣血兩虛也

調中益氣湯 黃芪蜜 人參 甘草炙 蒼朮米泔浸炒 川芎各六分 升麻 柴胡 陳皮 黃栢酒 蔓荊子各三 當

歸各六分 細辛一分 右剉水煎溫服

○一論偏正頭風一切頭痛諸風眩暈頭目昏重

都梁丸 香白芷切碎晒乾為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸荊芥點腦茶細嚼下

○一論眉棱骨痛者風熱并痰也

選奇湯 羌活 防風 錢二 酒片苓 一錢五分冬月不用或甚者炒用 半夏 姜汁炒 甘草 一錢夏月生冬月炙 右剉一劑水煎食後服

○一論雷頭風者頭痛而起核塊也頭面疙瘩憎惡發熱拘急狀如傷寒

升麻湯 升麻 蒼朮 未泔浸薄荷葉各等分 右剉水煎服

○一譚侍御但頭痛即吐清水不拘冬夏吃薑便止已三年矣余作中氣虛寒用六君子加當歸黃芪木香炮

薑而瘥

○一論頸項強急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

○一治偏正頭痛頭風 羌活 白芷 細辛 川芎 蔓荊子 薄荷 防風 甘草 各等 右為細末每服

二三茶匙白湯調下

○一人頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲遍古生刺縮斂如荔枝然下唇黑裂面目俱赤煩燥不寐或時喉間如烟火上衝急飲涼茶少解已至于死脉洪大而無倫且有力捫其身烙手此腎經虛火遊行于外投以十全大補如山茅澤瀉牡丹山藥麥門五味附子一鍾熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後畏冷物而痊

○一治頭風腫痛偏正不拘 用艾槌爛鋪紙上將快捲成筒次將黃蠟熔化灌入筒內以滿為度如左邊疼將藥燒烟入右耳薰左即安

○一論半邊頭痛

祛痛膏 防風 羌活 藜蘆 細辛 菊花 各五兩 星 草烏 白芷 各一 右為細末用連鬚葱一把洗

淨同前藥搗成膏銅鍋頓熱量痛大小以油紙攤藥貼痛處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛即止
○一方加菊花獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

鬚髮

醫者所論人鬚髮眉雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白眉髮并白者或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也大率髮屬於心稟火氣故上生鬚屬於腎稟水氣故下生眉屬於肝故側生男子腎氣外行上為鬚下為勢故女子官人無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

婦人無鬚無血氣乎岐伯曰令婦人之生有餘氣氣不足于血衝任之脉不索唇口故鬚不生
官者其鬚獨去其故何也曰官者傷其宗筋血泄不復皮膚故鬚不生

夫官未嘗被傷其鬚不生其故何也曰夫官稟賦不足宗筋不成故鬚不生

天下第一烏鬚方 閩老高中玄傳 五倍子一斤擇整箇者箇箇搥破去蟲土擇粗者如黃豆大次者如赤

豆大又次者如菜豆大分三樣入新罐內炒如栗殼色以青濕布包之以腳踏成餅晒乾為末錫罐盛貯築實封口勿令泄氣聽用 紅銅末半斤淘去皮土見清水令乾入鉄鍋內炒大熱傾入醋少半碗拌勻濕

透再炒入醋七次研為末羅過以綿紙另包聽用 白礬 四兩為皂礬 四兩為白礬 片焙乾 切為細末紙

包 右每遇染鬚時量鬚擇多少用藥加五倍子九錢銅末一錢八分白礬白芨皂礬各九分再加食鹽九

分共入于碗內再研極細入小銅杓內以濃茶調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不住手攪勻熬成稠糊為度預先以肥皂水洗淨鬚髮待乾以根子挑藥乘熱塗鬚髮上用油紙兜住外用烏帕包裹至頂解衣護

枕而睡至半夜驗藥將乾用手搜去殘藥如乾其用茶漚濕潤去藥至天明洗面略洗鬚髮如面皮上有黑處以指蘸香油塗摩即用軟紙擦去油跡染後仍以香油少許潤之即明黑可觀先一月染上四次後半月染一次永不露白

野狐倒上樹 尚書劉三川傳 黑鉛四兩 鉛二兩 先將鉛化成汁後入汞凝成葉子剪成錢樣外用鉄絲穿作

二三串聽用 再用大磁罐一箇入無益好醋三碗將鉛錢入罐內懸於醋上離醋二指內泡卷栢二箇鴨

嘴膽礬四錢用磁碟封口蓋之再用黃泥封固夏月日中晒七日冬月糠火煨七日出罐底摘一孔出醋不

用揭起礬來掃下藥霜來用脂皮包住收之臨用藥時將鬚髮用溫水洗淨就濕再用脂皮包手脂粘藥霜

粘在鬚髮上自然黑到根神効切忌香肥皂水洗

烏鬚方 刺史周如梅傳 宮粉一兩二錢 白礬二錢 白石灰二錢 樟腦二錢 麝香二錢 輕粉三錢 真百草霜八錢 水銀一錢 先

錢化開入水 銀結成砂子 右為末用鹹水和熬滾塗鬚髮上燒半炷香即洗去

青雲獨步丹 烏鬚黑髮延年益壽 赤白何首烏共一斤 黑豆二升 半煮汁浸何首烏一晝 當歸身酒洗

赤茯苓半斤 用牛乳白茯苓 浸過者乾乳 補骨脂鹽酒炒 甘枸杞酒浸焙 兔絲子半斤 酒浸乾 懷牛膝甘草

水泡懷生地 黃酒浸 入砂仁三錢 真沒藥一兩五錢 去砂 右忌鉄器晒乾為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸

空心酒下午間薑湯下臨臥薑湯下忌三白

造酒烏鬚方 本府麥推府傳 懷生地黃 兩大當歸二兩 小紅棗肉三兩 赤白何首烏各一斤 煮水製過 真

生薑汁四兩 麥門冬去心 胡桃肉三兩 甘枸杞二兩 蓮肉三兩 土蜜三兩 右先用酒洗淨地黃將何首烏水去渣入地

黃煮候乾再用薑汁水煨乾為度便將地黃搗爛以一官斗糯米水十二斤作酒麪藥如常候酒漿來方以

水調勻地黃入酒糟內過三日去糟將前藥切片入絹袋中懸酒罈內箏殼包封每令出氣放鍋內煮三炷

曾補壽世錄元 卷六 三

香為度後以酒罈埋土中三宿去火毒任意飲三五杯

烏鬚秘方用龜尿 研墨塗鬚烏立時 要取龜尿亦有法 猪鬃刺鼻龜尿

烏鬚秘方 用馬蝗蜋尋起數條帛包要用時將雞血或猪血將馬蝗入血內令食飽針出血同龜尿同研墨濃塗鬚髮上可烏一月乃烏鬚第一方也

烏鬚神妙方 本府蘇通府傳 五倍子炒黑銅末錢白芨末入食鹽分何子末三沒石子末三白礬分黑礬

烏鬚狐狸倒上樹 周賓崇傳自蜀中得來 山茄要極黑者收約有八九升來去蒂以夏布包洗去漿水將片蘸藥汁于鬚髮上自尾倒上切莫粘肉上則洗不去了

一論烏鬚生髮良方 蒲公英滴淨切血餘洗淨青鹽四兩右用磁罐一箇盛蒲公英一層血餘一層青

鹽一層益泥封固淹春秋五日夏三日冬七日桑柴火煨令烟盡為度候冷取出碾為末每服一錢侵晨酒

調下

一儒者因飲食勞役及惱怒鬚髮脫落余以為勞傷精血陰火上炎所致用補中益氣加麥門冬五味及六

味地黃丸加五味鬚髮頓生如故

一男子年二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復舊

一史萬湖云有男女偶合鬚髮脫落無藥調治至後數月復生

面病

難經云人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽

難經云人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽

難經云人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽

難經云人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽

明胃之經起鼻交額中入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癰疹或面熱面寒隨其經症而治之

○一論面寒者陽明經虛寒也

升麻附子湯

升麻 葛根

白芷

黃芪

各七

大附子

炮七

人參

草豆蔻

各五

益智仁

炙甘草

右

剉一劑連鬚葱白二根水煎溫服

○一論面熱者陽明經風熱也

升麻黃連湯

升麻

葛根

各一錢

白芍

各七

川芎

薄荷

荆芥

各三

蒼朮

八分

黃連

酒洗

五分

酒芥

六分

犀角

四分

白芷

甘草

右剉水煎食後服

○一論面生瘡者上焦火也

清上防風湯

防風

一錢

荆芥

各五

連翹

八分

山梔

五分

黃連

五分

黃芩

酒炒

薄荷

五分

川芎

七分

白芷

八分

桔梗

八分

枳殼

五分

甘草

五分

右剉一劑水煎入竹瀝同服

○一論面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻白芷湯

升麻

防風

白芷

各一錢

芍藥

蒼朮

各三

黃芪

人參

各半

葛根

一錢

甘草

四分

右剉一劑

薑棗煎服宜早後午前取天氣上升於中使陽達於面也

○一論面生粉刺者肺火也

清肺飲

連翹

川芎

白芷

黃連

黃芩

荆芥

桑皮

苦參

山梔

貝母

甘草

右剉水煎臨

臥服

○一點痣方

以巴豆七箇石灰等分為末以鹹水搜在盞內藏糯米於巴豆石灰內候米爛將痣用針撥動

增補壽世保元 卷六

以米膏點之絕三日不洗自然脫落

○一起字出青方 礱石灰 紫蓼灰各一錢 人參五錢 鹹錢一錢 加百草灰 煉蓼灰各一錢 右為末水調寫字上有

泥起拂去再上

○一出刺青方 馬肉不拘多少儘令蒼蠅作壞生蛆出晒乾為末以針撥動青處搽藥其青自出

○一抓破面皮 用生薑自然汁調輕粉擦患處更無痕迹

○一洗面方 每早以漱口之吐在手掌中洗而久久自米澗粉刺自消

○一治赤紅爛臉 水銀一錢 拍油蠟一錢 共搗塗之

○一治面上瘡鼻酒刺 雄黃一錢 硫黃五錢 鉛粉一錢 右共為末乳汁調塗晚上數次日溫水洗之如此三次去

矣

耳病

脉兩寸脉浮洪上魚為溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必遺精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

耳者屬腎而開竅於少陽之部通會于手三陽之間坎離交則聚氣以司聰以善聽也關於腎而貫於腦內經

曰五臟不和則九竅不通其耳鳴耳聾耳聾者皆屬腎虛水不上流清氣不升所致也從補益門治之其壯

年及小兒耳腫耳痛耳塞乃三陽風熱壅遏所致也宜升陽散火湯加黃柏知母晚間兼服金花丸可矣

○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥丸而氣不聚故耳鳴耳重不聽及耳內痒

安神復元湯 黃芪蜜炒一錢五分 人參一錢五分 當歸酒洗一錢五分 柴胡一錢 升麻五分 黃連酒炒一錢 黃芩酒炒一錢 黃柏酒炒三錢 知母一錢

防風錢一 蔓荊子錢一 麥門冬錢一 茯神錢一 酸棗仁炒五分 小蓀錢一 甘草五分 甘枸杞子五分 右剉一劑圓眼肉

三枚水煎服

○一論勞聲氣聲風聲虛聲毒聲久聾耳鳴勞聲者勞火鼓其聽戶也氣聲者經氣滯塞於聽戶也風聲者耳熱閉其聽戶也虛聲者氣血虛耗而神不用也毒聲者膿血瘡礙妨於聽戶也久聾者病非一日邪氣壅塞也凡是聾者勢必耳鳴故總繫其耳鳴也

千金補腎丸

當歸酒洗

白芍

酒炒懷熟地黃

酒黃芪

蜜人參

白茯苓

山茱萸

酒蒸

牡丹皮

澤瀉

兔絲

子製石斛

蛇床子

肉苁蓉

乾薑

桂心

大附子

炮去

巴戟

去遠志

細辛

甘草

石菖蒲

兩

防風

羊腎

共

三十三味

西園公

加山藥

兩殊効

右為細末

煉蜜為丸

如梧桐子大

每服十五丸

加

至三四十丸鹽湯下

○一論虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿咽喉不利煩燥不寧

通明利氣湯

蒼朮

白朮

撫芎

陳皮

香附

黃柏

梔子

仁

貝母

三

錢

錢

生地黃

黃連

玄參

木香

分

檳榔

錢

粉草

黃芩

一錢

半酒浸

右剉二劑生

薑水煎入竹瀝同服

○一論陰虛火動而耳聾或鳴者

六味地黃丸

依本方加黃柏知母石菖蒲遠志去心屢驗

○一治耳鳴主方

黃連

黃芩

梔子

當歸

陳皮

膽星

各一

龍膽草

香附

各八

玄參

青黛

香各五

乾薑

右剉一劑生薑三片煎七分入玄明粉三分

瘕盛加五分

食後服

如作凡子加蘆薈五分

麝香

分

為末

神麝糊為丸

每服五十九丸

淡薑湯送下

如腎虛而鳴者服六味地黃丸

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急作寒作熱飲食不下是也

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急作寒作熱飲食不下是也

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急作寒作熱飲食不下是也

射干散 苦竹吳紹源傳 升麻 桔梗 射干 祝布 連翹 甘草 右剉水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛神効

○一治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾 生烏頭一味掘得乘濕削如棗核大塞耳旦易夜易不三日愈

○一論塞藥治耳聾殊効 石菖蒲一寸巴豆一粒全蝎一個去足尾 右為末葱涎為丸如棗核大綿裹塞耳即通

○一論塞藥專治耳聾或因病因氣及感風邪而聾者若年老而聾者不治

蚯蚓去土陰乾為末七分麝香三分明葱截寸許塞藥于內左聾塞右耳右聾塞左耳左右俱聾兩耳俱塞

○一治耳聾

通靈丹 安息者一錢五分桑螵蛸一錢五分阿魏一錢五分朱砂五錢草麻子仁七箇巴豆仁七箇獨蒜七箇 右為細末入二仁與

蒜同研為丸如棗核大每用一丸綿裹入耳內覺微痛即去

○一論停耳生膿并黃水

紅綿散 枯白礬五分乾胭脂粉二分麝香許片腦一分熟爐甘石五分 右為末先以棉杖子展乾膿水另將鵝翎

管子送藥入耳底○一方用蛙竹粉易礬甘亦効

○一治耳卒腫出膿水 用枯礬為末以筆管吹耳內日三四次或以棉裹塞耳中

○一治上熱耳出膿汁 甘草炙升麻 木通 赤芍 桑白皮炒 生地黃 前胡 赤茯苓 蔓荊子

甘菊花各等 右剉薑棗煎服

○一治人耳如蟬鳴服四物湯耳鳴甚此元氣虛損之症五更服六味丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而有火用八珍湯加山梔柴胡氣虛而有火四君子湯加山梔柴胡若因怒即聾或鳴實用小柴胡加

芎歸山梔虛用補中益氣湯加山梔子前甚用四物加白朮茯苓久用補中益氣午後甚用地黃丸

○一論治人因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡合四物加山梔茯苓陳皮而瘥

○一論耳鳴因虛火妄動心神不寧以養氣湯去升麻參芪加半夏茯苓川芎白芍竹茹黃柏黃連天麻蔓荊

子細辛

○一論耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以瘥為度○一法以紙裹灰火中煨之用良

○一治耳中肺火盛腎氣虛以四物湯四錢黃柏三錢重便煎空心服

○一寡婦耳內外作痛不時火熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡湯加生地黃以抑其血而愈又頃間結核

如寶珠寒熱用加味歸脾湯加味道遙散調補肝脾而愈

六味丸方見補中益氣湯內傷入珍湯方見補中益氣湯四君子湯方見補中益氣湯小柴胡湯○加味道遙散○加味歸脾湯方俱見

勞

○一專治耳鳴耳聾

獨勝丸 川黃柏去皮入兩人乳拌勻晒乾再用鹽水炒燂包 右為細末水糊為丸如梧子大每服百丸空心益湯送下

○一治耳內腫痛膿血出 白礬枯末入麝香少許吹耳中日三四度或棉裹塞耳中立瘥

○一治耳聾 細辛為末鎔黃蠟為丸如鼠糞大綿裹塞耳中又以炙耳前陷中七

○一治氣道壅塞兩耳聾聵 用甘遂如棗核大棉裹塞耳中却以甘草放口內隨嚼又宜生葱白塞耳內頻

換即通

鼻病

脉右手脉浮洪而數為鼻衄疏○左手脉浮緩為傷風鼻塞鼻塞流涕

夫鼻者肺之候時常和則吸飲香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役之過則鼻氣不能宣調清道壅塞即為病也為衄血為壅為塞為瘡瘍為窒塞不通為濁涕不聞香臭此皆臟腑不調邪氣鬱於鼻而清道壅塞矣寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之可也

○一論肺熱鼻流濁涕窒塞不通又治鼻不聞香臭

神愈散 細辛白芷與防風 羌活當歸半夏芍 桔梗茯苓陳皮輩 十盤等分剉和同 三錢薄荷薑煎

服 氣息調勻鼻室通

○一治腦漏 防風 荊芥 獨活 連翹 藁本 辛美 甘草 細辛 牙皂 石菖蒲 右剉水煎服

如數服未効可將後藥三味為末棉裹塞鼻內即効

○一論鼻流濁涕不止者名曰鼻淵乃風熱在腦傷其腦氣腦氣不固而液自滲泄也

蒼耳散 白芷兩辛美仁 蒼耳炒各一錢五分薄荷五分 右剉水煎服

○一論鼻中流出臭膿水名曰腦漏

辛美散 辛美花錢一錢黃芪錢一錢人參錢五分當歸錢一錢白芍錢一錢川芎錢一錢白芷錢一錢細辛八分黃芩酒炒一錢甘草六分 右剉一劑

燈心三十根水煎食遠服

○一治額瘡或鼻瘡 乳香 沒藥各五錢孩兒茶錢一錢雞腔脰焙黃色一錢 右為末擦患處

○一老人鼻中流涕不乾 獨蒜四五箇搗如泥貼腳底心下用紙貼之其涕再不發

○一男子酒醺鼻 雄豬膽每日早以好酒調服一箇不過半月如舊

○一治糟鼻驗方 用硫黃為細末甚者如草烏同為末以酥油調稀塗患處如覺痛苦用梔子煎湯服之或

洗藥處即愈

○一論鼻赤久不瘥用大黃芒硝檳榔等分為末水調敷患處三四次洗淨以新銀杏去殼嚼爛敷於鼻上不
過五七次復舊

○一治赤鼻 檳榔為片將茄汁浸晒一二次為末面上紅壘硫黃以人乳浸滿碗頓入湯鍋煮乾先須用唾
濕鼻方抹藥末

○一論鼻淵頭眩

清泥丸斂神湯 人參 防風 麥門冬去心當歸頭 桔苓酒炒 小草 黃連酒炒 蔓荊子分 升麻各 三生甘

草仁 明天麻 半夏製各七分 右剉水煎食遠服 腦漏者加蒼耳子錢 黃芪錢

○一論鼻流涕久而不愈為成腦漏必因虧損元陽以致外寒內熱甚則有滴下腥臭之惡者也知保養服藥
方可

加味防風湯 防風 片苓酒炒 人參錢五分 白朮錢一 麥門冬去心 生甘草五分 知母錢一 白芍錢一 懷生地酒洗 黃

栢酒炒 黃芪錢一 黃連酒炒 當歸頭錢一 百合錢一 右剉水煎食遠溫服

○一論鼻涕長流名鼻淵也 當歸 川芎 白芷 人參 白茯苓 蒼耳子 香附子各一錢 天竹黃三

防風 秦艽 荊芥 薄荷 麥門冬 蔓荊子 甘草略 右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三四十

丸米湯下

○一男子面白流清涕不聞馨穢三年矣用補中益氣湯加麥門山梔而愈

○一論色慾太過虛損白濁軌出清涕如泉湧者

補中益氣湯方見依本方加黃栢知母白芷細辛藁本五味子白菊辛夷蒼耳葉水煎溫服

○一論肺虛為四氣所干鼻內鼻塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭 川芎 白芷 細辛 藁本 防

風 本通 辛美仁 甘草 右剉水煎溫服

○一治鼻中肉贅臭不可近痛不可搖以白礬末加硃砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯合瀉白散二劑此味厚壅濕熱蒸於肺門如雨霽之地突生芝菌也

○一治鼻中肉贅 用藕節有毛處一節燒灰存性為末吹患處即瘥

○一治血熱入肺名曰酒瘡鼻此方主之 苦參淨末四兩當歸淨末二兩 右和勻酒糊為丸如梧子大每服七八十

丸食後熱茶服

○一治鼻痔爛通鼻孔 子治陳都憲夫人患此得効 鹿角一兩白礬一兩俱放在瓦上隔火煨過 人頭髮錢五

在燈火上燒過 右為末先用花椒湯洗淨搽藥於瘡上三四次即愈如瘡不收口用瓦松燒灰存性研末

乾搽之即收

○一人酒瘡鼻紅赤子用此方晚服用六味地黃丸全料加當歸二兩苦參四兩空心服不兩月而愈

金花丸 黃連二兩苦茶二兩黃栢二兩梔子一兩大黃二兩桔梗二兩白粉葛二兩 右為細末丸水糊丸如桐子大每

服七八十丸白溫水下

口舌

脉左寸洪數心熱口苦○右寸浮數肺熱口辛○在關弦數而虛膽虛口苦甚洪而實肝熱口酸○右關沉實

脾胃有實熱口甘兼洪數者口瘡或為重舌舌古脉虛者中氣不足口舌若服涼藥不愈者宜理中湯

夫口舌之為病或為重舌舌古或為糜爛生瘡之類經云肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛

腎熱則口鹹有口淡者胃熱也口臭者乃臟腑燥腐之氣縕積於胸臆之間而生熱衝發於口也口瘡者脾

氣凝滯加之風熱而然也治當以清胃瀉火湯主之此正治之法也如服涼藥不已者乃上焦虛熱中焦虛

寒下焦陰火各經傳變所致當分別而治之如發熱作渴飲水口瘡者上焦虛熱也補中益氣湯主之如手足冷肚腹作痛大便不實飲食少思口瘡者中焦虛寒也附子理中湯主之如晡熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數口瘡者下焦陰火也六味地黃丸主之如食少便滑而黃肢冷火衰上虛也八味丸主之若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處若從脚起乃無根之火也亦用八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若藥用涼藥損傷生氣為害匪輕

○一論心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

清金導赤散 黃連 黃芩 梔子 木通 澤瀉 生地黃 麥門冬 甘草 右剉一劑生薑三片水煎

食後頻服

○一論上焦實熱心胃二經之火而作口舌生瘡腫痛者并咽喉牙齒耳面腫痛皆効

清胃瀉火湯 連翹 桔梗 黃連 黃芩 梔子 乾薑分七 玄參 升麻 生地黃各一錢 薄荷分五 甘草分三

右剉水煎頻頻溫服

○一論飲酒過度古本強腫言語不清此脾虛濕熱以益氣湯加神麴麥芽乾葛澤瀉

○一論上焦虛熱發熱作渴飲食勞則體倦此內傷氣血而作口舌生瘡者宜

補中益氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子

○一論中焦虛寒手足冷肚腹痛大便不實飲食少思而作口舌生瘡者以

附子理中湯方見中寒依本方

○一論晡熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數而作口舌生瘡者此下焦陰火也以

六味地黃丸方見補益依本方

○一論如食少便滑面黃肢冷而作口舌生瘡者此火衰土虛也以

八味丸方見補益依本方

○一論若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處而作口舌生瘡者若從脚起乃無根之火也以八味丸及十全大補湯方見補益依本方加麥門冬五味子

○一論口瘡臭氣穢爛久而不瘥者用黃柏五錢青黛一錢五分為末每用一錢於舌上津嚥下

○一論口瘡用黃連川椒等分為末每少許搽瘡上嚥漱良久以凉水漱嚥咽有瘡加孩兒茶

○一治口舌生瘡

加味陰陽散 黃連 乾薑 青黛 孩兒茶各等 右為末每用少許搽患處立効 ○一方用五倍子為末

搽瘡上即愈

○一治口瘡良方 徐杏庄老師傳 生白礬錢一朱砂錢二 右共為末敷上立愈

○一論口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽痰涎清聲潤肺寬膈除熱

上清丸 黃濱江傳 百藥煎四兩薄荷四兩砂仁二兩訶子五錢桔梗錢五 甘松錢五寒水石二兩玄明粉錢五硼砂錢五片

腦 右為末甘草熬膏丸如梧子大每服三五丸茶清下

○一論口瘡連年不愈者此虛火也

玄門丹 天門冬錢五麥門冬錢五各等 右為細末煉蜜為丸如彈大每服一丸嚥化下

○一人口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此中氣真寒而外虛熱也用加減八味丸而愈

○一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本散舌下其熱當責於心脾二經經所謂熱勝則腫也

用葶麻子去殼帛裏裹出油透紙作摺燒烟薰之而愈本草云葶麻主浮腫惡氣取油塗之葉主風腫不仁