

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

平濟方卷之

經效諸症

育麟丹

育麟丹
有三
有無
方

周王朱橚撰

求嗣續故聖人謂不
主重也凡欲求子當先
方調治便內外和平則

地者萬物之父母也陰

欽定四庫全書

普濟方

一

陽者血氣之男女也有夫婦則有父母婚姻之後則有
生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血
先至陽精後衝血開聚精陰外陽內陽精先至陰血後
生精開聚血陽外陰內陰含陽胎而女形成矣陽含陰
胎而男形成矣若夫受形之異者男女必當其年男子
二八精氣溢瀉必三十而娶女子二七天癸至必二十
而嫁欲其二氣充實然後交合交而孕孕而育育而壽
儻若婚嫁不時真氣早泄未完而傷是以交而不孕孕

而不育育而不壽者多矣以此觀之男女婚嫁貴乎及時夫婦貴乎益壯則易於受形也且父少女老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦人血衰而氣旺是謂夫病婦疹皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽平和則婦人易有子矣 又曰無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫病婦疹皆令無子若是墳墓不嗣年命相尅此二者非藥能

益若夫病婦疹須用藥餌乃能有效也然婦挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉澀或崩泄帶下致陰陽之氣不和經血不行乖候故無子也診其右手關後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子也尺脉為濇中年得此為絕產也少陰脉如浮緊則絕產後惡寒尺寸俱微弱者則絕產也又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或傷過度致冷風之氣乘其經血結於子臟結冷故令無子也凡婦人二三十而無子經血如常或有時經血不

調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙不能為用故也可用獨聖散瀉訖寒痰三二升後用導水丸禹攻散泄三五行或十餘行單用無憂散泄十行處寒熱虛實用之次服葱白粥三五日胃氣宜通腸中得實可服玉燭散更服白朮散茯苓之類降火益水既濟之道當不數月而有孕成胎內經曰婦人有癰痔遺溺嗌乾諸證須服妙藥針灸亦終不能孕蓋衝脉腎脉任脉有此病故不孕也 婦人所以無子者衝任不足腎

氣虛寒也內經云女子二七天癸至任脉通太衝脉盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本於夫病婦疹者當原其所因而調治之要之男服七子散女服紫石門冬丸及坐導藥盪胞湯無不有子也

方

秦椒丸

出聖惠方

治婦人斷緒生來未產盪滌腑臟使玉

門受紫精子臟風虛冷氣致陰陽二氣不能和合故

令久無子

秦椒

白朮

各三銖十

沙參

露蜂房

鼠婦

桃仁

卷栢

細辛

白殭蠶

牡蒙

石斛

甘草

蕪荑

各一兩

牛膝

人參

芍藥

牡丹皮

大黃

桔梗

栢子仁

桂心

玄參

白薇

茯苓

天雄

各十銖八

黃芪

五味子

當歸

白芷

蟾蜍

白欬

乾薑

各一兩半

澤蘭

乾地黄

芎藭

各一兩十八銖

乾漆

白石英

附子

各二兩

鍾乳

二兩半

水蛭

七十枚

紫石英

麻布叩復頭

七尺燒

蝨蟲

一百枚

右為細末蜜為丸如梧桐子大酒服日再稍加至二

十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異日即

停一方無鼠婦

栢子仁丸

出聖惠方

治婦人子臟虛冷產後續斷無子多

時

栢子仁

澤蘭

防風

去蘆頭

當歸

剉碎微炒

白石英

細研

水飛過

厚朴

去麁皮塗生薑汁炙香熟

熟乾地黄

牛膝

去苗各一兩

杜仲

去麋皮炙
微黃剉

乾薑

炮製
剉

紫石英

細研水
飛過

川椒

去目

及閉口者微
炒出汁三分

甘草

炙微赤
剉三分

細辛

白朮

蕪荑

桂心

赤石脂

細研
人參

去蘆
頭

石斛

去根
剉

桔梗

去蘆
頭

肉蓯蓉

白芷

龍骨

五味子

白芍藥

藁

本

防葵

白茯苓

鍾乳粉

二兩

獨活

秦朮

黃芪

各一
兩

右為末入研藥料多研令勻煉蜜和丸梧桐子大每
服三十丸空心晚溫酒下

白薇丸

出聖惠方

治婦人子風臟虛積冷經絡不調面無

血色肌肉消瘦不能飲食及帶下久無子

白薇 細辛 防風 人參 秦朮 秦椒 白

欽一云桂心 牛膝 蕪荑 沙參 芍藥 五

味子 白僵蠶 牡丹 蟪螬各一兩 乾漆 栢子

仁 乾薑 卷栢 附子 芎藭各十銖 桃仁 紫

石英各一兩半 鍾乳 乾地黄 白石英各三兩 鼠婦半兩

水蛭 蝨蟲各十枚 吳茱萸十八銖 麻布叩復頭一尺燒

右為末蜜為丸如梧桐子大酒服十五丸日再稍加至三十九丸當有所去小覺有異即停服

又方

出千金方一名白薇丸

治久無子或斷緒上熱下冷百病

皆治之

白薇 乾地黄 乾薑 車前子 蜀椒 紫石

英 藁本 石膏 菴蘭子 卷栢

各三銖澤蘭

赤石脂 白龍骨 遠志 麥門冬 茯苓 太

乙餘糧

各三兩

當歸

芎藭

蛇床子

白芷

覆

盆子 桃仁 人參各一兩半 桂心 蒲黃各二兩半 細辛

三兩半 橘皮兩

右為末蜜和為丸如梧桐子大酒服十五丸日再漸

增以知為度亦可至五十九慎猪鷄生冷酢滑魚蒜

驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝

及心至四月五月不用

廣脣丹

出御藥院方

治久無子息

黃芪

剉細一兩半

人參

上黨者去苗

川續斷

剉

澤蘭葉

去枝熟

地黃焙 牡丹皮淨 延胡索 白芍藥 川芎 白

薇 嫩鹿茸燎去毛 炙乾另研稱 白茯苓去皮 當歸去苗洗淨切炒

乾肉蓯蓉酒浸軟皺切焙乾 防風去苗 葉本去苗 丹皮

華細辛去苗葉土細搗羅過 蓬莪茂 京三稜二味和白麵

麵就熱杵碎稱 乾薑炮製一兩 木香 山茱萸 肉

桂去麋皮各半兩 黑附子炮製去皮臍二錢 甘草剉炒 覆盆子去萼枝各

二兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一粒空心食前

細嚼溫酒下日進三服有孕住服昔有人常服此藥而生七男以此常合與人服而皆應也

白薇丸 療百病斷絕緒產

白薇

細辛

厚朴

椒

炒出汗

桔梗

鱉甲

炙各五分

防風

大黃

附子

炮

石硫黃

研各六分

人參

桑上

寄生

各四分

半夏

牡蒙

白殭蠶

續斷

秦朮

紫苑

杜蘅

牛膝

蟲蟲

去翅足熬

水蛭

紫石英

研朴硝

桂心

鍾乳

當歸

各八分

右擣篩蜜丸空心服溫酒下如梧桐子大十五九日
二漸加至三十丸不吐不利忌生冷油膩飭生血物
大菟生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭

紫石門冬丸

出聖惠方

治婦人久無子及數經墮胎皆因

衝任之脉虛損胞內宿寒疾病經水不時暴下不止
月內再行或月後子宮臟積冷虛羸百病崩漏帶下
三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小腹急重小便白濁
以上疾症皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能

主療常服除瘀血溫子臟令有孕臨產易生子及生子充實無病

紫石英 天門冬 各三兩 當歸 芎藭 紫苑 卷

栝 桂心 烏頭 乾地黄 牡蒙 一作牡荊子 禹餘

糧 石斛 辛夷 各二兩 人參 桑寄生 續斷

細辛 厚朴 乾薑 食茱萸 牡丹 牛膝 各三

十栝仁 一兩 薯蕷 烏賊骨 甘草 各一兩半

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸漸增至三