

伤寒论集注

包头市第三医院中医冯骥集注

包头市科学技术委员会
包头市科学技术协会
包头市医药卫生学会

合印

自序

窃謂伤寒三百九十七法，一百一十三方。吾輩遵从，如金科玉律，以为經文，不敢异拟所以註疏家，随文訓释。犹公穀之說春秋也。考其一百一十三方，无大出入，費須再議。其三百九十七法，无人指实，惟清陈念祖，以为三百九十七法即三百九十七节，意甚有見。但此等名目，皆系叔和妄編。虽經林亿諸公校正不得仲景原集。惑于三百九十七法，一百一十三方之数，以附会叔和所定之伤寒。于是欲知仲景之道，更不可得，反开疑端于后人。豈非三百九十七法等說。所誤乎，余有見于此。意欲糾正，而無法入手。近讀時賢、余无言先生所著之伤寒新义。就中删除叔和杂鄙之文，二十有九条。以举深得我心。夫仲景之伤寒論，尘封二千年。吾人每讀，不能終卷者，实为叔和荒謬之文，混諸所致焉。况此等杂文，无人能解即强解之，亦无深意，传疑不可，传信无徵，誠不若刪之为愈也。是則三百九十七法也即本論之三百六十七条。可知仲景之書，未尝拘于三百九十七法。余于伤寒究心有年，愧未深悉，稍有此中微理，敢略陈固陋。以启后人爱取伤寒新义，于逐条之后，殿以集註，以作小結。除遵古今中外，名賢之註释外。其或有未尽之辭，見解不同，經旨不合者，余补充归納一致，用以启发两千年来之祖国

伤寒論目錄

卷一 太陽上篇

太陽病提綱..... (8)

太陽病脉証

經尽自愈

煩汗自解

待期自愈

太陽病欲解時

六經病解比例表：

太陽病欲解時	从巳至未上
陽明病欲解時	从申至戌上
少陽病欲解時	从寅至辰上
太陰病欲解時	从亥至丑上
少陰病欲解時	从子至寅上
厥陰病欲解時	从丑至卯上

中風及傷寒	(13)
中風証	
傷寒証	
溫病及風溫	(17)
溫病証	
風溫証	
太陽解肌法	(18)
桂枝湯証 (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)	
(八) (九) (十) (十一) (十二)	

桂枝湯主証及主方表：

桂枝証畢具	脉浮頭項強痛發熱自汗惡風惡寒鼻鳴干嘔
桂枝証不畢 具及小變証 及其他	(一) 發熱出汗 (二) 發熱汗出頭痛 惡風 (三) 常人無熱自汗出 (四) 常人發熱自 汗出 (五) 脉浮弱 (六) 服桂枝湯未如法 反煩不解 (七) 服桂枝湯大汗出脉洪大 (八) 傷寒汗不徹解後復煩脉浮數 (九) 表 証未解 (十) 誤下後氣上衝 (十一) 汗下 後脉仍浮

桂枝系變証	(29)
-------	--------

桂枝增芍藥生姜加人參湯証

桂枝加附子湯証

桂枝加厚朴杏子湯証

桂枝去芍藥湯証——桂枝去芍藥加附子湯証

桂枝去芍藥加茯苓白朮湯証

桂枝系變証及變方表：

桂枝系變証	桂枝系變方
過汗身疼痛脈沉遲	桂枝增芍藥生姜加人參湯
漏汗不止惡風肢急	桂枝加附子湯
誤下微喘表未解	桂枝加厚朴杏子湯
喘家患中風証	同上
誤下脈促胸滿	桂枝去芍藥湯
誤下脈微惡寒	枝桂去芍藥加附子湯
汗下後仍頭項痛發熱又無汗心下滿微痛小便不利	桂枝去芍藥加茯苓白朮湯

太陽發汗法……………（37）

麻黃湯証（一）（二）（三）（四）（五）

麻黃湯主証及主方表：

麻黃湯畢具証	頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘
麻黃湯不畢具証	脈浮者脈浮數者
	脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解
	十日已去脈但浮 太陽陽明合病喘而胸滿

麻黃系變証..... (45)

大青龍湯証 (一) (二)

小青龍湯証 (一) (二)

桂枝麻黃各半湯証

桂枝二麻黃一湯証

桂枝二越婢一湯証

麻黃系變証及變方表：

脈浮緊身疼痛發熱惡寒無汗煩燥	大青龍湯
脈浮緩身不疼但重無少陰証	大青龍湯
表不解心下有水干嘔發熱而咳	小青龍湯

表不解心下有水咳而微喘发热不渴	小青龍湯
如瘧狀发热惡寒寒多熱少一日二 三发不 _レ 便調面赤身痒	桂枝麻黃各半湯
形如瘧日再发	桂枝二麻黃一湯
发热惡寒熱多寒少	桂枝二越婢一湯

辛溫甘涼合用解表法……………（ 57 ）

小葛根湯証

葛根湯証

葛根湯証方治表：

太陽病項背強几几汗出惡風	小葛根湯
太陽病項背強几几无汗惡風	葛根湯

太陽衄血証……………（ 60 ）

衄血自解証（一）〔二〕

麻黃湯証

桂枝湯証

衄血証方治表：

伤寒脉浮紧无汗服麻黄汤后微除复发煩目 瞑而衄血	阳气重自解
伤寒脉浮紧无汗未服麻黄汤自衄血	阳气重自解
伤寒脉浮紧无汗致衄血邪仍不解	麻黄汤
伤寒不大便六七日小便清者邪在表須发汗 汗后头痛者必衄	桂枝汤

卷二 太阳中篇

桂枝湯禁証…………… (65)

脉紧无汗禁

坏病禁

酒客禁

服湯吐者禁

麻黃湯禁証…………… (68)

咽喉干燥禁

淋家禁

疮家禁

衄家禁

亡血家禁

胃家寒禁

尺中脉迟禁

誤下尺脉微禁

桂枝禁例及麻黃禁例合表。

桂枝湯禁例	麻黃湯禁例
脉浮紧汗不出	咽喉干燥
汗吐下溫針不解	淋家
酒客病	疮家
	衄家
	亡血家
	干家
	病人胃寒
	伤寒尺中脉迟
	下之身重心悸

汗吐下變証…………… (75)

誤治脾胃和自愈

誤治小便利自愈

誤治致冒自愈

誤治战汗自愈

下汗振寒脉微証…………… (79)

芍药甘草附子湯証

調胃承气湯証

白虎加人参湯証 (一) (二)

麻黄杏仁石羔甘草湯証 (一) (二)

厚朴生姜半夏甘草人参湯証

发汗阳虛冒心証

桂枝甘草湯証

茯苓桂枝甘草大枣湯証

茯苓桂枝白术甘草湯証

真武湯証

茯苓四逆湯証

干姜附子湯証

汗后飲多喘証

汗后水药不入証

汗吐下变証及方表:

汗吐下亡津液	阴阳和自愈
下后复汗亡津液	小便利自愈
先下后汗表里虛因致冒	汗出自愈

太阳病脉阴阳俱微	振慄汗出自愈
下后复汗振寒脉微細	(补) 芍药附子湯黃 芪建中湯
发汗后反惡寒	芍药甘草附子湯
发汗后但热不惡寒	調胃承气湯
服桂枝大汗出煩渴脉洪大	白虎加人参湯
伤寒吐下后表里俱热煩燥大渴	白虎加人参湯
发汗后汗出而喘无大热	麻杏石甘湯
下后汗出而喘无大热	〃
发汗后腹胀滿	厚朴生姜半夏甘草人 参湯
发汗过多心下悸	桂枝甘草湯
发汗后脐下悸	苓 桂草枣湯

吐下后逆气上冲头眩脉沉紧	苓桂术甘湯
汗后仍发热心悸身𦐇动欲擗地	真武湯
汗下后病不解煩燥	茯苓四逆湯
下后复汗昼煩夜靜无表証脉沉微	干姜附子湯
汗后飲水多而喘	(补) 五苓散
汗后水药不入口更发汗吐瀉不止	(补) 小半夏加茯苓湯

吐逆証..... (94)

吐后小逆証
吐后内煩証
汗后胃冷吐証
极吐胸痛微煩証
吐逆証方治表。

太阳病一二日吐之口不能食	(补) 小半夏湯
三四日吐之欲食冷食朝食暮吐	半夏干姜湯
太阳病吐之不惡寒而内煩不欲近衣	(补) 竹芭石羔湯

发汗令阳气微 膈气虚 脉数为客 热不能消谷 胃中虚冷而吐	(补) 小半夏汤 小温中汤
过经十余日 温温欲吐 胸痛便溏 腹微 满郁郁微烦 先此时自极吐下者	调胃承气汤

火逆证..... (99)

誤火下利自解証

誤火譫語証

誤火解汗証

誤火清血証

誤火吐血証

誤火伤筋煩逆証

誤火腰痺証

桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨汤証

桂枝加桂汤証

桂枝甘草龙骨牡蛎汤証

火逆証方治表:

太阳病 變其背大汗出 大热入胃 躁燥 譫語	振慄下利自愈
邪风被火热 阴阳俱虚 渴譫語 躁扰捻 衣摸床	小便利者下之可愈
脉不弦紧而弱 被火譫語 发热 脉浮	当汗出自愈

太阳病燔不得汗到經不解渴血	(补)救逆湯
脉浮灸之实以虛治咽燥吐血	〃
脉微数誤灸煩逆火气內攻焦骨伤筋	〃
脉浮灸之邪无从出腰以下重而痺	先煩而后汗解
伤寒脉浮火劫亡阳惊狂不安	救逆湯
伤寒温針針处被寒核起而赤內发奔豚	桂枝加桂湯
火逆又下之因燒針煩燥	桂枝甘草龙骨牡蛎湯

汗出下坏証…………… (110)

誤治心痞胸煩証

誤治筋惕成痿証

甘草干姜湯証

芍药甘草湯証

調胃承气湯証

四逆湯証

誤下发黃証

誤治譫語証

麻黄升麻湯証

柴胡加龙骨牡蛎湯証

汗吐下坏証方治表:

一、汗不惡寒再下心下痞三燒針而胸煩

面色赤黃肤潤难治色微黃手足温易愈

吐下发汗虚烦脉微心下痞胁下痛气上冲经脉动惕久惕而成痿	(补) 茯苓桂枝白术甘草汤。柴胡龙骨牡蛎汤
伤寒脉浮自汗心烦躁微恶寒脚挛急误与桂枝汤	甘草干姜汤。芍药甘草汤。调胃承气汤。四逆汤
伤寒脉迟浮弱系在太阴误下不能食脘满身黄也	(补) 在表用五苓脾虚合真武
太阳转入少阳误吐下发汗温针谵语柴胡证罢	知犯何逆以法治之
伤寒大下寸脉沉迟手足厥逆唾脓血泄利下止	麻黄升麻汤
伤寒下之胸满烦惊小便不利谵语身重	柴胡加龙骨牡蛎汤

卷三 太阳下篇

余热虚烦证..... (120)

栀子豉汤证 (一)

栀子甘草汤证

栀子生姜汤证

栀子豉汤证 (二) (三)

栀子厚朴汤证

栀子干姜汤证

栀子汤禁证

栀子汤证治表:

发汗吐下后虚烦不眠反覆颠倒心中懊恼

栀子豉汤

虛煩兼少气者	梔子甘草豉湯
虛煩兼 者	梔子生姜豉湯
发汗或下后煩熱胸中窒者	梔子豉湯
伤寒大下身熱不去心中結痛者	梔子豉湯
伤寒下后心煩腹滿臥起不安者	梔子厚朴湯
伤寒大下后身熱不去微煩者	梔子干姜湯

下利証…………… (125)

葛根湯証

葛根黃芩黃連湯証

桂枝人參湯証

四逆湯証

赤石脂禹余糧湯証

下利証方治表：

桂枝証反下之利不止脉促表未解	葛根湯
桂枝証反下之喘而汗出表已解	葛根黃芩黃連湯
太陽表証數下之協熱而利利下不止心下痞鞭表里不解	桂枝人參湯
伤寒醫下之下利清谷身疼痛	四逆湯麻黃湯
伤寒服下藥利不止心下痞鞭服瀉心湯不愈后下利不止与理中湯利益甚	赤石脂禹余糧湯

前証复不止者当利小便

(补) 五苓散

煩渴蓄水証…………… (130)

五苓散証 (一) (二) (三) (四)

文蛤散証

五苓散証 (五)

飲多心悸里急証

蓄水証方治表:

太阳病发汗后大汗出胃中干煩躁欲得飲水	少少与飲水則愈
太阳病发汗后脉浮小便不利微热消渴	五苓散
发汗已脉浮数煩渴小便不利	五苓散
伤寒汗出而渴小便不利	五苓散
伤寒汗出不渴小便不利	茯苓甘草湯
中风发热六七日不解而煩有表里証渴欲飲水入水則吐	五苓散
病在表以冷水濯之其热被劫益煩肉上粟起意欲飲水反不渴	文合散或五苓散
太阳病小便利飲水多心下悸	(补) 茯苓甘草湯
太阳病小便少飲水多若里急	(补) 猪苓湯

結胸証…………… (141)