

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄卷一百四十四醫部

醫部彙考四百九十四

痘疹門三十六

方六內托散
治痘疹初起
人參 黃芪 甘草 用芍 當歸 防風
白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂
右薑一片藥一投煎服
色紅者去肉桂木香加紫草連翹
微不瀉水酒各半煎服
色淡白者去防風白芷加糯米
大便秘結加人乳
全蠍散
治痘兒百日裏痘
秋白全蠍要身全五箇蜜焙乾蟬蛻不可脫完身又
完足五箇酒洗和炒研細末再加酒芍藥砂糖調
來服自然消瘰癧那怕月不足
月裏患痘瘰癧者多憂惡者少變蒸未除痘瘰之
劑不宜妄投是方斟酌百投百效
疹半散
痘出五六朝愈感手腳牽縮一團不知者以為驚
便然耳宜知陽明受暑毒之熱燥而筋絡不能榮
血以滋養故也謂之一把須須服疹半散
歌曰白主疹半一兩霜木通紫草生地黃芍藥燭蠶
全蠍桔槿紅甘草荆芥防法服來隨受貼誤看驚
治即多傷

藥部彙考四百九十四
痘疹門三十六

內托散

痘不起發根葉不紅或灰白有咬牙寒熱等證
人參 黃芪 甘草 用芍 當歸 防風
白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂
右薑一片藥一投煎服
色紅者去肉桂木香加紫草連翹
微不瀉水酒各半煎服
色淡白者去防風白芷加糯米
大便秘結加人乳
全蠍散
治痘兒百日裏痘
秋白全蠍要身全五箇蜜焙乾蟬蛻不可脫完身又
完足五箇酒洗和炒研細末再加酒芍藥砂糖調
來服自然消瘰癧那怕月不足
月裏患痘瘰癧者多憂惡者少變蒸未除痘瘰之
劑不宜妄投是方斟酌百投百效
疹半散
痘出五六朝愈感手腳牽縮一團不知者以為驚
便然耳宜知陽明受暑毒之熱燥而筋絡不能榮
血以滋養故也謂之一把須須服疹半散
歌曰白主疹半一兩霜木通紫草生地黃芍藥燭蠶
全蠍桔槿紅甘草荆芥防法服來隨受貼誤看驚
治即多傷

此痘多起於四五六朝則為是若起於兩三朝則
為驚瀉若起於八九朝則作寒戰治之可也疹半
角必取其銳尖處用之
六一散
專發痘疹之藥
黃芪六錢 甘草炙一錢
右咬咀每服二錢水六分入酒二分同煎至半量
溫服更如微燒同煎尤好加山藥亦得
加入人參保元湯升舉亦妙但參不可輕用恐助
痰發熱以玆攝也
助發丸
治痘者七八日瘰癧不來者急服
黃芪蜜炙三兩 白芍 當歸酒炒各兩半
鹿茸鮮酒色如琥珀作鹿角膠者乳炙之
紫河車酒洗去筋炙乾 白米糠 人參各一兩
右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一二九炒糯
米煎湯下
升天散
即瀉瀉起頂數治痘灰白或紅紫黑陷乾枯或清
水不成痘八九日十日皆可服
人參六分 黃芪 山樞各八分 白米土炒
當歸酒洗 川芎 橘紅各五分 甘草三分
浮半蜜 穿山甲土炒黃 廣木香各二分
右桂三錢此引經之藥也多則藥
右薑一片藥一投水煎服或為末服亦可
如喉吐生薑湯下
海米飲下

肚痛神痛煎湯下

煩躁身門冬湯下

渴用麥門冬五味子煎湯下

吐瀉霍亂皮湯下

痘不成漿多服數帖無妨

補藥湯

痘灰白不起結或癰潰

淫羊藿 穿山甲土炒各二分 人參 當歸

山梔各八分 荔枝一錢半 枸杞子一錢

川芎 甘草 陳皮各五分 廣木香一分

白木土炒六分 官桂三釐 黃豆三十粒

笋尖三個

右加薑糯米水煎服

一方有白芷防風

田單火牛湯

痘標六七朝正妻食應變速乃色白洋浮紫紅

洋標候之莫有土瘰癧陷之凶火熱不退而有寒

戰之狀宜服田單火牛湯

葉子播種者若川芎則大寒藥中有者點宜細

辨之和穿山甲炒氣盡去甲 人參 黃芪

當歸各一錢 附子一錢 甘草五分 桂三分

燭紅八分

右水煎服

澄漿散

治痘中黃腫

黃芪上 當歸中 紅花下

右和酒入罐固密裹之另用

蟬蛻 金丸即雄雞尾後硬石干

二味細研以藥酒煎服

轉環丹

銀一雙

右以參芪當歸紅花桂枝和蜜酒煮熟食之

回藥散

治痘不收漿結細

何首烏 白芍藥 黃芪 人參 甘草 白木

白茯苓

右薑水煎服

象牙散

治同上

人參 黃芪 白木各一錢 甘草炙七分

茯苓一錢半 何首烏一錢

右加糯米二錢煮二枚水煎調下象牙末一錢

防風白木湯

治痘日久不響

歌曰防風到五錢妙木與茯苓當歸大慶皮煎服得

安寧

昔古杭會氏專以四製白木散治痘瘡日久不竹

結痂收膿者此方之遺意也但過晝之痘元氣充

足者則可若元氣不足而遲遲必宜保護不如亟

之隨劑而趨遲何必勉強用藥以違其成功也

人參固肌湯

治痘表發太過致肌肉不密痘痂結肉久不落者

人參 黃芪 甘草 當歸 蟬蛻各等分

糯米一撮

右用水煎服

馬齒莧散

治痘腳不落底潰者

馬齒莧搗汁 豬脂膏 石蜜

右三味共熬成膏塗腫處

退火回生散

治痘血熱枯澀發渴

滑石 辰砂各一錢 水片一釐

右為細末冷水調服一分脾片時必轉紅活矣

如聖湯

治痞已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通

各等分

右加薑一片煮白三薑水煎服

心煩加麥門冬赤茯苓

煩渴加生熟散

七八九日身如火者加酒炒黃冬地骨皮

連翹散

治一切熱藥治痘疹如神

連翹 防風 梔子 甘草各等分

右為末水煎服

海藏云治熱在外而不賦此少陽藥也

梔子全花丸

黃連 黃芩 山梔炒各等分

右為末滴水丸如豆人每服九丸白湯下

通關丸

利下氣血藥也

大黃 牽牛 水通各等分

右為細末調水丸如粟米大每服三五十粒童兒大小虛實加減

竹葉石膏湯

治痘瘡未集俱虛胃中煩悶小便赤澀多渴成赤斑點者又宜服犀角散

石膏 知母各二兩 麥門冬 甘草各一兩

右剉散每服三錢水一盞淡竹葉一握煎半盞溫服不拘時

麥門冬湯

治痘疹煩渴吐瀉及痘後發熱

麥門冬 人參 甘草 赤芍藥 赤茯苓 升麻各一錢 甘草五分 石膏三錢

右用水煎服

生脈散

止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥門冬

右水煎茶服

神功散

治痘作渴

人參 黃芪 甘草 牛蒡子 紅花 生地黃 前胡 紫草 白芍藥

右水煎服

紅花湯

治同上

紅花散

右隨意煎湯飲其湯即止喉口中如煙飲之即止

加牛蒡子尤妙

酸棗仁湯

治痘疹虛煩驚悸不得眠

酸棗仁 炒 甘草炙 知母 炒 白茯苓 川芎 麥門冬 乾薑炮各三分

右水煎服見大倍之

梔子豆豉湯

山梗四箇 豆豉半兩

右水一盞先煮梔子一盞內豆豉煎至七分去滓溫服得快吐即止

黃連解毒湯

治痘疹熱甚心煩不得眠

黃連 黃芩 黃蘗 山梔各等分 右每服四錢水一盞煎五分溫服

若斑毒甚者加青黛一錢調入湯內服之

凡麻痘數內外熱甚神昏者合小柴胡湯主之

若脈洪數內外熱甚舌燥煩渴者合化斑湯主之

牛黃清心丸

生黃連五錢 黃芩 梔仁各二錢 鬱金一錢 辰砂一錢半 牛黃二分半

共研細末蜜酒調糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯送下

人參歸脾散

治小兒不利痘疹不發煩躁作渴咬牙喘滿

人參 歸脾 白芍藥 木通 赤茯苓 甘草 紫草茸

右每服三四錢水煎

人參竹葉湯

治虛煩不得寐或兼自汗

人參 竹葉 甘草各二錢 半夏二錢五分 妙小麥 麥門冬各一錢五分

右每服三錢薑三片梗米一握水煎服

梔子仁湯

治煩躁語狂發狂

梔子仁 黃芩 石膏各一錢 大青 柴胡 豆豉 赤芍藥各一錢 知母 杏仁各一錢半 升麻八分 甘草五分

右水煎服

紅梅散

解毒之藥 全椒五箇 麻黃去節 煨薑 白芷 川芎 桔梗 天麻各一錢 甘草 蘇木各一錢

右為末每服一錢加紅絲少許水煎

有熱加荊芥枳殼服

一方入薄荷葉一片好酒四五點同煎

麻痘風搐方

人參 羌活 防風 獨活 附子 薑製 甘草炙

右等分生薑三片水煎服其端止止

此解表之劑聖古所謂外感風寒之邪丹溪所謂

宜發散藥者是也

解毒丸

藥水石研 石膏研各一兩 青黛半兩

右以二石研細如粉入青黛和勻湯浸蒸餅為丸

如失實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼薑水下亦可三歲兒服半丸量歲數加減服之

柴胡一連丸

治肝經實火

柴胡 宜黃連 胡黃連

右爲末糊丸梧子大每服三十九白湯下

此解毒涼血瀉肝火之劑有熱者宜之

瓜薑散

治痘熱極生風發搐

瓜薑散一錢 白蠟蜜一錢

右慢火同炒老黃芩爲末每服三分薄荷湯下

保命丹

治一切驚風發熱

天麻 麝香 全蠍去尾 白附子炒 薄荷

麝香薑汁炒 蟬蛻 茯神 桔梗各五錢

防風 生甘草 青黛淘淨各三錢 釣藤鈎

牛黃各二錢 大半夏炒湯浸曬又薑汁浸曬炒

南星製同上各一兩 麝香五分 辰砂五錢爲末

右末煉蜜爲丸大黃大每服一丸燈心湯下

消風散

人參 羌活 川芎 甘草炙 防風 荆芥穗

白茯苓 蟬蛻去毒 厚朴 白礬蜜 陳皮

藿香葉各半兩

右爲末每服一錢酒茶調下

車前葉湯

木通 生地黃 黃芪 赤芍藥 犀角 地榆

升麻 紫草 車前葉多用 燈心

右水煎服

痛加甘精滑石山梔

余治此痘要在於清心解毒使胎毒歸於榮升

麻黃良貴宜詳察而投不可執方以害人者也若

如黑豆汁者毒已衝心而元元已離十七八九日

有便小便通而胎毒血條如絲線寸長欲尿則號哭痛

不可忍若急用炒山梔末青龍散調服再以

木通湯飲之可也

浮藥散

治胃虛目汁

右不拘多少炒香每服三五錢煎服

新關散

治痘發熱鼻紅不止

生地黃 牡丹皮 黃芩各五分 升麻三分

薄荷 茅根各一錢 萊菔四十九粒

右水煎服

六神散

治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發虛熱

人參 白朮 茯苓 甘草炙 白扁豆炒

黃芪蜜炙

右等分爲細末每服抄二錢用水半盞生薑

藥一枚同煎至三分去滓溫服之不拘時候

身熱甚者加烏梅少許同煎服

七珍散

調胃進食

山藥 人參 茯苓 黃芪 白扁豆各一錢

白朮一錢 甘草七分

右剉爲粗末加粟米一撮薑一片薑三枚水煎不

拘時溫服

人參養胃湯

補脾進食之劑

人參 陳皮 神曲各一錢五分 人參 茯苓

梔子 黃芪各一錢 甘草八分

右剉散分爲二服水煎不拘時服

二和湯

消食扶氣之劑

藜香 香附各等分

右爲極細末滾水放溫調下三錢

白木苦參湯

治小兒思慮不進乳食

白朮 白芍藥 檳榔 阿膠 柴胡各一錢

青皮一錢 苦參一錢二分 鼠粘子 厚朴

陳皮 砂仁 烏藥 常山各一錢

右剉散每服四五錢水煎食遠服

陳皮枳實湯

治思慮煩食不消

陳皮一錢二分 鼠粘子 厚朴各一錢一分

枳實 青皮 烏藥 紫蘇 砂仁 神曲

檳榔 草果 桔梗各一錢 升麻八分

右剉散每服四五錢水煎食遠服

白木湯

治咳嗽喘吐痰氣喘通用

白朮一錢半 陳皮 白茯苓 五陳子 半夏

杏仁各一錢 甘草半錢

右水一盞半 生薑一升煎六分 服

五味子湯

喘促欲噎通用

五味子一錢 人參 麥門冬 杏仁各一錢半 陳皮一錢

一方無陳皮加薤白到散水一盞六分空肚

溫服兒小者分二服

杏甘湯

治諸癰疽瘡漏

麻黃 桑白皮 杏仁 甘草

右等分為粗末每服二錢水一盞煎食後服

生地黃散

治小兒斑疹身熱口乾欬嗽心煩等症

生地黃半兩 麥門冬去心七錢 款冬花

杏仁 陳皮各二錢 甘草炙二錢半

右每服三五錢水煎徐飲服見大加之

若痰氣而熱內伴宜桔梗甘草防風湯

若痰上雍者佐以抱龍丸

赤茯苓湯

赤茯苓 甘草 大青 升麻 枳殼煨炒

梔子各一錢

右用小二盞古白葉七片豆豉二十粒煎五分

分為三服看兒大小加減

寧神木香散

治大便秘利小便澀滯喘嗽腹脹不能食宜多服

馬砂

倍苓 澤瀉 茯苓 白朮 官桂 事麻

木通 木杏 甘草各錢半 滑石二錢

右到散水一盞煎半盞空心溫服忌油膩分為二服

葛根黃芩湯

治喉石汗發熱欬嗽

乾葛 黃芩各二錢 五味十一粒 甘草五分

黃連 芍藥 石膏各一錢

石水煎服

涼血消毒散

犀角如無用升麻 牡丹皮 當歸 生地黃

赤芍藥 生甘草各等分

右每服三五錢水煎

補肺散

阿膠一錢半炒成珠 杏仁三粒去皮尖雙仁

馬兜鈴半錢 甘草二分半 牛蒡子炒三分

糯米一錢炒 生黃芪五分

右為末分二服水一小盞煎六分食後服時與之一方有桔梗

八風散

即八風湯

蒼香半兩去土 白芷 前胡去蘆各一兩

黃芪 羌活 人參各二兩 羌活 防風各三兩

右為末每服一錢用薄荷少許煎湯調服

清肺散

治患痘咽乾聲啞

麻黃一錢五分 麥門冬 桔梗各一錢 知母

剉碎 天花粉各一錢 阿膠 石膏各八分

右到散分為二服人竹瀝薑汁水煎服

梔子百沸湯

治小兒痘疹因熱生風瘡癢不寐

梔子一錢三分 石菖蒲 紫草各一錢 分

山豆根 生犀 黃連各一錢一分 羌活

木通 白僵蠶 杏仁 非子 風枯子各一錢

升麻 蟬蛻 薄荷七分

右到散每服五錢水煎食後服

紫河車散

治小兒痘疹毒氣不解上攻咽喉聲嘶不引舌根

生香過通粗末煎熟而赤

紫河車即金線車樓 黃芪 黃芩各三錢

白芍藥 甘草炙各五錢

右每服三錢生薑一片水煎服一方有牛蒡子

嗽化丸

薄荷葉二兩 阿膠 甘草 鹽薑炒各七錢

桔梗 瓜蒌 風枯子炒各一兩 風化硝五錢

右為極細末煉蜜丸如英實大噉化噤津兒小不

能噉則調化順抹其口中

香風散

治小兒痘疹作瀉

香附子 陳皮 紫蘇 川芎藭 生甘草

白芍各等分

右到散每服一錢生薑葱白煎或白水煎

萬加白水依常

嘔加茯苓白芍藥

紫草木香湯

治瘧出不快大便泄利

紫蘇 木香 茯苓 白朮各等分 甘草減半

一方無甘草

右制散入糯米百粒水煎服每貼三錢紫蘇能利

大便白朮木香佐之

厚氣虛者加人參

陳文中曰加人參治瘧瘵虛虛寒瘧黑陷瀉亂

黃芩半夏湯

黃芩一錢半 炙甘草八分 白芍酒拌九釐三錢

半夏湯泡七次二錢 生薑一錢 大棗二枚

右制細水一盞煮七分溫服

渴去半夏加枇杷葉去毛炙一錢薑根茅根各三錢

中和湯

治中焦停寒或夾宿食

厚朴一錢 白朮八分 乾薑四分 甘草三分

右制細作一服加生薑一片水煎稍熱服

竹茹湯

橘紅 半夏 白茯苓 黃連薑炒各一錢

甘草五分 竹茹一團 葛根一錢五分

右水一鉢生薑三片煎五分不拘時溫服分三貼

和中湯

治嘔吐不止即瀉胃止吐湯加人參

人參 茯苓 炙甘草各五分 白朮土炒

半夏各八分 陳皮 薑香 砂仁各一錢

右用生薑水煎服

薑香正氣散

治初熱乾嘔

薑香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草

茯苓 半夏 厚朴 白芷

右藥薑煎服

橘皮湯

治嘔吐不止飲食不入

陳皮 生薑各一錢 人參五分

右水煎作三四大服

橘皮半夏湯

橘皮 半夏等分

右每服三錢薑棗水煎

丁香散

治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香不見火 紅豆 甘草 乾薑 青皮

川烏 陳皮 良薑 胡椒 益智各等分

右制散每服三錢用水一盞生薑二片煎六分加

鹽一捏不拘時服

加味鼠粘子湯

治胸中痞作嘔

桔梗 射干 山豆根 防風 乾葛

刺芥 連翹 陳皮

右水煎細細呷之

燈心竹葉湯

治乾嘔

竹葉三十片 燈心三十根

右水煎服

說方

治嘔吐不止水設不納者連服

多年蓮心赤石上為細末

右每服一錢米飲調下小兒只一錢

九味理中湯

人參二錢 白朮 乾薑炮 訶子肉 茯苓

木香 藿香葉 肉豆蔻煨 甘草炙各一錢

右水煎食前溫口服

參水丸

小兒脾胃傷冷外熱裏寒不思飲食身常壯熱大

便或惡色白或惡寒身有大熱因冷物或冷藥

過度或為成腹脹或已出瘰瘕瘕白無血此由

裏寒脾胃伏冷藥毒不行致令毒氣內伏不出宜

服之其瘰瘕白無血者皆從癰白四圍紅暈再

起作瘰瘕而愈

人參 白朮 乾薑炮 甘草炙各一分

右為細末米糕酒糊為丸如麻子大每服百餘丸

溫水吞下或米飲下得食前服前世之書如仲

景諸書治傷寒云輕者用理中湯重者用四逆湯

此乃皆是陽明證而感寒邪脾胃乃為中州之府

故用理中湯口辛甘散為陽以退寒邪也理中

湯棗蜜丸而質下曰理中丸蓋添蜜甘以入脾胃

而便化於中焦今參朮丸以糯米糕為丸取其

難化服在脾胃遂通漸得消化則中焦得煖脾土

喜燥其熱自歸此所以能治熱也

加減四君子湯

治瘡疹不渴厥寒下利
人參 白茯苓 肉豆蔻 黃芪各半兩
甘草炙一錢
右改咀每服一錢水半盞薑五片棗一枚煎三分
乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗
大便不固渴瀉黑陷小兒乳母同服
治中散
治虛寒瀉利不進飲食
黃芪 人參 茯苓 白朮 川芎 當歸
肉桂各五錢 肉豆蔻剉包煨熟取去油淨
丁香一錢半 木香三錢
右爲末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋暖少
頃瘡變紅活而起
滋腎丸
黃藥炒黑 知母炒黑各二兩 肉桂一錢
右爲末水糊丸
黃本清肺飲
黃芩炒 山梔炒各等分
右每服二錢水煎
連翹湯
連翹 防風 瞿麥 荆芥穗 木通 車前子
當歸 柴胡 赤芍藥 白滑石 蠅蛻 黃芩
山梔子 甘草各五分
右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞去滓食前
溫服
紫草冬葵湯
治小便不通毒氣閉塞

紫草茸 山梔子 黃芪各一錢二分 秦艽
苦參各一錢一分 冬葵子一錢半 露蜂房
白茯苓 木通 白芍 澤瀉 車前子各一錢
蠅蛻八分
右剉散每服四五錢水煎食溫服
如急數重牛痛者加甘草梢八分苦楝子一錢
如痛甚就寢者加用牛膝一錢二分
如有赤如血色者加胡黃連一錢二分
如小便血者加當歸川芎龍骨火般犀角各一
錢
紅芪者加生地黃
白朮者加夏枯草一錢三分黃連一錢一分葶子
研一錢二分
瀉甚者加桑螵蛸一錢
洗心湯
治痘毒壯熱大小便不利狂言多渴
大黃 甘草 當歸 麻黃去節 白朮 芍藥
荆芥各等分
右改咀單病輕重多少薑薄荷煎溫服則平熱服
則清
加味四君子湯
人參 白朮 黃芪 白茯苓 甘草 瓜蒌根
桔梗
右各等分水煎服
海藏以此治瘡疹已出未出大便乾澀或時發渴
蓋有病者或因藥受不足或因吐瀉之後或因汗
多或利小便元氣既虛津液乾澀不得潤澤而致

大便澀澀者若妄行疏通何異操刀必須此藥治
之爾未切宜詳審勿令誤也
紫草麻仁湯
治瘡疹大便不通致毒氣閉塞
山豆根 紫葳各一錢一分 生犀 青皮
風枯子 雲母房 桃仁 麻仁 側柏葉
黃芩各一錢 杏仁一錢二分
右剉散每服四五錢水煎食溫服
秘甚者加烏梅肉七分不已再加冬葵子一錢五
分
柴葛桂枝湯
柴胡 乾葛 甘草 桂枝 防風 人參
白芍藥各等分
右剉細加生薑三片水一盞煎七分去滓溫服不
拘時
袁氏獨附湯
治氣厥
大附子五錢炮裂浸
右用水一罐煎草七根煎服
右方加人參二錢肉桂五分黃芪二錢橘紅一錢
甘草五分當歸一錢則爲附子張陰湯治寒厥咬
牙捷效方也但紫芪代黑者不用
無忌散
治陽危痘毒寒戰咬牙
人牙自落者不拘多少火熨有性碎人非葉汁內大
牙三次小牙一次研極細末 雄黃 珍珠各五分
右研爲末每服三五分則一錢用荔枝煎湯

下

一方有牛黃五分

透骨解毒湯

治寒戰咬牙

養草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍藥

右各等分水煎服

催發丹

治痘輪八九朝應變雖不充裕候然寒戰咬牙以此治之

此治之

虎牙 人牙各一枚酥炙

右研細和人參丁香末乳酒和服

清酒金

治寒戰咬牙

狗頭去肉酒醋醃酥炙脆

右細研末酒煎下

參附湯

治痘疹傷風寒戰咬牙寒戰手足並冷或吐瀉不食飲沸湯不知熱

人參煎湯入 好真附塊如法一錢

右每劑先加附一錢末應多加之更不應加至四五錢或等分亦無妨但用之以運其陽氣如已脫者不治

二神散

治傷冷體寒肢冷腹痛口氣冷難發難壯暫用陳

三藥用治痘灰白不起無藥

丁香九粒 乾薑一錢

右為末每服五分白湯送下蓋被片時令舉胃溫

緩發及癍四則痘變順矣蓋兒大小輕重用之

蟬脫散

治痘疹入眼半年已養者一月取效

猪半蹄甲二兩人雞子內蘆花同封燒存性

蟬脫去土取末一兩

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字日

日外兒二分三分三四分或水或新水調下日

三四夜一食後一年已上者不治

馬屁勃散

治瘡疹入眼

馬屁勃 蛇皮各半兩 皂莢子十四粒

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細酒調下

三錢食後

海藏地黃散

治小兒心肝熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮睛

四邊散漫者尤易治若暴起黑睛者多致失明宜

速用此方亦治瘡疹入眼

熟地黃 當歸各一分 黃連 大黃煨 防風

羌活 生犀末 蟬蛻去土 木賊 穀精草

白藥末 沙苑藜各一錢 生地黃 木通

甘草各一錢半 黑參五分

右為細末每服一字或五分隨兒大小加減煎平

肝湯食後調日三夜 忌口將息大人亦治

密蒙花 散

治痘入眼風濕痛

密蒙花 菊花 石決明 白藥末 木賊 羌活

右為末每服三錢茶清調下

免養散

治痘入眼

免養炒黃芩末

右用鹽湯水通甘草煎湯頓服亦可煉蜜為丸酒

送下三十九

免養丸

治痘入眼或生翳障

免養炒四兩 石決明煨 草決明 木賊去節

白芍藥 防風各一兩 當歸五錢 穀精草一錢

右為末蜜丸某豆大每服三五十丸荆芥湯送下

吹耳丹

輕粉 飛丹

右為細末左眼管吹右耳右眼管吹左耳只吹一

二次

一方加雄黃麝香少許

外用石燕子一對預柳一對二味磨水常服

洗肝散

大黃 梔子 防風 薄荷葉 當歸 川芎

羌活各等分

右剉散每用三錢水一盞煎六分不得煎熟空肚

涼服

防風散

治痘疹後風熱上攻目赤腫流淚及痘風瘡

刺不穩 當歸 川芎 防風 赤芍藥 防己

梔子

右各等分為細末每服一錢茶清調下作湯煎服

亦可

加味四物湯

治瘧毒入目血熱不散兩皆赤兼治瘧痢

川芎 防風 白芍藥 生地黃

荆芥各等分

右剉散每服五錢水一盞半煎一盞分作三次服

風

光法防風散

日三服一切腎障皆可磨去

光法 防風 川芎 甘草 木賊 荳蔻皮

荆芥各三錢 蠅蛇去土 蛇蛻 穀精草

雞子殼用內薄皮各二錢

右爲極細末茶清調下每服一錢食後服

幼幼近編加白菊蜜蒙花去芍草

陳三農曰若痘出時眼虛腫流膿赤紫腎膜用荳蔻皮穀精草防風三味煎湯時飲之

荳蔻皮散

治大人小兒風毒赤眼痛癢濕淚昏瞶羞明

秦皮 滑石 黃連各等分

右每用半錢湯泡煮熱洗

仙靈脾散

治痘疹入眼

仙靈脾 威靈仙各等分

右爲末每服半錢米飲調食後下

荳蔻散

治痘疹入眼

荳蔻 甘草 光法 防風各等分

右爲細末每服一錢水調服如痘當日服之效

菊花散

治瘧毒入眼諸證

白菊花 菜豆皮 密蒙花 旋覆花 穀精草

甘草各一兩

右每貼一錢用柿餅一枚粟米泔一盞煎水乾爲度取汁解食之五七日即效

丹溪曰治痘後目眼腫痛草蛇蛻菜豆殼天花粉

爲末粟米泔浸煮乾爲度食之

浮萍散

治痘疹入眼痛楚不可忍

浮萍除花爲末

右每服二錢用羊肝半片入盆內以竹枝剉碎投水半盞投汁調食後服之已傷者十服九效

羚羊角丸

治小兒驚風目盲宜補腎明目

羚羊角取末 酸漿仁去皮各半兩 肉桂五分

虎骨酒煎至五錢 防風 當歸 黃芪各一錢

右爲末煉蜜丸如皂子大每服一丸食前溫水化下日進三服

羚羊角散

治肝風實熱眼目昏瞶時多熱淚

羚羊角鈎 羌活去蘆 黑參 車前子 黃芩

山梔仁 瓜蒂各五錢 胡連 菊花各三分

細辛一分

右爲細末每服一錢食後竹葉煎湯調服

羚羊角散

治黑睛如珠外障

羚羊角 五味子 大黃 知母各一兩 芒硝 防風各二兩

右剉每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服此方宜斟酌用之不可輕率

丹毒散

治小兒瘡疹後眼中生翳膜

蜜蒙二斤如蓮花色者佳 蠅蛇 木通各二兩

白麝香二兩半 甘草一兩

右同爲極細末煉蜜爲丸如梧子大每服八十九食後白湯送下日進三服或煎湯服亦可頻服之

向東西地方上一去不許回顧專取魂囊十四粒

橫柳用雄雞同磨

右二味不落地并花水調服甚效

甘草桔梗升麻湯

治小兒痘出欲透皮膚身熱咽噤不利

甘草 升麻各半兩 桔梗一兩

右剉細末每服一錢水煎服

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第五百五十五卷目錄

醫部全錄四百九十五

痘疹門三十七

方七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七



醫部全錄第五百五十五卷

痘疹門三十七

方七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

山豆根 麥門冬各一錢 牛蒡子炒 黑參

桔梗各七分 生甘草二分 川防風五分

萊豆四十九粒

右水煎服

三黃洗艾湯

治痘後喉痛

黃連 黃芩 黃蘗 艾葉

右各等分水煎服

加味地黃丸

熟地黃酒浸蒸透曬乾八兩 竹青 山茱萸肉

乾山茱萸 五味子炒各四兩 澤瀉 白茯苓

肉桂厚者去皮取肉一兩 腎熱者以此加之 引虛火

歸腎經而熱自止也 牡丹皮 鹿茸炙各三兩

右各另為末入地黃和勻量入米糊丸服煎服更

佳

羌活當歸湯

治痘後痛初發熱時便宜服之

羌活 當歸 獨活 防風 川芎各一錢

柴胡一錢五分 桂枝七分 黃蘗 桃仁

紅花各八分

右酒水各半煎服

一方酒無痛者未患防已

如神湯

治腹痛

當歸 桂枝 元胡索

右各等分為末酒下三錢

定痛散

治喉痛

治喉痛

治喉痛

治傷寒肚痛及冷氣痛
神曲 香附各一錢 山楂二錢 良薑 當歸
甘草各五分

右用薑三片棗一枚水煎服
手足逆冷加大附子二分

桂枝芍藥湯

治腹痛
桂枝 炙甘草各一錢 白芍藥酒炒一錢
右生薑三片棗一枚水煎服

黃連湯

治熱毒在胃腹痛或欲吐此藥能升降陰陽
黃連 芩草 乾薑 桂枝各一錢 半夏
人參各八分

右棗二枚水煎服
一味異功散

治小兒諸般釣證角弓反張胃弱脾虛
透關散

右為末薑湯調服

蟬蛻一物湯

蟬蛻二十一個洗去泥為末

右水一盞慢火熬至半盞去滓量兒大小溫服之
如覺發疹已出便候前服三五次不覺發疹亦無
害小兒瘡疹欲發出加甘草一錢五分煎一盞旋
旋與服服效小兒所出痘種熱毒蟬蛻味鹹寒可
以制其有暴感風熱客於表者蟬蛻亦治風毒
充於皮膚癢痒不止癰癤夜啼瘡疾寒熱驚悸皆
宜服之

木通芍藥湯

治痘疹作渴腹脹小便不利
木通 白芍藥 白朮各五分 川芎 陳皮
乾葛各三分 甘草二分

右水煎服
牛黃散

治瘡疹毒入目便血日夜無度腹痛啼哭
牛黃一分 麝香一分
右為細末每服半錢以漿水半盞煎至三分和淨
溫服量兒大小以次增減日二服

和解毒湯

三日前後用
升麻 芍藥 葛根 人參 川芎 甘草
防風 羌活各等分

右用水 鍾半生薑三片煎至五分溫服
紫草水氣湯

厚朴二兩 大黃四兩 枳實 紫草各一兩
右為粗末每服五錢水半盞煎至三分溫服以利
為度如未利加芒硝一字

桔梗枳殼湯

桔梗 枳殼各二兩 甘草五錢
右剉每服三錢薑三片水煎服

一陳加枳殼湯

枳殼 厚朴 茯苓 甘草 陳皮各等分
右剉每用三錢薑三片水煎服

加味透風散

人參 黃耆 白朮 芍藥 川芎 甘草

茯苓 木通 陳皮 糯米 厚朴 大腹皮
右等分為粗散薑漿煎服

紫草厚朴湯

治痘疹煩悶痞滿或緊急或結聚不散
紫草茸一錢二分 枳實 瀉黃各一分 川黃連
厚朴各一錢一分 露蜂房 白茯苓 蟬蛻
麥門冬 桃仁 石膏 旋覆花 山豆根
升麻各八分 白朮五分

右剉散每服四五錢水煎食遠溫服
紫草枳實湯

治痘疹腹脹或熱毒或因傷冷所致
紫草茸 風粘子各一錢二分 白朮八分
厚朴 苦參各一錢一分 白芍藥 貝母
枳實 訶子 肉豆蔻各一錢 蟬蛻 桔梗
升麻七分 甘草六分

右剉散每服四五錢水煎食遠服
五物木香散

治痘出煩痛

青木香二兩 丁香 零陵香 白礬各一兩
麝香一分

右每服四錢水一小盞半煎服之
熱甚者加犀角一兩如無犀角以升麻代之經者
一服大效

又方以芒硝和薄荷葉毒上令動毒無毒仍用
黃土抹之良此病小便澀有血者中壞發背黑腐
不出膿者死不瘡

普救散

普救散

治痘未作屢毒甚心煩煩躁不安誠宜服之
青黛如蜜膏大

石水調服之即安

治毒散

牛膝子三錢炒 荆芥穗一錢 甘草生用
防風土薑各半錢

右細切作一服水煎加生犀角尤妙

一方有補骨

白氣散

即濟生方八味散加木香也

白木 白茯苓 青皮 白芷 陳皮 烏藥
人參各五錢 甘草炙二分 木香一分半

右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調亦

可

白木湯

治痘瘡癰不捷

白木一錢半 黃耆炙 當歸 陳皮各五分

甘草炙些

蟬花散

治痘疹不拘前後始終遍身作癰破者皆治之
蟬退去頭足洗去土澆炒 地骨皮炒黑各一兩

右共為末每服一茶匙酒送下二服神效

二物湯

蟬蛻淨洗 干一枚 甘草炙一兩

右為末水煎時時服之

盒牌散

治痘至八九日期發熱身中臭穢此痘毒之最急

者以此治之

炒木 芍藥 生地黃 甘草 升麻 荆芥
防風 陳皮 大腹皮 礞石 蟬蛻

石水煎服

黃澤海

人參 黃芪 芍藥 生地黃 防風 甘草

右水煎服

天元二仙丹

澤天湯 人參乳浸 黃芪 生附子剉碎各一兩

右四味另研細方和合一處白蜜調勻量兒大小

加減十歲已上一錢十五歲已上二錢服後隨以

振元湯送下遂止

七星散

黃芪 芍藥各二錢 人參 桂心各一錢

黑魚一個

右前四味共研為末置黑魚肚內升麻酒煮熟與

痘癰者連藥食之凡上焦癰吃頭中焦癰吃身下

焦癰吃尾亦驗方也

治法

經霜桑葉 蘇梗 升麻 荆芥穗 防風

右水煎十數沸候溫拭體

安常聖金散

治痘症始有白泡忽轉入腹漸作紫黑色無膿日

夜叫煩亂者

聖金一錢 甘草一分

右水半碗煮乾去甘草切片炮乾為細末入麝香

半錢同研一錢匕用生豬血五七滴新汲水調下

不遇一服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃差此
是九死一生候也

四聖散

治陰陷不起發不紅活小便不利

紫草 黃芪 甘草 木通

右水煎服

紫甚色紫倍加紫草木通紅花

大便秘加枳殼

如常加糯米

南金散

治痘已出而復陷其勢甚危諸藥不效者萬無一

失

紫背荷葉霜後搭水紫背者 白爛蟹洗去絲炒乾

右為末等分每服看大小大者一錢小者五分研

芫荽汁和酒下米飲亦可

治此證多有因驚風入牙者卒難措辦惟此無毒

而效且速但紫背者甚難得可於鹽鋪內尋之

檳榔散

治倒靨

右從中截斷水服少許服之立發

檳榔

治痘疹黑陷倒靨

白花蛇連骨 兩火乾乾勿焦 丁香二十個

右共為末每服五分或二分無酒送下如黑陷者

移時轉紅甚效

人牙散

治痘瘡方出風寒外襲或變惡或吉紫宜溫肌散使熱氣復行而斑自出

人微脫落者不拘多少

右瓦礫固濟散過出火毒研末出不快而黑陷者

酒酒服之

初虞世曰此名則生散用人牙灰人麝香少許每

服半錢黃芪白芍藥煎湯調下

錢氏曰用溫酒調下

雲岐子曰用升麻紫草煎湯調下

海藏曰若平甘油膩腸脂者過朝丸下之朱砂為

水與宜風散相表裏

一方用雄鼠尾調成膏好酒半盞人乳半盞入煎

白一莖煎湯服下

凡服不可過多每服止三分多則陽氣盡出於表

恐培理爛無血色陰氣內盛必寒寒而滿泄急以

四君子加芍歸服之

彭氏曰只用紫草湯自好痘瘡最伯勝香與酒氣

隔禁不可用

麻黃湯

麻黃剪去根節五錢

右用蜜一些同炒良久以水半升升候沸去上沫

再煎去三分之一不用濾病瘡炮制嚴密者兼熱

並服之避風俟其瘡復出

一法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服

以此藥入表也

萬全曰凡痘子黑陷古方用穿山甲者取其穿腸

透膿而善止也用人牙者取其齒牙骨之餘質上

骨可以入腎也此二物者但信為何事引毒之

劑以施治則可若單用之何濟於事哉有用燒人

屎者蓋屎大穢疫毒位乃時疫所發故宜用之若

加入發表和中解毒湯內尤良

右方皆通表發肌之藥百一惡感風寒肌鬱閉塞

血凝不行而黑陷者宜之

與疹黑陷方

乾磨脂三錢 胡桃一個燒存性

右為細末煎胡荽酒調下藥一錢立效

右治兒血毒治凡前方用穿山甲及麝香等藥治

黑陷皆為氣滯者說也

右方皆寒藥第二證所謂毒氣太盛內外寒凝毒

復入裏必心煩狂躁氣喘妄言知兒鬼神大小便

秘澀而腹脹者所宜速而用之者也

每命五毒丹

治痘黑陷固鬱乾枯不起神驗

月魄即蟾酥少許 銀紅即砂研飛一錢

吐月華即牛黃片出者 梅精即冰片各二分

男王即雄黃三分

右五味用銀豬尾血為丸聖藥于大酒研湯下

丸極時活動

按此方始終犯者皆可用但人多畏之不知證既

危急非此等藥不能救故故明之

陳三慶曰凡用以毒攻毒若毒氣發則當調

補氣血使中氣實則無內攻之患不暴中氣既虛

復氣血不外狂藥氣少歇必內攻矣慎之

漢笑博金丹

治同上

取用黃芪戊未四時四靈丹

右加麝香下俱用天靈蓋

大造保童丸

治同上兼治痘毒亦妙

一鑿子即人胎骨炙過 二板子即狗胎骨炙

三鑿子即貓胎骨炙過

右加麝香下

一字金丹

治同上

紫花地丁 金銀重樓 山慈姑

至寶丹

治同上

戊癸癰即將大米淨定與犬食飽取其糞洗淨炙乾

研細每二兩麝香一分

一精金丹

治同上盛瘰癧死者用立活

臘鴨膽 冰片 原蠶殼各二分 鴉片三分

麝香一分

已上六方治危急證有起死回生之妙

大靈膏

治黑陷乾枯紅紫及斑不起用此救之千金四五

初生小兒解下黑黃用磁磚收貯加水銀二兩麝香

一錢黃蠟封口埋於土中食久愈妙久即化為水

右每過前證有兒大小熱毒盛者重與二三茶匙

酒煮草湯對半和勻服之立時紅潤活潑真秘

方也勝天蓋益枯吳無益之物萬萬矣後此費原
係母之真血所化蓋以血種血且入土日久又得
陰氣多故能解毒

百日內小兒熱而煩躁啼哭不止用少許點入眼
角二三次便能神安氣和而睡蓋又能清心熱也

大成散

治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切不起發之
證俱可用之

穿山甲酒炒一兩 甘草末二錢 紫草三錢

雄黃 硃砂各一錢半 麝香一分

右每五歲兒用一分

冷證熱酒調下

熱證紫草湯下

寒者加入治中散內用

熱證加入小無比散內用

無價散

治黑陷試死者

用無病小兒食臘月將銀確一個上下合定鹽泥
固濟火微通紅取出為末

右蜜水調服一錢

一方加麝香水片少許

加減大紫草散

治白痘似粉人所不識者

紫草 人參 茯苓 黃芪 白朮 芍藥

川芎 當歸 甘草 糯米

右各等分為散每服四五錢水煎服

一方有木通無黃芪各些草快理散

又一方去甘草加水通防風名參芪四聖散治表
裏俱虛

補元湯

治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而
血不足也

川芎 當歸 白芍藥酒炒 熟地黃各一錢

紫草 紅花各酒洗七分 陳皮 甘草各三分

白朮土炒一錢半

右酒水各半薑糯米五十粒藥一枚煎服

活血散

治痘色淡白

當歸 赤芍酒炒 紫草 川芎 紅花各五錢

血竭一錢 木香二錢

右為末每五歲者服一錢十歲已上者服二錢好
酒調下

熱毒血傷不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散

治氣血俱虛灰白色不濕潤同藥者

紫河車一具焙為末 麝散酥炙五錢

一方有鹿耳五錢

右為末每元湯下

氣虛者每元湯下

血虛者每歸紫草而湯下

濕元散

治同上

紫河車一具分作五塊

右用白糯米二合水淘淨入無油鍋內同炒以米

黃色為度同為末每用五七分兒大者一錢極補
氣血能助滋榮如神樣糯米性溫得紫河車之氣
純化為河車故其補助最速靈之造酒米從續化
意也

內助丹

黃芪酒炒 人參酒炒 白朮 茯苓 當歸

陳皮 半夏 厚朴 肉桂 山楂

右薑三片棗一枚糯米五十粒水煎服

如不食加人乳一杯

瘡甚加大附子

寒戰不止加附子防風

渴加蜜門多

渴加洋酒舊茶

不止加詞子肉果

助陽丹

治瘡陽不起根象不紅

甘草二分 紅花五分 陳皮八分 官桂一分

黃芪蜜炙 人參 白芍藥各酒炒 川芎

當歸各一錢

右薑糯米煎服

回生起死丹

治瘡灰白寒氣逆上不食腹脹嘔吐肚痛泄瀉清
水手足俱冷

丁香九枚 乾薑一錢

水煎熱服或蓋片時合牌胃溫暖除退腸回痘白
紅活

人參元活散

治時氣痘疹兼於醫表

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 桔梗
茯苓 枳殼 川芎 天麻 甘草 枳皮各二分

右入薄荷五葉棧水煎服表證多者宜之

清和飲

地骨皮解者 麥門冬去心各二錢 生地黃

知母 貝母去心 橘紅 赤茯苓 甘草

荆芥穗各七分 牛蒡炒研一錢半 桔梗五分

瓜薑一錢

右裏證多者宜之

虛者加人參黃芪

山梗子湯

治痘瘡及痘毒狀如蚊蚤所蟻每點皆色青

山梗子仁 白蘇皮 赤芍藥 升麻各一兩

寒水石 甘草各五錢

右為細末每服一錢水八分蜜草薄荷各少許同煎至五分去滓就溫服

袁氏方

紫草 紅花 犀角 木通 芍藥 生地黃

茯苓 甘草 蟬蛻

右燈草金銀煎服

外加荆芥蘇木通葛枝殼鳳凰脫升麻楊枝濃煎湯浴之

陽毒升麻湯

治面赤在言相躁腰背疼下利脉浮喉痛

升麻五錢 犀角鎊 射干 黃芩 人參

甘草各二錢半

右水煎服

陰毒升麻湯

治陰疽

升麻 當歸 川椒 鹽甲 雄黃 甘草

右水煎服

一聖散

治痘疔挑破以止痛之

雄黃一錢 紫草二錢

右研末用油調服

數方

治痘後痘疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之

赤石脂 臘粉 黃粉 杭粉炒黑 血竭

伏龍肝各一錢 飛丹八分 髮灰五分 乳香

沒藥各三分 冰片二釐 蜜陀僧飛過一錢

右為細末和紙篩過敷之用香藥貼

內服人參散毒散加穿山甲蟬蛻連龜

拔毒膏

治痘疔

雄黃研

右用脂脂重浸令全濕調雄黃點疔痘上立時紅

治亦神法也雄黃能殺毒驅脂能活血也

飛龍散金丹

治痘打痘毒紅腫或麻木喉疔重者昏憤咬牙

真蘇乾乾者酒化 輕粉各一錢 枯白礬

側蘇 寒水石 乳香 沒藥 麝香各一錢

朱砂六錢 蟬半四十一個另研如無亦可

右各為末入蠟酥蠟牛或加酒少許糊丸瘰豆大

每服一丸溫酒或葱湯送下重者外用隔蒜灸

甚者灸灸或者肉灸

苦參丸

苦參一兩 白美黎 胡麻 牛蒡子各半兩

甘草一錢半

右共為末酒調為丸竹葉湯下

牛黃丹

治瘰癧子出定大便不通瘰癧中膿水不乾

牛黃 大黃末生用 珍珠末 粉霜各一兩

右研勻煉蜜丸如黍米大每服一粒人參湯下瘰

兒大小加減

生肌散

治疔瘡不斂并痘後膿血橫流不斂等瘡

地骨皮 黃連 五倍子 甘草 黃蘗各等分

右為細末乾搗搗上

金華散

治痘後膿血橫流用此膏藥能收水涼肌解毒

黃丹水煎過火收乾 兩黃蘗 黃連各五錢

黃芩 大黃各一錢 輕粉 錢 麝香一分

石為細末瘰癧乾瘰癧用臘膏油熬化調搽

白蠟散

專治痘瘡不收

白蠟燭乾不拘多少古磚上取

處乾修為妙 乳香品研散

即錫粉散加乳香三錢

又方

荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 敗茅多年者

右三味共為細末或搗或搗自能收水結痂

又方

黃豆殼

右燒灰為末搗之

如痘風癩以豆殼煎湯洗

秘傳茶葉方

治痘癰遍身無皮膿水流出粘枯去壞

茶葉

右揀去粗梗入滾水一滾即撈起再攪去硬濕補

牀上用草紙隔一層令兒睡上一夜則膿皆乾

蟻花散

治痘癰生蛆蟲及夏月諸蟲咬傷臭惡不可近者

服之鼻皆化而為水吞嚥亦不取近

蟻退去足洗淨焙 青黛淨去灰土各九錢

北細辛一錢半 蛇退一兩燒存性

右為細末每服三錢酒調下仍以生寒水石細末

搽之

定金湯

縮黃芪 人參 炒木 當歸 白芍藥 生地

白茯苓 甘草 白芷 防風 荆芥 升麻

右入豆豉一握白銀一塊燈心甘草同煎服

寒水丹

雞骨灰帶血而燒過 銀珠各一錢 冰片

赤石脂各五分 煨灰灰二分

右研細末洗淨徐搽之

治痘生蛆方

經霜桑葉 野薄荷

右煎湯洗之其蛆自去或先用艾條薰之後增索

蘇甘草煎湯洗之禁雄黃桑石等藥

鼠粘子湯

治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣

鼠粘子六錢 甘草五分 犀角 白木各三錢

荆芥 防風 根殼各一錢

右水煎服

活血解毒湯

治發毒

防風 荆芥 生地黃 赤芍藥 牛蒡子

當歸 連翹 黃連 紫草 甘草 蒼朮

薄荷 川芎 木通

右各等分水煎服

樺皮散

治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樺皮末

右對煎溫服此藥味苦平無毒

若治乳癰取樺皮燒存性為末酒調服之立消

十三味敗毒散

當歸 白芷 穿山甲土炒 金銀花 防風

乳香 沒藥製 天花粉 芍藥 皂角刺

貝母 沒藥製 天花粉 芍藥

右各等分酒煮各半煎服

木香散

治小兒痘疹生癰如神

地骨皮一兩 木瓜半兩 川山甲炙黃三錢半

麝香一錢

右為末米飲下一錢

東垣聖愈湯

治膿潰心煩焦燥體倦少食

熟地黃白製者佳 生地黃各二分 人參

川芎各三分 當歸 黃芪各五分

右水煎服

小柴胡加生地黃湯

柴胡 人參 黃芪各三兩 甘草炙 生地黃

半夏各二兩湯泡七次

右為粗末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎

至半盞去渣溫服

六味活血散

治痘瘡痛初起紅腫不散

官歸 川芎 赤芍藥 生地黃 酒紅花

蘇木各等分

右水煎服之

人參敗毒散

即即防敗毒散治發熱癰腫

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 薄荷

柴胡 枳殼 川芎 桔梗各等分 甘草減半

牛蒡子 防風 荆芥 連翹 金銀花

頭上白芷升麻

上身倍加倍佳