

辨證奇聞幼科卷三

山陰陳士鐸公父原本

文守江南紀氏敬述

阜鄉

男先五建中氏

驚疳吐泄

小兒大約因疳成吐二成泄二成驚故曰內流涎疳兆也起首卽
治疳吐泄不作何有驚生疳失治胃氣傷矣小兒純陽原無損陰
氣胃傷者傷陽氣也陽傷陰亦傷矣傷陰傷脾氣也後天以脾胃

爲主脾胃兩傷無氣養心驚症起驚虛症非有外風入然則吐泄
驚俱脾胃虛寒疳乃脾胃實熱也不知小兒多食水菓致口熱成
疳口熱似陽旺然陽極變陰故疳久作吐正陽變陰之驗也可
驚疳吐泄俱虛症補脾胃四症俱愈世分驚爲風疳爲熱吐泄爲
寒孰是單補脾胃者用活見丹人參神曲芩白朮巴戟白芍和甘
草陳皮分伏苓仁柴胡仁當歸查肉二劑愈三劑不發方健脾
開胃又平肝使肝無鬱滯自疏土氣則脾胃安吐泄止何至四肢
無養角弓反張急慢驚風哉

一生疳兩牙床盡腫流涎咳嗽咽腫人謂脾熱誰知胃火上升乎
胃火宜泄何不效以火過盛陽將變陰矣故降火藥以泄火二不
降轉困者正壯火食氣也少火宜泄壯火宜補不補胃治火反泄
火損胃安得不加困宜補胃少息火疳自愈用平疳湯伏苓仁白
朮吉更紅陳皮只壳黃芩仁神曲炒麥冬玄參仁人參蘇葉仁四
劑愈不發此補胃以散火二自平者以火出土中也土健火藏土
衰火現故補土火藏于下何至上升口頰乎况加解火藥則土引
火自歸火亦隨土而自戢

一生瘡後飲水卽吐後不飲亦吐困極人謂熱吐誰知熱變寒乎
瘡本熱久則寒者以胃土之傷土衰則火旺火旺土益衰土益衰
前火不能旺矣火上而衰何得不寒况最喜生冷土衰加生冷
自吐故止吐以健胃爲主則胃強吐不再犯用六君加味治人參
和 白朮 紅茯苓 紅甘草 分半下 旣神曲 紅陳皮 紅白叩 粒二劑全
愈此健胃止嘔大人尚神况小兒乎小兒嘔人每輕視不知胃氣
一傷四肢失養必角弓反張乃因虛也今扶胃氣胃健受食既無
嘔吐自有灌注何有驚風

一月內乳後輒嘔逆乃初生陰陽未平不必治亦不必畏政守
一大吐後大泄吐止泄不止倦極人謂吐變泄其氣順誰知吐傷
胃泄傷脾氣順宜吐止愈今吐止大泄乃胃傳于脾由腑入臟是
由表入裏較吐更甚蓋吐補胃可愈泄宜兼補脾雖脾胃有同治
法補胃自必補脾但吐後作泄則補脾必須助胃用生脾助胃湯
參朮甘草肉桂干伏苓紐神曲紐附子片二劑愈倘不效不
救此方治小兒泄效自如响彼不應乃陰陽兩絕非藥之咎

一吐泄目上視死亾傾刻狀如慢風人謂驚風誰知脾胃氣將絕

乎若作慢風治用牛黃等九下喉卽死脾胃氣絕是陰陽氣欲脫也非急用人參救氣何能再活然價重此症又須多用無論近人無此胆卽古人亦無此法故小兒多亡夫小兒脾胃虛寒何致泄尤宜多人參用安光至宝湯參朮朮伏苓巴戟附子麥芽蘿卜子仁只壳兵部紅前子扁豆仁白叩三劑愈此方多用參附故奪命于將亡以參回陽于何有之鄉附子續陰于無氣之後羣藥佐之陰陽自分積穢自除世但祛除不知補中用藥故不效一吐泄後角弓反張驚悸擗摘此肝尅脾胃土二氣欲絕耳若

風藥定驚立止蓋吐泄陰陽兩亡但存幾希之氣不補脾胃以續氣反散風損氣能不死乎且補脾胃土不補命門心包火則止寒陽不能驟回陰不能速長宜補火生土補土止驚用續命湯參朮附伏苓巴戟牡肉桂半下和生枣仁仁志肉仁菖蒲丁香白芍姜附仁柴胡炙甘草仁此方以十歲爲準每歲減二分慢急驚風俱治不可謂急爲風慢爲虛也世謂驚爲風悞矣不作風治十活九作風治十人十死症兼風治十死八以大虛絕不治風十人十活喻嘉言謂驚風死字勸醫絕口不道雖過于憤激然實有不得不

大聲以救者但所立方尚兼風治猶未洞達底裡

一世人以急驚屬風慢驚屬虛此似是而非殺人之說也驚風二字殺人甚多小兒何嘗無風一作風治千人千死無如殺運未除此輩亂治予治急慢驚以保赤定驚丹人參伏苓白芍配白朮兩半下柴胡山查只壳神曲甘草乾姜麥冬兩兩炒荆芥兵部昌蒲卜何葉麥芽桂木香各爲末蜜丸如龍眼核大凡急慢驚用一九以人參三分煎湯泡開送下輕者一九重則二九但人參多二益善然無參亦免死

便虫

一便寸白虫或蛭蛔及吐長短虫人謂濕熱誰知脾胃傷乎小兒
自喜生冷濕熱無疑然脾胃健濕熱易消脾胃衰濕熱難化不生
津液而生虫倘不補脾胃則脾氣不能消胃氣不能化虫且安居
又何以殺惟補脾胃則氣旺自能制虫况佐殺虫藥乎用治虫丹
苓朮白芍芩甘草芩白微仁史君子仁黃連芩只壳兵部半下殭
百部各二劑虫盡化水但服後忌飲一時此殺虫藥多然入健脾
平肝內則正無傷虫盡殺

一發門拖長虫不下又不進不痛癢人謂虫口咬住誰知是死乎
虫口咬必痛今安然如故然虫不咬宜隨下今半截在中非崇禋
乎用外点方点虬湯水銀水片章腦白芷紅礬砂分雄黃輕粉卜
荷葉各研以不見水銀星爲度水調少許点虫頭或身少刻化
水点時須虔拜上天此余遊南嶽逢異人自號雷公狀甚異傳余
活人錄奇方最多此其一也

痘

一將出痘身熱口渴眼如醉此時以表藥散之則火毒大解無如

因循數日現點始用有形之鮮與無形之鮮不同故輕變重二變
死夫見點當于補中帶表則正無傷火毒又散用至慈湯八參炒
荆芥陳皮紅生草柴胡花粉紅當歸紅伏苓麥冬紅玄參紅二劑
愈不必三劑若已出熱則重變輕死變生此用柴胡荆芥疏通表
裏玄參去浮游火生草鮮毒妙在人參補氣生津佐前藥使無壅
閉以達至隱之火毒火毒非補不可此方以十歲爲準如一歲十
分用一每歲增加若十歲外宜加參餘不必加

一遍身粒二鮮紅明白佳兆也不必用藥止須助正自飽滿貫漿

收醫亦速然呆補無疏通升上不降下非善法也用安幼湯當歸
玄參熟地麥冬紅丹皮荆芥紅生草頤陳皮貝母紅生地紅黃連
分不必二劑妙在補中帶散無外阻散中實補無內怯毒大泄不
外阻世但知補故多留後患且呆補必變惡瘡人猶謂毒未淨用
散火敗毒藥至不救哀哉

一痘紅盛煩渴大便乾燥小便短澀黃赤脉洪大不勻舌生瘡此
陽症也切忌溫熱然火毒大盛驟用寒涼必火不遽退熱不驟解
皮生變宜寒中化熱涼中化火則不違火性自得寒涼用全痘散

火湯玄參炒荊芥紅黃芩生草枝子紅吉更生地當歸紅一劑愈
方用芩枝清火玄參退浮游熱妙在荊芥吉更引火外出生地當
歸滋肺肺燥則雨潤風吹必爽火宅爲清涼故解散又無違背

一痘空色清白發癢中場寒顫咬牙腹虛脹吐泄脉沉微細弱此
陰症也必大補氣血佐溫熱則瘡無水凍倘用寒散則痘內陷立
亡然色白虛也發癢又有實症身寒涼也發顫又有熱症腹脹虛
寒也吐泄又多寔熱症既非虛寒一用溫熱安得不死不知舌紅
爲熱白爲寒舌紅帶白熱中寒舌白微紅寒中熱二極大紅又燥

寒極純白又滑舌白又滑陰症無疑用祛陰救痘丹入參荆芥紅
芪歸白水紅附子紅一劑色白卽紅陽回陰寒之氣盡散此方補
氣血氣壯陰難留血足陽自復然必附子奏功始神又恐附子直
攻其內故加荆芥引之外散

一痘隱不見此氣虛不能推送也論理升桔羌防能外泄然不補
則元氣太虛恐痘發他症又生用發痘散生芪紅甘草紅當歸吉
更荆芥紅防丰紅一劑盡出不必再服方雖用吉更荆防妙在芪
歸易于推送故火毒盡出

一痘已見點熱氣大盛粒過多入謂火毒太盛雖知血虛不能潤
乎若發散不補血則火盛水乾痘難成漿用養痘湯當歸仁川芎
麥冬紅連交趾花粉木通紅甘草仁二劑成漿妙在芎歸麥冬爲
君少用連交木通花粉則血旺火不過炎熱消毒不內隱故速效
又無後害

一痘出四五日大小不等根窠不紅澤色暗頂陷不起人謂火毒
倒塌誰知氣血虛乎此必補氣血中佐化毒催漿用催痘湯人參
紅牛子川芎伏苓紅芪歸紅吉更肉桂紅陳皮紅連交紅二劑效

妙在參芪芎歸之多發散化毒爲佐故氣足不怯于中血足不陷于內自紅潤肥滿

一痘五六日毒宜化漿宜行乃不紅綻肥滿此氣血大虛切忌攻火敗毒宜補氣血用護痘萬全湯人參紐黃芪川芎伏苓紅當歸白朮紅陳皮牛子花粉紅吉更紅不必二劑妙在不消毒攻火但補氣血且補中有散更非呆補

七八日宜漿足反瘡平漿淡食減此氣血不充也人脾胃氣弱則肝血不生血不生脾胃更弱何能致漿足瘡哭哉宜大補脾胃氣