

胎產經心卷二目錄

各論目錄

胎逆上逼脹滿子懸門 四君子湯

逍遙散附八味逍遙散又名加味逍遙散和氣安胎飲附順氣安胎散

加參平胃散 尊生和氣飲

針灸方 諸血證門

加味清胃散 黃芩清肺飲

冬味地黃湯附冬味地黃丸又名八仙長壽丸

涼血地黃湯 子腫子氣子滿門子滿即名胎水

全生白朮散

健脾利水湯

加味五皮湯

附五皮散

加味天仙籐散

茯苓湯

千金鯉魚湯

局方五皮湯

束胎飲

子煩並五心煩熱及煩躁口乾門

竹葉安胎飲

千金竹瀝湯

加味竹葉湯

二陳湯

加減參麥湯

知母丸

一味黃連散

尊生加味安胎飲

子淋門

加減安榮散

轉胞淋閉門

二陳升提飲

遺尿門

白薇散

加減

子嗽門

寧肺止

蘓枯湯

喘急門

參蘓飲

平安散

泄瀉門

胃風湯

加味理中湯

加味治中湯

四苓散附五苓散

不換金正氣散

胃苓湯

加味六君子湯

密齋加味四君子湯

人參白朮散

霍亂門

香薷散

加味四味紫薷和胎飲

六和湯

回生散

七味白朮散

中惡中暑中濕中風門

散滯湯

煮艾方

清暑和胎飲

黃苓白朮湯

搜風安胎飲

子癇門

羚羊角散

鈎藤湯

清神湯

琥珀壽星丸

荆防安胎散

痢門

厚朴去乾薑湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

黃芩芍藥湯

黃連丸

連理湯

千金三物膠艾湯

又名膠艾
榴皮湯

駐車丸

白頭翁加甘草阿膠湯

當歸黃芩芍藥湯

黃連阿膠湯

一味阿膠飲

阿膠黃連飲

又名黃連阿膠湯

加味香連湯

瘧門

枳實理中湯

附理中湯○附子理中湯

承氣湯

黃連解毒湯

桂枝白虎湯

附白虎湯○人參白虎湯

散邪飲

截瘧湯

柴胡知母湯

七聖截瘧散

明砂止瘧丹

加減丹溪安胎飲

一傷寒溫熱時行疫證門

葱白香豉湯

尊生香薷散

金花湯

濟陰香薷散

黃龍湯

三黃解毒湯

護胎法

又法

柴葛安胎飲

生津葛根湯

梔子葱豉湯

加味化斑湯

千金石膏大青湯

石膏六合湯

升麻六合湯

謔語門

生地黃黃連湯

血證黑神散

臟燥悲傷門

甘草大棗湯

淡竹茹湯

大便燥門

潤燥湯

胎不長養過期不產並枯胎門

保元湯

十全大補湯

補血行滯湯

又名催生湯

鬼胎門

決津煎

通瘀煎

妊娠出痘門

黃芩湯

妊娠麻疹門

升麻葛根湯

固胎飲

胎產心法卷二目錄終

胎產心法卷之二

上谷閻純爾主著

崇西昌三官會重刻

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼重則脹滿疼痛謂之子懸紫蘓飲爲必用之藥蓋因紫蘇飲爲治妊娠胎氣不和濁氣舉胎上湊胎熱氣逆心胃脹滿之證且此證挾氣者居多宜疎氣舒鬱非紫蘇腹皮川芎陳皮無以流氣非歸芍無以養血氣血旣利而胎自降然邪之所湊其正必虛故以人參甘草補之如飲食不甘加四君子有熱加芩梔歸芍內熱晡熱或

四君兼逍遙散若常常多怒時覺脹滿服順氣藥不應宜
用和氣安胎飲或加味逍遙散胎上攻而作痛宜紫蘓飲
或順氣安胎散若脾虛停滯脹滿安胎飲力薄宜用加參
平胃散有因鬱滯者亦宜紫蘓飲或加味歸脾湯有因痰
結聚者紫蘓飲加芩連貝母有因暴怒者左關必弦洪肝
火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔大抵胎氣上逆皆屬
火旺急用芩朮香附之類不可服大寒之藥反致他變予
每治孕婦心胃脹滿用尊生和氣飲甚效子懸證有兩尺
脉絕餘脉平和不可錯認死胎且死胎有面青舌青可辨

宜紫蘓飲治之則胎歸原位脹消脉起矣如臨月胎上逼
心嘔噦欲死急用童便灌之卽下或烏梅肉十枚研爛入
生薑三片煎湯灌之亦下取酸以降歛之兼辛以散火氣
之逆也又有因坐草太早心懷恐懼氣結不行紫蘓飲一
服便產○後附針灸一方備用

四君子湯 治胃氣虛弱飲食不思倦怠少食

人參 一錢至三錢

白朮 一錢至二錢土炒黃

茯苓 一錢至錢半

炙甘草 六分至一錢

水煎服

逍遙散

附八味逍遙散又名加味逍遙散

治血虛肝燥

骨蒸勞熱往來寒熱咳嗽潮熱月經不調口乾便澀

柴胡

當歸

酒拌

白芍

酒炒

白朮

土炒

茯苓

各一錢

炙甘草

五分

加煨薑薄荷引水煎服。一方無茯苓薄荷有茯苓神生

薑爲引治脾肝血虛鬱怒傷肝血少目暗發熱脇痛等

證。加丹皮梔子

各七分

名八味逍遙散又名加味逍

遙散治小便帶血或過勞及多食炒炙宜清膀胱之火

當歸柴胡加倍白朮加五分

和氣安胎飲 治孕婦多怒胸中脹滿若用烏藥香

附砂仁順氣等藥反加滿悶宜服此飲

人參 白朮土炒 當歸酒洗各一錢 川芎

條芩各八分 陳皮 紫蘓 災草各四分

木香二分磨汁衝服

薑引煎服。一方無木香有砂仁四分 名順氣安胎散

治孕婦胎氣上攻心腹脹滿作痛子懸之證有因氣惱

者加木香二分磨衝服

加參平胃散 治孕婦脾虛氣弱飲食停滯以致腹

脹嘔吐安胎飲力緩宜用此散

人參

白

朮

土炒各一錢

蒼

朮

米泔浸製

厚

朴

薑製七分陳

皮

炙

草

各四分

薑一片水煎服

尊生和氣飲

治孕婦心胃脹滿

人

參

蘓

梗

白

芍

酒炒

川

芎

各六分

當

歸

一錢或六分酒洗

腹

皮

五分製淨

木

香

一分磨衝藥服

炙

草

三分

水煎服

附針灸方

妊娠六七個月飲食絕然不進胸膈脹水與藥皆不能
下診脉平和又非病脉此乃膈氣不通藥不能治惟針
灸可通宜灸內關穴卽能進飲食矣其穴在手掌大紋
後二寸兩筋間此穴可針亦可灸男左女右重則雙手
同灸輕者七壯重加十數壯艾如黍大或如麥大寸取
本人同身寸以男左女右手中脂屈回用草較所屈中
脂中節內紋兩頭盡處截斷爲準一寸也

紫蘓飲

見本卷安胎門

小柴胡湯

見本卷諸痛門

加味歸脾湯

見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極如同月水胞乾胎死母亦難保其調治之方已
詳論於胎漏門中茲不重論

妊娠吐血凡七情內傷六淫外感皆足致失血之患一主
火熱者以氣血壅養胎元或有所感則氣逆而火上乘心
煩滿悶血隨而溢甚者或致墜胎但火有虛實之分實火
清熱養血虛火滋陰補水則血安胎固若泛用行血清血
之劑胎必墮而禍不旋踵矣如肝經怒火加味逍遙散膏