

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

卷之四

薛氏醫案

明醫雜錄

明醫雜錄
續醫論
與張近
書
識得標本先後

明
薛已訂

利喘則必生脹脹則必
而後脹者主於肺先脹

而後喘者主於脾
降外主皮毛經曰肺朝

百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生脹滿焉此則喘為本而脹為標治當清金降火為主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸潰肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不得降而生喘矣此則脹為本而喘為標治當實脾行水為主而清金次之苟肺症

而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治二症但知實脾行水而不知分別脾肺二症予故為發明之

愚按前症若肺中伏熱不能生水而喘且渴者用黃芩清肺飲以治肺用五淋散以清小便若脾肺虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以補腎水若膏粱厚味脾肺積熱而喘者宜清胃散以治胃用滋腎丸以利小便若心火尅肺

金而不能生腎水者用人參平肺散以治肺用滋陰丸以滋小便若腎經陰虧虛火爍肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土若脾氣虛弱不能相制而喘者用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以生腎水若肝木尅脾土不能相制而喘者用六君柴胡升麻以培元氣六味地黃丸以補腎水若脾胃虛寒不能相制而脹者用八味丸以補脾肺生腎水若脾腎虛寒不能通調水道

而脹者宜用金匱加減腎氣丸補脾肺生腎水若酒
色過度虧損足三陰而致喘脹痰湧二便不調或大
小便道相牽作痛者亦宜用此丸多有生者○一富
商飲食起居失宜大便乾結常服潤腸等丸後胸腹
不利飲食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳黃連之
類前症益甚小便滴瀝大便泄瀉腹脹少食服五苓
薤麥之類小便不通體腫喘嗽用金匱腎氣丸補中
益氣湯而愈○一儒者失於調養飲食難化胸膈不

利或用行氣消導藥咳嗽喘促用行氣化痰肚腹漸
脹用行氣分利睡卧不能兩足浮腫小便不利大便
不實肺腎脉浮大按之微細兩寸皆短朝用補中益
氣湯加薑附夕用金匱腎氣丸加骨脂肉果各數劑
諸症漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中
八味半載而康

氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱
加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健

悍之劑行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當病雖在暑熱時月亦可用也予嘗治一僕人五月間病熱口渴唇乾譫語診其脉細而遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服熱愈甚狂言狂走或曰附子差矣診其脉如舊仍增附子進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣又嘗治一婦人亦夏間病熱初用平調氣血兼清熱和解之劑服二三服不應熱愈甚舌上焦黑膈間有火嗽水不嚥診其脉兩手皆虛微而右手微甚六

七日內譫語撮空循衣摸床惡症俱見後用四物湯加黃芪人參白朮陳皮麥門知母熟附子服之一二時汗出而熱退次日復熱再服仍退又次日復發知其虛極也遂連進十服皆加附子而安

愚按前論正所謂捨時從症捨症從脉真有定見者也○一男子發熱煩渴頭痛誤行發汗喘急腹痛自汗譫語用十全大補加附子治之熱睡喚而不醒及覺諸症頓退再劑而痊○黃武選飲食勞倦發熱惡

寒誤用解表神思昏憤胸發赤斑脉洪數而無力余
曰此內傷元氣非外邪也急用溫補之劑彼不從後
果歿

飲食過傷變為異常急暴之症人多不識嘗有一壯年
人忽得暴病如中風狀口不能言語目不識人四肢不
舉急服蘇合香丸不效余偶過聞之因詢其由曰適於
陪客飲食後忽得此症遂教以煎生薑淡鹽湯多飲探
吐之吐出數碗而醒後服白朮陳皮半夏麥芽調理而

愈大抵此等症多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣
惱而致飲食填塞胃氣不行內傷特重若誤作中風中
氣症而用驅風解表行氣散氣之藥則胃氣重傷死在
旦夕內經雖有暴病暴死之症但恐多有因於食者前
輩不曾明言故人不識耳今後遇有此等急症須要審
問明白若方飲食醉飽或累傷飲食重複受傷但覺胸
膈有食滯只作傷食治之

愚嘗治趙吏部患吐物出皆酸味其脉氣口大於人

迎者二三倍僚友速余投劑余曰此實邪在上候其
吐盡酸味不藥自愈翌早吐止而安○一婦人飲食
後因怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口禁如發瘕然吐
痰如湧灌以二陳柴胡山梔枳殼吐出酸味神思稍
醒藥止次日進薄粥少許但乳脇脹痛寒熱欲嘔四
肢倦怠余以為悉屬肝火熾盛致脾氣不能運化先
用六君柴胡山梔釣藤鈎諸症頓退惟四肢不遂血
崩如初或又以為肝火未息欲投清肝涼血之劑余

以為肝脾氣血俱弱先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經又用四物參朮柴胡養肝筋而四肢便利

餘見異症名要

久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得效誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易入外寒束其內熱閉逆而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒

愈甚矣惟當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從法治之則病可愈而根可除也

愚按前症多主於痰痛甚者乃風毒上攻有血虛者有諸經氣滯者有氣虛者有四氣外傷有勞役所傷有可吐者有可下者當分虛實寒熱兼變而治之若夫偏正頭風久而不愈必內挾痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯甚則目昏緊小二便秘澀宜砭出其血以開鬱解表余嘗治尚寶劉毅齋但怒則兩太陽作痛

先用小柴胡加茯苓山梔後用六味丸以生腎水而不再發○譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃薑便止余作中氣虛寒用六君當歸黃芪木香炮薑而瘥○商儀部勞則頭痛余作陽虛不能上升以補中益氣加蔓荊子而瘥

眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其性辛甚故

借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾薑末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻不能散矣故點眼用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片為劫藥而誤認為寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘴翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而妄將